

Т. Н. Томилина

**РЕЦЕПТУРНЫЙ
СПРАВОЧНИК
ДЛЯ ВРАЧЕЙ**

Rp

Spun

Т. Н. Томилина

РЕЦЕПТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Издание третье,
исправленное
и дополненное



ЛЕНИНГРАД «МЕДИЦИНА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1974

Томилина Т. Н. **Рецептурный справочник для врачей**, издание 3-е, исправленное и дополненное, 1974 г.

Настоящее издание справочника переработано с учетом изменений в номенклатуре лекарственных средств, зафиксированных в X издании Государственной фармакопеи СССР (1970 г.), в соответствии с новой международной номенклатурой.

Вся рецептурная часть также составлена по новой номенклатуре, что поможет врачам быстрее ее усвоить.

Кроме того, в справочник включен ряд новых эффективных препаратов, пополнивших аптечную сеть за время, прошедшее после второго издания, и исключены препараты, снятые с производства.

Вся же структура справочника нового издания и форма его изложения, как вполне себя оправдавшие, оставлены прежними.

© Издательство «Медицина», 1973

50104—039
Т ————— 286—73
039(01)—73

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

В наше время фармакология делает большие успехи. В соответствии с этими успехами арсенал лекарственных средств, которыми может и должен пользоваться практический врач, быстро пополняется новыми препаратами. Поэтому очень важно своевременно издавать рецептурные справочники, являющиеся постоянными спутниками и помощниками лечащего врача. Подобные справочники должны содержать безупречно точный материал и быть, с одной стороны, достаточно полными, а с другой, — не перегруженными излишними сведениями. Не менее важно, чтобы справочник имел удобную для пользования систему изложения и доходчивое оформление.

Всем этим требованиям вполне удовлетворял «Карманный рецептурный справочник для врачей» доцента Т. Н. Томиной, впервые изданный в 1960 г., второе издание которого с большими дополнениями вышло в 1970 г.

Настоящее — третье издание справочника переработано в соответствии с новой международной номенклатурой с учётом изменений в номенклатуре лекарственных средств, зафиксированных в X издании Государственной фармакопеи СССР, 1970 г.

Вся рецептурная часть также составлена по новой номенклатуре, что поможет врачам быстрее ее усвоить.

Кроме того, в справочник включен ряд новых эффективных препаратов, пополнивших аптечную сеть за время, прошедшее после II издания. Для большинства из этих новых препаратов, кроме фармакопейных наименований, приведены также и химические названия, что следует приветствовать, так как это позволит, при поступлении новых импортных препаратов, идентифицировать их с имеющимися отечественными.

Вся же структура справочника нового издания и форма его изложения, как вполне себя оправдавшие, оставлены прежними.

Академик АМН СССР С. В. Аничков

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Справочник доцента Т. Н. Томилиной имеет целью помочь практическому врачу правильно выписывать рецепты.

Большое количество новых лекарственных средств, поступающих в аптечную сеть и в медицинскую практику, затрудняет врача, выписывающего рецепты. Большинство имеющихся рецептурных справочников в значительной степени устарело и не содержит прописей новейших лекарственных средств.

Автор справочника поставил своей задачей в краткой форме, в размере карманного пособия дать возможно большее количество рецептов. Это заставило его исключить из справочника подробные данные о химическом строении препаратов и об их фармакологических свойствах, ограничившись лишь краткими сведениями, необходимыми для правильного выписывания рецептов.

Нужно надеяться, что справочник доцента Т. Н. Томилиной, составленный с большой тщательностью, окажет помощь врачам в их повседневной практической деятельности.

Действ. чл. АМН СССР проф. С. В. Аничков

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПРАВОЧНИКОМ

Справочник содержит рецептурные прописи почти всех лекарственных средств, имеющихся в нашей аптечной сети.

Краткие сведения о препаратах даны в рамке, состоящей из двух частей (пример 1).

В левой части рамки даются: русское и латинское названия препарата, указание, относится ли он к ядовитым или сильнодействующим (группа А или Б), имеется ли он в X издании Государственной фармакопеи СССР.

В правой части рамки, используя сокращения (объяснение применяемых сокращений дано на стр. 7), даются последовательно сведения о дозах, физических свойствах и форме выписывания данного лекарственного средства. В сведениях о дозах указываются высшие разовые, а в скобках — высшие суточные дозы (в граммах). В рецептах используются средние лечебные дозы.

Пример 1

Коразол	0,2 (0,5). П. в. р. Тб. 0,1.
Corazolium (Б), ФХ	Амп. 1,0 — 10%

Из примера видно: коразол относится к группе Б — (Б), имеется в X издании Государственной фармакопеи СССР — ФХ, высшая разовая доза 0,2 г — 0,2, высшая суточная — (0,5); коразол — порошок, растворимый в воде — П. в. р.; прописывается в таблетках по 0,1 — Тб. 0,1 и в ампулах по 1 г 10% водного раствора — Амп. 1,0 — 10% (масляные и официальные растворы прописываются в миллилитрах — мл).

Если препарат зарубежный, рядом с русским названием указывается страна, откуда он получен. Для большинства новых препаратов после русского и латинского названий указываются их химические названия (пример 2).

Пример 2

Редимил (Венгрия)	0,3. П. в. р. Амп. 20,0 — 1,5%
Redimilum (Б)	
(β, β-диметил-глутаримид)	

Если фармакопеей не установлены высшие разовые и суточные дозы, то указываются средние разовые дозы или пределы средних разовых доз (примеры 2 и 3).

Пример 3

Инсулин для инъекций Insulinum pro injectionibus (Б), ФХ	5—40 ЕД. Ж. (оф.). Фл. 5 и 10 мл (активность 1 мл — 20, 40 и 80 ЕД)
--	---

Если в зависимости от путей введения высшие разовые и суточные дозы изменяются, то по этому поводу даются специальные указания (пример 4).

Пример 4

Ганглерон Gangleronum (Б), ФХ	Вн 0,075 (0,3). П/к и В/м 0,06 (0,18). П. в. р. Амп. 2,0— 1,5%. Кпс. Тб. 0,04. Фл. 100,0 — 1,5%
----------------------------------	--

Лекарственные средства, прописываемые на специальных бланках единого образца (препараты группы морфина, кодеин и др.), обозначены звездочкой *.

Двумя звездочками в скобках (**) отмечены препараты, получаемые из капиталистических стран в ограниченном количестве и нерегулярно.

В 1959 г. Министерством здравоохранения СССР утверждены правила выписывания рецептов на лекарства для амбулаторных больных. Для ознакомления врачей с этими правилами они приведены на стр. 9.

На стр. 12 дана таблица высших разовых и суточных доз ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств для детей. В основу взята таблица доз для детей из X издания Государственной фармакопеи СССР, дополненная сведениями из книги М. Д. Машковского «Лекарственные средства» (М., 1967).

СОКРАЩЕНИЯ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ

СОКРАЩЕНИЯ РУССКИХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

В/в — внутривенно

В/м — внутримышечно

Вн. — внутрь

ГЖ. — густая жидкость (консистенция лекарственного средства)

Дек. — декокт, отвар

Држ. — драже

ЕД — единица действия

Ж. — жидкость (консистенция лекарственного средства)

Инф. — инфуз, настой

Кпл. — капли

Кпс. — капсулы

ЛЕД — лягушачьи единицы действия

Мз. — мазь

Мкс. — микстура

млн. — миллион

мт р. — мутный раствор

нр. — нерастворим

(оф.) — официальная форма лекарства, имеющегося в аптеке в готовом виде, которое выписывается сокращенным способом, без указания концентрации, дозы и состава

П. — порошок (как консистенция лекарственного средства)

П. в. р. — порошок, растворимый в воде

П/к — подкожно

Пл. — пилюли

Плс. — пластырь

Пр — порошки, присыпки (как твердая лекарственная форма)

Пст. — паста

Р-ры — растворы

Сб. — сборы
Спп. — суппозитории — свечи
Срп. — сироп
Тб. — таблетки
тр. — труднорастворимый
Фл. — флакон
Ш. — шарики — вагинальные суппозитории
Эм. — эмульсия

СОКРАЩЕНИЯ ЛАТИНСКИХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

аа — ана — по (поровну)
ас. — acidum — кислота
амр. — ampulla — ампула
ақ. — aqua — вода
cort. — cortex — кора
Dec. — decoctum — отвар — декокт
D. t. d. — Dentur tales doses — отпустить таких доз
D. S. — Detur Signetur — отпусти и обозначь
Emuls. — emulsum — эмульсия
Empl. — пластырь
Extr. — extractum — экстракт
fl. — flos — цветок
fol. — folium — лист
gtts. — guttas — капель
hb. — herba — трава
in caps. gelat. — в желатиновых капсулах
Inf. — infusum — настой — инфуз
Lin. — linimentum — жидкая мазь — линимент
Liq. — liquor — жидкость
M. D. S. — Misce. Da. Signa — Смешай. Дай. Обозначь
Ol. — oleum — масло
per se — сам собой (в чистом виде)
rad. — radix — корень
rhiz. — rhizoma — корневище
Sol. — Solutio — раствор
Suppos. — suppositoria — свечи
Suppos. vaginalis — влагалищные свечи
Susp. — suspensio — суспензия, взвесь.

ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВА ДЛЯ АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ ¹

1. Рецепты должны выписываться разборчиво и четко на форменных бланках единого образца, желательно отпечатанных типографским способом (см. стр. 26).

2. На одном рецептурном бланке прописывается только одно лекарство, содержащее ядовитое вещество, и не более двух лекарств — в остальных случаях.

3. Рецепты выписываются чернилами, исправления в рецептах не допускаются.

4. При необходимости экстренного отпуска лекарства больному врач пишет на видном месте рецепта сверху бланка: Cito! (Быстро!) или Statim! (Немедленно!).

5. На всех без исключения рецептах должны иметься следующие обязательные обозначения, последовательно:

а) штамп медицинского учреждения с обозначением адреса учреждения и номера телефона (на рецепте частного практикующего врача указывается фамилия, домашний адрес врача и его номер телефона);

б) инициалы и фамилия больного (для детей и лиц старше 60 лет указывается возраст больного);

в) дата выдачи рецепта (число, месяц, год);

г) фамилия и инициалы врача (разборчиво) или штампик с обозначением его фамилии;

д) состав лекарств, т. е. латинское наименование ингредиентов и их количество. Сокращение обозначений, близких

¹ Выписка из приложения к приказу по Министерству здравоохранения СССР от 21 января 1959 г., № 24.

по наименованию ингредиентов, не позволяющее установить, какое именно лекарственное средство прописано, не допускается;

е) обозначение лекарственной формы и другие указания фармацевту (по принятому сокращению);

ж) способ применения лекарства (на русском или местном языке). При этом запрещается ограничиваться общими указаниями «внутреннее», «известно» и т. д., а необходимо указать способ применения с обозначением дозы и (в необходимых случаях) времени приема. Например: «По одной таблетке 3 раза в день за $\frac{1}{4}$ ч до еды» и т. д.;

з) личная подпись врача.

6. Рецепты на лекарства, содержащие ядовитые вещества списка А (и этиловый спирт), должны иметь, кроме обозначений, перечисленных в пункте 5, печать медицинского учреждения (круглую или треугольную) или личную печать врача, если рецепт выписывается частнопрактикующим врачом. Рецепты на лекарства, в состав которых входят наркотические вещества, оформляются согласно особым указаниям Министерства здравоохранения СССР.

7. При необходимости повторить больному выписанное лекарство врач обязан указать об этом в рецепте на видном месте, скрепив эту надпись своей подписью. При выписывании копии рецепта (сигнатуры) это указание заверяется подписью рецептара аптеки. Для повторения лекарства, содержащего наркотическое вещество или этиловый спирт, врач должен выписать больному новый рецепт.

8. Прописывая ядовитое или сильнодействующее вещество в дозе, превышающей высший однократный прием, врач обязан написать дозу этого вещества прописью и поставить восклицательный знак. При несоблюдении врачом этого требования фармацевт аптеки обязан уточнить у врача дозу по телефону или письменно (в запечатанном конверте) и лишь после получения ответа отпустить прописанное лекарство в соответствующей дозировке.

В случае невозможности по той или иной причине объяснить с врачом прописанное лекарственное средство отпускается в половине той дозы, которая установлена как высшая.

9. Рецепт на лекарство, содержащее ядовитое или сильнодействующее вещество, действителен в течение не более 30 дней со дня его выдачи. По истечении указанного срока

рецепт считается недействительным и аптекой не принимается.

10. Врач несет личную ответственность за неправильно выписанный им рецепт.

11. Рецепт, не отвечающий хотя бы одному из требований настоящих правил или содержащий несовместимые лекарственные вещества, считается недействительным и лекарство по нему не изготавливается; врач, выдавший такой рецепт, или главный врач лечебного учреждения обязаны обеспечить своевременное возобновление требуемого для больного рецепта.

12. При поступлении в аптеку неправильно выписанного рецепта с него снимается копия в двух экземплярах. Подлинник рецепта погашается аптекой отметкой на рецепте «Рецепт недействителен» и возвращается больному. Один экземпляр копии немедленно направляется главному врачу лечебного учреждения, откуда поступил рецепт, или руководителю местного органа здравоохранения — в случае выдачи рецепта средним медперсоналом или частнопрактикующим врачом. Второй экземпляр копии хранится в аптеке отдельно от прочих документов в течение 1 года.

13. Органы здравоохранения и руководители медицинских учреждений обязаны во всех случаях выписывания рецептов с нарушением настоящих правил принимать строгие меры воздействия к виновным в этом лицам.

ВЫСШИЕ РАЗОВЫЕ И СУТОЧНЫЕ ДОЗЫ ЯДОВИ СРЕДСТВ

Дозы выражены в граммах либо, где это указано, в миллилитрах, каплях или единицах действия — ЕД. Если не указан способ применения, это означает количество препарата для приема внутрь

Наименование лекарственного средства	До 6 месяцев		От 6 месяцев до 1 года		2
	разовая	суточная	разовая	суточная	разовая
Arseni trioxylum (А), ФХ	Не назначают				0,0002
Acidum hydrochloricum dilutum (Б), ФХ	1 капля	3 капли	2 капли	6 капель	2 капли
Acidum nicotinicum (Б), ФХ	0,005	0,015	0,003	0,024	0,01
Acrichinum (Б), ФХ	0,0125	0,025	0,0125	0,025	0,025
Adonisidum (Б), ФХ	1 капля	2 капли	2 капли	4 капли	3 капли
Adrenalini hydrochloridum—solutio 0,1% (Б), ФХ (под кожу)	0,1 мл	0,3 мл	0,15 мл	0,5 мл	0,2 мл
Aethaminalum-natrium (Б), ФХ	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
Aethazolum (Б), ФХ	0,2 на 1 кг веса ребенка в сутки				
Aethylmorphini hydrochloridum (А), ФХ	Не назначают				0,003
Amidopyrinum ² (Б), ФХ	0,025	0,075	0,05	0,15	0,05
Aminarsonum (А), ФХ	0,04	0,12	0,08	0,24	0,1
Aminazinium (Б), ФХ	0,005—0,0075	0,01—0,015	0,01	0,02	0,015
Aminochinolum (Б)	0,025	0,05—0,075	0,025	0,05—0,075	0,05
Anaesthesinum (Б), ФХ	0,025	0,075	0,04	0,12	0,05
Analginum (Б), ФХ	0,025	0,075	0,05	0,15	0,1
Antipyrinum (Б), ФХ	Не назначают		0,05	0,15	0,075

ТЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ¹

года		3—4 года		5—6 лет		7—9 лет		10—14 лет	
	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная
	0,0006	0,0003	0,001	0,0005	0,0015	0,00075	0,002	0,001	0,003
	6 капель	3 капли	9 капель	5 капель	15 капель	7—8 ¹ капель	20 капель	8—10 капель	30 капель
	0,03	0,015	0,045	0,025	0,075	0,03	0,09	0,05	0,15
	0,05	0,04	0,08	0,05	0,1	0,075	0,15	0,1—0,125	0,2—0,25
	6 капель	5 ¹ капель	10 капель	6 капель	12 капель	8 капель	15 капель	10—15 капель	20—30 капель
	0,6 мл	0,25 мл	0,75 мл	0,4 мл	1,2 мл	0,5 мл	1,5 мл	0,75 мл	2 мл
	0,04	0,025— 0,03	0,05—0,06	0,04	0,08	0,05— 0,075	0,1—0,15	0,1—0,15	0,2—0,3
		0,35	2,0	0,4	2,5	0,5	3,0	0,5	3,0
	0,01	0,005	0,015	0,006	0,018	0,0075	0,025	0,01	0,03
	0,15	0,075	0,2	0,1	0,3	0,15	0,45	0,2—0,3	0,6—0,9
	0,3	0,15	0,45	0,15	0,45	0,2	0,5	0,25	0,75
	0,03	0,025	0,05	0,05	0,1	0,075	0,15	0,1	0,2
	0,1—0,15	0,075	0,15— 0,225	0,1	0,2—0,3	0,15	0,3—0,45	0,15—0,2	0,3—0,6
	0,18	0,08	0,24	0,12	0,36	0,16	0,5	0,2	0,6
	0,3	0,15	0,45	0,2	0,6	0,25	0,75	0,3—0,5	0,9—1,5
	0,2	0,1	0,3	0,15	0,45	0,2	0,6	0,25—0,3	0,75—0,9

Наименование лекарственного средства	До 6 месяцев		От 6 месяцев до 1 года		2	
	разовая	суточная	разовая	суточная	разовая	
Apomorphini hydrochloridum (A), ФХ (внутрь)	Не назначают				0,001	
Apomorphini hydrochloridum (A), ФХ (под кожу — однократно)	Не назначают				0,002	
Atropini sulfas (A), ФХ	0,0001	0,0002	0,0002	0,0004	0,0002	
Barbamylum (Б), ФХ	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	
Barbitalum (Veronalum) (Б), ФХ	0,03	0,06	0,075	0,15	0,1	
Barbitalum-natrium (Medinalum) (Б), ФХ	0,03	0,06	0,075	0,15	0,1	
Benzylpenicillinum-natrium (Benzylpenicillinum-kalium) (Б), ФХ (под кожу и внутримышечно)	50 000 ЕД	100 000 ЕД	100 000 ЕД	200 000 ЕД	125 000 ЕД	
Bigumalum (Б), ФХ	0,0125	0,025	0,0125	0,025	0,025	
Biliochinolum (Б)	0,5 мл	—	0,8 мл	—	1 мл	
Bromisovalum (Б), ФХ	0,05	0,1	0,1	0,2	0,15	
Butadionum (Б), ФХ	Не назначают		0,01	0,03	0,02	
Carbromalum (Adalinum) (Б), ФХ	Не назначают		0,1	0,2	0,15	
Chingaminum (Б), ФХ	1-й день лечения 2-й и 3-й день лечения			0,05 0,025		
Chloralum hydratum (Б), ФХ (внутрь и в клизме)	0,1	0,3	0,15	0,45	0,2	
Chlortetracyclini hydrochloridum (Bio-mycinum) (Б), ФХ	0,025 на 1 кг веса ребенка в сутки					
Codelinum (Б), ФХ	Не назначают				0,002	

года		3—4 года		5—6 лет		7—9 лет		10—14 лет	
суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	
0,003	0,0015	0,0045	0,002	0,006	0,0025	0,0075	0,003	0,009	
0,002	0,0025	0,0025	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003— 0,004	0,003— 0,004	
0,0004	0,00025	0,0005	0,0003	0,0006	0,0004	0,0008	0,0005	0,001	
0,04	0,025— 0,03	0,05—0,06	0,04	0,08	0,05— 0,075	0,1—0,15	0,1—0,15	0,2—0,3	
0,2	0,15	0,3	0,2	0,4	0,25	0,5	0,3	0,6	
0,2	0,15	0,3	0,2	0,4	0,25	0,5	0,3	0,6	
250 000 ЕД	200 000 ЕД	400 000 ЕД	250 000 ЕД	500 000 ЕД	300 000 ЕД	600 000 ЕД	375 000 ЕД	750 000 ЕД	
0,05	0,03—0,04	0,06—0,08	0,04—0,05	0,08—0,1	0,075	0,15	0,1—0,125	0,2—0,25	
—	1,5 мл	—	1,5 мл	—	2 мл	—	2,5 мл	—	
0,3	0,2	0,4	0,25	0,5	0,3	0,6	0,3—0,4	0,6—0,8	
0,06	0,03	0,09	0,04	0,12	0,05—0,06	0,15—0,18	0,08—0,1	0,24—0,3	
0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,25	0,5	0,3—0,4	0,6—0,8	
1-й день лечения 2-й и 3-й день лечения		0,125 0,05	1-й день лечения 2-й и 3-й день лечения			0,25 0,125	1-й день лечения 2-й и 3-й день лечения	0,5 0,25	
0,6	0,25	0,75	0,3	0,9	0,4	1,2	0,5—0,75	1,5—2,0	
	0,075	0,3	0,1	0,4	0,15	0,6	0,2—0,3	0,8—1,0	
0,006	0,004	0,012	0,005	0,015	0,006	0,02	0,006— 0,01	0,02—0,03	

Наименование лекарственного средства	До 6 месяцев		От 6 месяцев до 1 года		2	
	разовая	суточная	разовая	суточная	разовая	
Codeini phosphas (Б), ФХ	Не назначают		0,0025	0,0075	0,004	
Coffeinum (Б), ФХ	Не назначают				0,04	
Coffeinum-natrii benzoas (Б), ФХ (внутрь и под кожу)	0,05	0,15	0,06	0,18	0,07	
Corazolium (Б), ФХ (внутрь и под кожу)	0,02	0,04	0,02	0,06	0,03	
Cordiaminum (Б), ФХ (внутрь)	2 капли	6 капель	3 капли	9 капель	4 капли	
Cordiaminum (Б), ФХ (под кожу)	0,1 мл	0,2 мл	0,1 мл	0,2 мл	0,15 мл	
Cytitonum (Б), ФХ (в вену и внутримышечно)	0,15 мл	0,3 мл	0,15 мл	0,3 мл	0,2 мл	
Dibazolium (Б), ФХ (для лечения заболеваний нервной системы)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	
Digalen-neo (Б), ФХ (внутрь)	1 капля	3 капли	2 капли	6 капель	4 капли	
Digalen-neo (Б), ФХ (под кожу)	0,05 мл	0,15 мл	0,1 мл	0,3 мл	0,12 мл	
Dimedrolum (Б), ФХ	0,002	0,006	0,005	0,015	0,01	
Diprazinum (Б), ФХ	0,008—0,01	0,016—0,03	0,008—0,01	0,016—0,03	0,008—0,01	
Emetini hydrochloridum (Б), ФХ (под кожу и внутримышечно)	Не назначают		0,0025	0,005	0,005	
Ephedrini hydrochloridum (Б), ФХ (внутрь)	0,0025	0,0075	0,006	0,02	0,01	
Ephedrini hydrochloridum (Б), ФХ (под кожу)	0,002	0,006	0,005	0,015	0,008	
Erythromycinum (Б), ФХ	0,005—0,008 на 1 кг веса ребенка на пр					
Euphyllinum (Б), ФХ	Не назначают		0,01 *	0,03	0,02	
Extractum Belladonnae siccum (Б), ФХ	Не назначают		0,0025	0,0075	0,003	

года		3—4 года		5—6 лет		7—9 лет		10—14 лет	
суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	
0,012	0,003	0,015	0,006— 0,003	0,02— 0,025	0,01	0,03	0,015— 0,02	0,045— 0,06	
0,12	0,05	0,15	0,06	0,18	0,075	0,25	0,075—0,1	0,25—0,3	
0,2	0,08	0,25	0,1	0,3	0,15	0,5	0,15—0,2	0,5—0,6	
0,09	0,05	0,15	0,06	0,18	0,075	0,2	0,03	0,25	
12 капель	5 капель	15 капель	6 капель	18 капель	7—8 капель	20—25 капель	10—15 капель	30—40 капель	
0,3 мл	0,25 мл	0,5 мл	0,3 мл	0,6 мл	0,5 мл	1 мл	0,8 мл	1,5 мл	
0,4 мл	0,25 мл	0,5 мл	0,3 мл	0,6 мл	0,4 мл	0,8 мл	0,6 мл	1,2 мл	
0,002	0,004	0,004	0,005	0,005	0,006	0,006	0,008	0,008	
12 капель	6 капель	18 капель	7 капель	21 капля	8 капель	24 капли	10 капель	30 капель	
0,36 мл	0,2 мл	0,6 мл	0,25 мл	0,75 мл	0,3 мл	1 мл	0,4—0,5 мл	1,2—1,5 мл	
0,03	0,015	0,045	0,02	0,06	0,03	0,09	0,04	0,1	
0,016— 0,03	0,008— 0,01	0,016— 0,03	0,08—0,01	0,016— 0,03	0,012— 0,015	0,024— 0,045	0,012— 0,015	0,024— 0,045	
0,01	0,005	0,01	0,015	0,03	0,015	0,03	0,02	0,04	
0,03	0,015	0,045	0,015	0,045	0,02	0,06	0,025	0,075	
0,025	0,01	0,03	0,012	0,036	0,015	0,045	0,015— 0,02	0,045— 0,06	
нем	0,125	0,5	0,15	0,6	0,2	0,8	0,25	1,0	
0,06	0,03	0,09	0,05	0,15	0,075	0,25	0,1	0,3	
0,009	0,004	0,012	0,005	0,015	0,0075	0,025	0,01— 0,015	0,03— 0,045	

Наименование лекарственного средства	До 6 месяцев		От 6 месяцев до 1 года		2
	разовая	суточная	разовая	суточная	разовая
Extractum Filicis maris spissum (Б), ФХ	Не назначают				1,0
Extractum Opli siccum (А), ФХ	Не назначают				
Extractum Strychni siccum (А)	Не назначают				0,001
Follum Digitalis (Б), ФХ	0,005	0,02	0,01	0,04	0,02
Furazolidonum (Б), ФХ	10 мг на 1 кг				
Furazolinum (Б)	0,01— 0,015	0,03— 0,045	0,01— 0,015	0,03— 0,045	0,02
Galanthamini hydrobromidum (А), ФХ (под кожу)	Не назначают		0,00025	0,0005	0,0005
Gitalenum (Б)	2 капли	4 капли	2 капли	4 капли	3 капли
Halochinum (Б)	0,025	—	0,025	—	0,05
Herba Adonidis vernalis (Б), ФХ	0,03	0,12	0,05	0,2	0,1
Herba Thermopsidis (Б), ФХ	0,005	0,015	0,005	0,015	0,01
Hydrargyri monochloridum (Calomelas) (Б)	Не наз				
Isoniazidum (Tubazidum) (Б), ФХ	0,01—0,02 на 1				
Laevomycesinum (Б), ФХ	Разовая 0,02, суточная 0,12 на 1 кг веса				
Lantosidum (Б), ФХ	1 капля	3 капли	2 капли	6 капель	3 капли
Liquor Kalii arsenitis (А), ФХ	Не назначают				1 капля
Lobelini hydrochloridum (А) (в вену)	0,001	0,002	0,0015	0,003	0,002
Mercusalum (Б) (в мышцы)	0,1 мл	0,1 мл	0,15 мл	0,15 мл	0,2 мл
Methandrostenolonum (Б)	0,0001 на 1 кг веса ребенка на прием				

Продолжение

года	3—4 года		5—6 лет		7—9 лет		10—14 лет	
суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная
1,0	1,5—2,0	1,5—2,0	2,5—3,0	2,5—3,0	3,5—4,0	3,5—4,0	5,0	5,0
	0,0025	0,0075	0,005	0,015	0,0075	0,025	0,01	0,03
0,005	0,002	0,006	0,003	0,009	0,004	0,012	0,006	0,018
0,08	0,03	0,12	0,04	0,16	0,05	0,2	0,05— 0,075	0,2—0,3

веса ребенка в сутки в 3-4 приема при лямблиозе

0,04— 0,06	0,03	0,08— 0,12	0,05	0,15—0,2	0,05	0,15—0,2	0,05	0,15—0,2
0,001	0,001	0,002	0,0025	0,005	0,003	0,006	0,005	0,01
6 капель	4 капли	8 капель	6 капель	12 капель	7 капель	14 капель	8—14 капель	16—30 капель
	0,075	—	0,1	—	0,15	—	0,15—0,25	—
0,4	0,15	0,6	0,2	0,8	0,3	1,2	0,3—0,5	1,2—2,0
0,03	0,015	0,045	0,02	0,06	0,025	0,075	0,03—0,05	0,1—0,15
начают					0,05	0,15	0,05— 0,075	0,15—0,2

кг веса ребенка, но не более 0,5 в сутки (в три приема)

ребенка	0,25	1,5	0,25	1,5	0,3	1,8	0,4	2,0
9 капель	5 капель	15 капель	6 капель	18 капель	10 капель	30 капель	15 капель	45 капель
3 капли	1 капля	3 капли	2 капли	6 капель	2 капли	6 капель	3 капли	9 капель
0,004	0,002	0,004	0,0025	0,005	0,003	0,006	0,004	0,008
0,2 мл	0,25 мл	0,25 мл	0,4 мл	0,4 мл	0,6 мл	0,6 мл	0,75 мл	0,75 мл
	0,002	—	0,005	—	0,005	—	0,005	—

Наименование лекарственного средства	До 6 месяцев		От 6 месяцев до 1 года		2
	разовая	суточная	разовая	суточная	разовая
Morphini hydrochloridum (A), ФХ	Не назначают				0,001
Myarsenolum ³ (A), ФХ (в мышцы)	0,03—0,15	—	0,05—0,15	—	0,05—0,2
Natrili arsenas (A), ФХ	Не назначают				0,0003
Natrili nitris (Б), ФХ (внутри)	Не назначают				
Natrii nitris (Б), ФХ (в вену)	Не назначают				
Nystatinum (Б)	125 000 ЕД	125 000 ЕД	125 000 ЕД	125 000 ЕД	250 000 ЕД
Norsulfazolum (Б), ФХ	0,2 на 1 кг веса ребенка в сутки				
Novarsenolum ⁴ (A), ФХ (в вену)	0,03—0,15	—	0,05—0,15	—	0,05—0,2
Oleandomycini phosphas (Б)	20 000 ЕД на 1 кг веса ребенка в сут				
Oletetrinum (Б)	Детям весом до 10 кг » » от 10 до 15 кг » » » 15 » 20 » » » » 20 » 30 » » » » 30 » 40 » » » » 40 » 50 »			— — — — — —	0,025 0,25 0,375 0,5 0,75 1,0
Omnoponium (A), ФХ	Не назначают				0,002
Opium pulveratum (A), ФХ	Не назначают				
Oxazylum (A), ФХ	Не назначают		0,0015	0,0015	0,0025
Oxytetracyclini dihydraz (Б) ФХ	0,025 на 1 кг веса ребенка в сутки				
Oxytetracyclini hydrochloridum (Б), ФХ	0,025 на 1 кг веса ребенка				
Papaverini hydrochloridum (Б), ФХ	Не назначают		0,005	0,01	0,01
Parathyreoidinum (Б) (под кожу и в мышцы)	0,25 мл	—	0,4 мл	—	0,6 мл

Продолжение

года		3—4 года		5—6 лет		7—9 лет		10—14 лет	
суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	
0,002	0,0015	0,003	0,0025	0,0075	0,003	0,01	0,003— 0,005	0,01— 0,015	
—	0,1—0,3	—	0,1—0,3	—	0,1—0,3	—	0,1—0,3	—	
0,001	0,0005	0,0015	0,0005	0,0015	0,001	0,003	0,0015	0,0045	
			0,05	0,15	0,05	0,2	0,1	0,3	
			0,012	0,03	0,016	0,05	0,02	0,06	
750 000 ЕД	250 000— 350 000 ЕД	1 000 000— 1 500 000 ЕД	250 000— 350 000 ЕД	1 000 000— 1 500 000 ЕД	250 000— 350 000 ЕД	1 000 000— 1 500 000 ЕД	250 000— 350 000 ЕД	1 000 000— 1 500 000 ЕД	
	0,35	2,0	0,4	2,5	0,5	3,0	0,5	3,0	
—	0,1—0,3	—	0,1—0,3	—	0,1—0,3	—	0,15—0,3	—	
ки	60 000— 125 000 ЕД	250 000— 500 000 ЕД	60 000— 125 000 ЕД	250 000— 500 000 ЕД	125 000— 250 000 ЕД	500 000— 1 000 000 ЕД	125 000— 250 000 ЕД	500 000— 1 000 000 ЕД	

на 1 кг в сутки

в сутки (делят на 4-6 приемов)

0,004	0,003	0,006	0,005	0,015	0,006	0,02	0,0075— 0,01	0,02—0,03
	0,005	0,015	0,01	0,03	0,015	0,045	0,015— 0,02	0,045— 0,05
0,0025	0,003	0,003	0,004	0,004	0,006	0,006	0,0075— 0,01	0,0075— 0,01
	0,15	0,3	0,2	0,4	0,25	0,5	0,3	0,6
в сутки			0,2	0,4	0,2—0,25	0,4—0,5	0,25—0,3	0,5—0,6
0,02	0,015	0,03	0,02	0,04	0,03	0,06	0,05—0,06	0,15—0,2
—	0,8 мл	—	1 мл	—	1,5 мл	—	2 мл	—

Наименование лекарственного средства	До 6 месяцев		От 6 месяцев до 1 года		2	
	разовая	суточная	разовая	суточная	разовая	
Phenobarbitalum (Luminalum) (Б), ФХ	0,005	0,01	0,01	0,02	0,02	
Phenoxymethylpenicillinum (Б), ФХ	0,015 на 1 кг веса ребенка в сут					
Phthivazidum (Б), ФХ	0,04 на 1 кг веса ребенка в сут					
Pituitrinum (Б) (под кожу)	0,5 ЕД	1 ЕД	0,75 ЕД	1,5/ЕД	1,25 ЕД	
Plasmocidum (А), ФХ	Не назначают				0,005	
Platyphyllini hydrotartras (А), ФХ (внутрь и под кожу)	0,0004	0,0012	0,0006	0,0025	0,001	
Prednisolonum (Б), ФХ	0,001 на 1 кг веса ребенка					
Prednisonum (Б), ФХ	0,001 на 1 кг веса ребенка					
Promedolum (А) ФХ (внутрь)	Не назначают				0,005	
Promedolum (А), ФХ (под кожу)	Не назначают				0,003	
Proserinum (А), ФХ (внутрь)	Не назначают		0,001	0,001	0,002	
Proserinum — solutio 0,05% (А), ФХ (под кожу)	Не назначают		0,1 мл	0,1 мл	0,2 мл	
Radix Ipecacuanhae (Б) (как отхаркивающее средство)	0,005	0,02	0,01	0,04	0,01	
Rifadinum (Б)	0,1—0,2 на 1 кг веса ребен					
Solutio Iodi spiritiosa 5% (Б), ФХ	Не назнача					
Solutio Strophanthini К 0,05% (А), ФХ (внутривенно)	0,05 мл	0,05 мл	0,05 мл	0,05 мл	0,1 мл	
Streptocidum (Б), ФХ	0,2 на 1 кг веса ребенка в сут					

года		3—4 года		5—6 лет		7—9 лет		10—14 лет	
	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная
	0,04	0,03	0,06	0,04	0,08	0,05	0,1	0,075	0,15
ки		0,1	0,2	0,125	0,25	0,15	0,3	0,2	0,4
ки		0,3	0,6	0,35	0,7	0,4	0,8	0,5—0,75	1,0—1,5
	2,5 ЕД	1,5 ЕД	3 ЕД	2 ЕД	5 ЕД	3 ЕД	7,5 ЕД	5 ЕД	10 ЕД
	0,01	0,0075	0,015	0,01	0,02	0,015	0,03	0,02— 0,025	0,04—0,05
	0,003	0,0015	0,0045	0,0025	0,0075	0,003	0,009	0,005	0,015
в сутки				—	0,02	—	0,025— 0,03	—	0,025— 0,04
в сутки				—	0,02	—	0,025— 0,03	—	0,025— 0,04
	0,01	0,0075	0,015	0,01	0,02	0,01	0,02	0,015	0,03
	0,006	0,005	0,01	0,0075	0,015	0,0075	0,015	0,01	0,02
	0,002	0,003	0,003	0,005	0,005	0,007	0,007	0,01	0,01
	0,2 мл	0,3 мл	0,3 мл	0,5 мл	0,5 мл	0,6 мл	0,6 мл	0,75 мл	0,75 мл
	0,04	0,015	0,06	0,02	0,03	0,02	0,08	0,025	0,1
ка в сутки в два приема									
ют				4 капли	12 капель	5 капель	15 капель	8 капель	24 капли
	0,1 мл	0,15 мл	0,15 мл	0,2 мл	0,2 мл	0,25 мл	0,25 мл	0,25— 0,5 мл	0,5 мл
ки		0,35	2,0	0,4	2,5	0,5	3,0	0,5	3,0

Наименование лекарственного средства	До 6 месяцев		От 6 месяцев до 1 года		2	
	разовая	суточная	разовая	суточная	разовая	
Streptomycini sulfas (Б), ФХ (внутримышечно)	0,02 на 1 кг веса ребенка в сут					
Strychnini nitras (А), ФХ	Не назначают				0,00025	
Sulfacylum-natrium (Б), ФХ	0,2 на 1 кг веса ребенка в сут					
Sulfadimezinum (Б), ФХ	0,2 на 1 кг веса ребенка в сут					
Sulginum (Б), ФХ	0,2 на 1 кг веса ребенка в сут					
Synthomycinum (Б)	Разовая — 0,02, суточная — 0,12 на					
Tabulettae «Aëronum» (Б)	Не назна					
Tetracyclinum (Б), ФХ	0,025 на 1 кг веса ребенка в сут					
Theophyllinum (Б), ФХ	Не назначают				0,04	
Thymolum (Б), ФХ	Не назначают				0,05	
Thyreoidinum (Б), ФХ	0,01	0,03	0,02	0,06	0,03	
Tinctura Belladonnae (Б), ФХ	1 капля	3 капли	1 капля	3 капли	2 капли	
Tinctura Opii simplex (А), ФХ	Не назнача					
Tinctura Strychni (Б), ФХ	Не назначают				1 капля	
Vikasolum (Б), ФХ	0,002— 0,005	0,006— 0,015	0,002— 0,005	0,006— 0,015	0,006	

¹ Если в графе указаны две дозы, то первая относится к детям младшего воз-

² При лечении ревматизма допускается увеличение суточной дозы до 0,15—0,2

³ Вводить не чаще одного раза в 5 дней.

⁴ Вводить не чаще одного раза в 5 дней.

года		3—4 года		5—6 лет		7—9 лет		10—14 лет	
	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная	разовая	суточ- ная
ки		0,15	0,3	0,175	0,35	0,2	0,4	0,25	0,5
	0,0005	0,0003	0,0006	0,0005	0,001	0,0006— 0,00075	0,0012— 0,0015	0,00075— 0,001	0,0015— 0,002
ки		0,35	2,0	0,4	2,5	0,5	3,0	0,5	3,0
ки		0,35	2,0	0,4	2,5	0,5	3,0	0,5	3,0
ки		0,35	2,0	0,4	2,5	0,5	3,0	0,5	3,0
1 кг веса ребенка				0,2	1,2	0,3	1,8	0,4—0,5	2,4—3,0
чают						1 таб- летка	2 таб- летки	1,5 таб- летки	3 таб- летки
ки		0,15	0,3	0,2	0,4	0,25	0,5	0,3	0,6
	0,12	0,05	0,15	0,06	0,2	0,08	0,25	0,1	0,3
	0,2	0,1	0,4	0,15	0,6	0,25	1,0	0,3	1,2
	0,09	0,05	0,15	0,075	0,25	0,1	0,3	0,15	0,45
	6 капель	3 капли	9 капель	3 капли	9 капель	4 капли	12 капель	4—6 капель	12—18 капель
ют		1—2 капли	2—4 капли	3 капли	6 капель	4 капли	8 капель	5—7 капель	10—15 капель
	2 капли	2 капли	4 капли	3 капли	6 капель	4 капли	8 капель	5—6 капель	10—12 капель
	0,018	0,008	0,025	0,01	0,03	0,01	0,03	0,015	0,045

раста, а вторая — к детям старшего возраста,
на 1 год жизни.

**Образец
рецептурного бланка**
(размер бланка 85 X 150 мм)

Штамп
медицинского учреждения

Ф. И. О. и возраст больного _____

Дата _____

Ф. И. О. врача _____

Место
для
такси-
ровки

Rp.: _____

М. П.

Подпись врача

Глава I

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

СРЕДСТВА ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА

Фторотан Phthorothanum (Б), ФХ (1,1,1-трифтор-2-хлор-2-бром-этан)	Ж. Фл. 50,0; 250,0
---	--------------------

Rp.: Phthorothani 250,0
D. t. d. N. 2
S. Для ингаляционного наркоза

Хлорэтил Aethylchloridum (Б), ФХ	Ж. Ампл. 30,0
-------------------------------------	---------------

Rp.: Aethylchloridi 30,0
D. t. d. N. 1 in amp.
S. Только для очень кратковременного наркоза и для местной анестезии замораживанием

Хлороформ для наркоза Chloroformium pro narcosi (Б), ФХ	Ж. Фл. 50,0
---	-------------

Rp.: Chloroformii pro narcosi 50,0
D. S. Для ингаляционного наркоза

Эфир для наркоза Aether pro narcosi (Б), ФХ	Ж. Фл. 150,0
--	--------------

Rp.: Aetheris pro narcosi 150,0
D. t. d. N. 2
S. Для ингаляционного наркоза

СРЕДСТВА ДЛЯ НЕИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА ¹

Гексенал Hexenalum (Б), ФХ	Высшая разовая и суточная доза в вену 1,0. П. в. р. Пр. в амп. 1,0
-------------------------------	--

Rp.: Hexenali 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Для наркоза. Содержимое 1 ампулы растворить в 20 мл воды для инъекций. Вводить внутривенно до 20 мл 5% раствора

Нарколан Narcolanum (Б)	Высшая доза 0,1/кг. П. в. тр. Пр.
----------------------------	-----------------------------------

Rp.: Narcolani 3, 5
D. S. Для ректального базисного наркоза (растворить в 200 мл 35—38° воды для инъекций)

Тиобутал Thiobutalum (Б) [5 (1-метилтиозтил)-5-пентил (2')-2-тиобарбитурат натрия]	Высшая разовая доза в вену — 1,0. П. в. р. Пр. в амп. 1,0
---	---

Rp.: Thiobutali 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Для наркоза. Содержимое 1 ампулы растворить в 20 мл воды для инъекций; вводить медленно (1 мл в минуту) до 20 мл внутривенно

Тиопентал-натрий Thiopentalum-natrium (Б), ФХ	Высшая разовая и суточная доза в вену — 1,0. П. в. р. Пр. в амп. 0,5 и 1,0
--	--

Rp.: Thiopentali-natrii 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Для наркоза. Содержимое 1 ампулы растворить в 40 мл воды для инъекций; вводить внутривенно 10—12 мл (не более 40 мл на одно введение)

Зарубежные препараты

Виадрил «Г» (**) Viadrilum «G» (A) (натриевая соль 21-гидроокси-5β- прегнан-3,20-дион-21-гидро- генсукцината)	0,5. Амп. (оф.) емкостью 100 мл, содержащие 0,5 сухого веще- ства (растворитель прилагает- ся)
---	---

Rp.: Viadrili «G» 0,5
D. t. d. N. 1 in amp.
S. Растворить содержимое ампулы в прилагаемом раство-
рителе, ввести внутривенно в виде 0,5% раствора (как
обезболивающее средство в сочетании с газообразными
наркотическими средствами)

¹ См. также барбамил, этаминал-натрий.

Сомбревин (Венгрия) Sombrevinum (Б) [3-метокси-4-(N-диэтилкарбамил- метокси-фенил)-уксуснокислый пропиловый эфир]	В/в от 2—3 до 10—20 мг/кг. Амп. 10,0 — 5%
---	--

Rp.: Sol. Sombrevini 5% 10,0
 D. t. d. N. 5 in amp.
 S. Индивидуально: внутривенно от 2 до 10 мл в зависимости от возраста

СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА¹

ПРОИЗВОДНЫЕ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ И ДРУГИХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Барбамил Barbamylum (Б), ФХ	0,3 (0,6). П. в. р. Пр. Р-ры. Тб. 0,1 и 0,2
--------------------------------	--

Rp.: Barbamyli 0,1
 Sacchari 0,2
 M. f. pulv. D. t. d. N. 6
 S. По 1 порошку на ночь
 Rp.: Sol. Barbamyli 10% 10,0
 Sterilisetur!
 D. S. По 5—6 мл внутримышечно при судорогах
 Rp.: Barbamyli 0,2
 D. t. d. N. in tab.
 S. По 1 таблетке перед сном

Барбитал (веронал) Barbitalum (Veronalum) (Б), ФХ	0,5 (1,0). П. в. тр. Тб. 0,5
--	------------------------------

Rp.: Barbitali 0,5
 D. t. d. N. 10 in tab.
 S. По 1 таблетке на ночь

Барбитал-натрий (мединал) Barbitalum-natrium (Medinalum) (Б), ФХ	0,5 (1,0). П. в. р. Тб. 0,3. Р-ры
--	-----------------------------------

Rp.: Barbitali-natrii 0,3
 D. t. d. N. 6 in tab.
 S. По 1 таблетке на ночь
 Rp.: Barbitali-natrii 4,5
 Aq. destill. 90,0
 M. D. S. По 1 десертной ложке на ночь

¹ См. также седуксен, димедрол.

Гексобарбитал Hexobarbitalum (Б), ФХ [5-(1-циклогексен)-1,5-диметил- барбитуровая кислота]	0,5 (1,0). П. в. нр. Тб 0,25
Rp.: Hexobarbitali 0,25 D. t. d. N. 10 in tab. S. По 1—2 таблетки на ночь	
Тетридин Tetridinum (Б)	0,5 (1,5). П. в. р. Тб 0,1 и 0,2
Rp.: Tetridini 0,1 D. t. d. N. 6 in tab. S. По 1—2 таблетки на ночь	
Фенобарбитал (люминал) Phenobarbitalum (Luminalum) (Б), ФХ	0,2 (0,5). П. в. нр. Тб. 0,05 и 0,1
Rp.: Phenobarbitali 0,1 D. t. d. N. 10 in tab. S. По 1 таблетке на ночь	
Этаминал-натрий Aethaminalum-natrium (Б), ФХ	0,3 (0,6). П. в. р. Пр. Тб 0,1. Спп. Р-ры
Rp.: Aethaminali-natrii 0,1 D. t. d. N. 10 in tab. S. По 1 таблетке на ночь	
Rp.: Aethaminali-natrii 0,2 Butyri Cacao q. s. M. f. suppos. D. t. d. N. 6 S. По 1 свече на ночь в задний проход	
Rp.: Sol. Aethaminali-natrii 5% 10 ml Sterilisetur! D. S. По 5 мл внутривенно для снятия судорог	

СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА АЛИФАТИЧЕСКОГО РЯДА ¹

Бромизовал (бромурал) Bromisovalum (Bromuralum) (Б), ФХ	1,0 (2,0). П. в. тр. Тб. 0,3
Rp.: Bromisovali 0,3 D. t. d. N. 10 in tab. S. По 1—2 таблетки на ночь	
Карбромал (адалин) Carbromalum (Adalinum) (Б), ФХ	1,0 (2,0) П в тр. Тб. 0,3 и 0,5

¹ См. также уретан.

Rp.: Carbromali 0,3
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1—2 таблетки на ночь

Хлоралгидрат 2,0 (6,0). П. в. р. Р-ры
Chloralum hydratum (Б), ФХ

Rp.: Chlorali hydrati 1,0
Mucilaginis Amyli 15,0
Aq. destill. ad 50,0
M. D. S. На 1 клизму на ночь

Rp.: Chlorali hydrati 6,0
Mucilaginis Amyli 20,0
Aq. destill. ad 60,0
M. D. S. По 1 столовой ложке на ночь

Хлоробутанолгидрат (хлорэтон) 0,3—1,0. П. в. тр. Кпс. Спп.
Chlorobutanoli hydras (Chloretopum)

Rp.: Chlorobutanoli hydratis 0,3
D. t. d. N. 6 in caps. gelat.
S. По 1—2 капсулы на ночь

Rp.: Chlorobutanoli hydratis 0,5
Butyri Cacao q. s.
M. f. suppos. D. t. d. N. 6
S. По 1 свече на ночь в задний проход

Зарубежные препараты

Ноксирон (Венгрия) 1—2 тб. Тб. 0,25
Noxyronum (Б)
(α -фенил- α -этил-глутаримид)

Rp.: Noxyroni 0,25
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1—2 таблетки за 15 мин до сна

Радедорм (ГДР) 0,0025—0,01. Тб. 0,005
Radedormum (Б)
(1-3-дигидро-7-нитро-5-фенил-N-
-1-4-бензодиазопам-2-он)

Rp.: Radedormi 0,005
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки за полчаса до сна

Эуноктин (Венгрия) $\frac{1}{2}$ —1 тб. Тб. 0,01
Eunoclinum (Б)
(соответствует радедорму — ГДР)

Rp.: Tab. Eunoclini 0,01
D. t. d. N. 20
S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке за полчаса до сна

НЕЙРОЛЕПТИКИ (большие транквилизаторы) ¹

Аминазин Aminazinum (Б), ФХ [2-хлор-10-(3-диметил-аминопропил)-фенотиазина]	Вн. 0,3 (1,5); В/м 0,15 (1,0); В/в 0,05 (0,25). П. в. р. Држ. и Тб. 0,025, 0,05 и 0,1. Амп. 5,0 — 0,5%, 1,0 и 2,0 — 2,5%
---	---

Rp.: Sol. Aminazini 0,5% 5,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 5 мл внутримышечно в 5 мл 0,5% раствора новокаина

Rp.: Sol. Aminazini 2,5% 2,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 1—2 мл внутривенно в 10—20 мл 40% раствора глюкозы

Rp.: Dragée Aminazini 0,025

D. t. d. N. 20

S. По 1 драже 3 раза в день после еды

Мепазин Mepazinum (Б)	0,025—0,1. П. в. р. Држ. и Тб. 0,025 и 0,05. Амп. 1,0—2,5%
--	---

Rp.: Mepazini 0,025

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 1—3 раза в день после еды

Rp.: Sol. Mepazini 2,5% 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1—2 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Пропазин Propazinum (Б), ФХ [10-(3-диметиламинопропил)-фенотиазина гидрохлорид]	Вн 0,25 (2,0); В/м 0,15 (1,2). П. в. р. Држ. 0,025 и 0,05. Амп. 2,0—2,5%
---	---

Rp.: Dragée Propazini 0,025

D. t. d. N. 50

S. По 1—2 драже 2—4 раза в день после еды

Rp.: Sol. Propazini 2,5% 2,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 2 мл внутримышечно в 5 мл 0,5% раствора новокаина 2—3 раза в день

Трифтазин Triphthazinum (Б), ФХ (10-[3-(1-метилпиперазинил-4)-пропил]-2-(трифторметил)-фенотиазина дигидрохлорид)	0,001—0,01. П. в. р. Тб. и Држ. 0,001, 0,002, 0,005 и 0,01. Фл. 10,0—0,2% (стерильные)
---	---

Rp.: Triphthazini 0,001

D. t. d. N. 30 in tab.

S. По 1 таблетке 1—2 раза в день, постепенно повышая дозу на 2 таблетки в день (до получения хорошего эффекта)

¹ См. также резерпин, раунатин, раувазан, рауседил.

Rp.: Sol. Triphthazini 0,2% 10,0

D. S. По 1—2 мл внутримышечно 3—4 раза в день

Этаперазин

Aethaperazinum (Б)

(10-[3'-(4''(β-оксиэтил)-пипера-
зинил)-пропил]-2-хлорфенотиа-
зина дигидрохлорид)

0,002—0,05. П. в. р. Тб. 0,004
и 0,01

Rp.: Aethaperazini 0,004

D. t. d. N. 30 in tab.

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Зарубежные препараты

Галоперидол (Венгрия)

Haloperidolum (Б)

(4-фтор-4-[1-(4-окси-4-(хлор)-фе-
нил-пиперидино)]-бутирофе-
нон)

Суточные дозы 0,0015—0,005.

П. в. р. Тб. 0,0015. Фл. 10,0—

0,2%. Амп. 1,0—0,5%

Rp.: Sol. Haloperidoli 0,2% 10,0

D. S. По 10 капель 2—3 раза в день, постепенно увеличи-
вая дозу до 30 капель 3 раза в день

Rp.: Sol. Haloperidoli 0,5% 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 0,4—1 мл внутримышечно (для купирования пси-
хомоторного возбуждения)

Rp.: Haloperidoli 0,0015

D. t. d. N. 50 in tab.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Дроперидол (Венгрия)

Droperidolum (Б)

[N-(4-фторбензол)-пропил-1,2,3,
6-тетрагидро-4-пиридил-2-бен-
зимидазолинон]

0,025—0,05. П. в. р. Амп.

10,0—0,25%

Rp.: Sol. Droperidoli 0,25% 10,0

D. t. d. N. 5 in amp.

S. Внутривенно по 1—2 ампулы в 500 мл 5% раствора
глюкозы (как нейроплегическое средство, совместно
с фентанилом или отдельно при хирургических вмеша-
тельствах)

Левомепромазин (тизерцин) (Вен-
грия)

Laevomepromazinum (Tiser-
cinum) (Б)

[3-метокси-10-(2-метил-3-диметил
аминопропил)-фенотиазина ма-
леат]

0,05—0,25 (суточные дозы). П. в.

р. Тб. и држ. — 0,025. Амп.

1,0—2,5%

Rp.: Laevomepromazini 0,025

D. t. d. N. 100 in tab.

S. От 2 до 10 таблеток в день

Rp.: Sol. Laevomepromazini 2,5% 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1—2 мл внутримышечно 1—2 раза в сутки, постепенно увеличивая дозу до 10 мл в сутки

Мажептил (**)

0,001—0,01. П. в. р. Тб. 0,001

Mageptilum (Б)

и 0,01. Фл. 125,0 — 4%. Амп.

(3-диметилсульфонамидо-10-[3'-
(4''-метил-1''-пиперазинил)-про-
пил]-фенотиазин)

1,0—1%

Rp.: Mageptili 0,001

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Mageptili 1% 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1—2 мл внутривенно

Триседил (Венгрия)

1 тб. Тб. 0,0005

Trisedilum (Б)

(4'-фтор-4-1[гидроокси-4(3''-три-
фторметил)-фенилпиперидин-
бутирофенона]гидрохлорид)

Rp.: Tab. Trisedili N. 50

D. S. По 1 таблетке в день, постепенно повышая дозу на $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ таблетки в день, до эффективной

Френолон (Венгрия)

0,005—0,01. П. в. р. Држ. 0,005.

Frenolonum (Б)

Амп. 1,0—0,5%

Rp.: Dragée Frenoloni 0,005

D. t. d. N. 50

S. По 1 драже 3 раза в день, постепенно увеличивая дозу до 2 драже 3—4 раза в день

Rp.: Sol. Frenoloni 0,5% 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день (для стационарных больных постепенно увеличивать дозу до 6 мл в сутки)

ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ (малые транквилизаторы, атарактики)

Амизил

0,001—0,002. П. в. р. Пр. и Тб.

Amizylum (А)

0,001 и 0,002

(2-диэтиламиноэтилового эфира
бензиловой кислоты гидрохло-
рид)

Rp.: Tab. Amizyli 0,001

D. t. d. N. 20

S. По 1 таблетке 3—5 раз в день

Rp.: Sol. Amizyli 1% 5,0

D. S. Глазные капли (для расширения зрачка)

Мепротан 0,8 (3,0). П. в. р. Тб. 0,2 и 0,4
Meprrotanum (Б), ФХ
(2-метил-2-н-пропилпропандиола-
1,3-дикарбамат)

Rp.: Meprrotani 0,2
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Метамизил 0,0005—0,005. П. в. р. Пр. Тб.
Metamizylum (А) 0,001. Амп. 1,0—0,25%
(2-диэтиламино-пропиловый эфир
бензиловой кислоты гидрохлорид)

Rp.: Metamizyli 0,001
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день
Rp.: Sol. Metamizyli 0,25% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,2—1 мл подкожно 1—2 раза в день

Оксилидин 0,02—0,05. П. в. р. Тб. 0,02 и
Oxylidinum (Б), ФХ 0,05. Амп. 1,0—2 и 5%
(3-бензоил-оксихинуклидина гидрохлорид)

Rp.: Oxylidini 0,02
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день, постепенно увеличивая
дозу до 2 таблеток 3—4 раза в день
Rp.: Sol. Oxylidini 2% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день, постепенно увели-
чивая дозу до 2 мл 5% раствора два раза в день

Зарубежные препараты

Седуксен (Венгрия) 0,005—0,01. Тб. 0,005
Seduxenim (Б)
(7-хлор-1-3-дигидро-1-метил-5-фе-
нил-2н-1,4-бензодиазепин)

Rp.: Seduxeni 0,005
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 2—3 раза в день (в случае необхо-
димости дозу можно увеличить до 2 таблеток 3—4 раза
в день) ¹

¹ Как снотворное — на ночь 2 таблетки.

Триоксазин (Венгрия) 0,3—0,6. Тб. 0,3

Trioxazinum (Б)

[N-(3,4,5-триметоксибензоил)-те-
трагидро-1,4-оксазин]

Rp.: Trioxazini 0,3

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Элениум (либриум) (Польша)

0,02—0,08 в сутки. Држ. 0,01

Elenium (Librium) (Б)

(7-хлор-2-метиламино-5-фенил-
3н-1,4-бензодиазепин-4-оксида
гидрохлорид)

Rp.: Dragée Elenii 0,01

D. t. d. N. 100

S. По 1 драже 2 раза в день; в тяжелых случаях посте-
пенно увеличить дозу до 8 драже в сутки

СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

БРОМИДЫ

Аммония бромид
Ammonii bromidum

0,1—1,0. П. в. р. Р-ры. Мкс.

Рецепты см. ниже

Бромкамфора

Bromcamphora, ФХ

0,1—0,5. П. в. нр. Пр. Тб. 0,15
и 0,25. Кпс.

Rp.: Bromcamphorae 0,3

D. t. d. N. 20 in caps. gelat.

S. По 1 капсуле 2—3 раза в день

Rp.: Bromcamphorae 0,25

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Калия бромид

Kalii bromidum, ФХ

0,1—1,0. П. в. р. Р-ры. Мкс.

Рецепты см. ниже

Натрия бромид

Natrii bromidum, ФХ

0,1—1,0. П. в. р. Р-ры. Мкс.
Амп. 10,0—5,10 и 20%

Rp.: Natrii bromidi 3,0

Aq. destill. 90,0

M. D. S. По 1 столовой ложке на ночь

Rp.: Natrii bromidi
Ammonii bromidi \overline{aa} 2,0
Aq. destill. 200,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp.: Natrii bromidi
Kalii bromidi \overline{aa} 3,0
Aq. destill. 150,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp.: Natrii bromidi
Kalii bromidi \overline{aa} 3,0
Ammonii bromidi 1,0
Aq. destill. 150,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp.: Sol. Natrii bromidi 10% 10,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1—5 мл внутривенно 1 раз в день

КОМБИНИРОВАННЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ СЕДАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

Анбитал
Anbitalum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: анесте-
зина — 0,3, фенобарбитала —
0,05

Rp.: Tab. Anbitali N. 12
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Белластезин
Bellasthesinum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: ане-
стезина — 0,3, экстракта кра-
савки — 0,015

Rp.: Tab. Bellasthesini N. 20
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Беллатаминал
Bellataminalum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: эрго-
тамина тартрат — 0,0003, сум-
ма алкалоидов травы красав-
ки — 0,0001, фенобарбитал —
0,02

Rp.: Tab. Bellataminali N. 30
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Валериана — густой экстракт 0,04—0,05. ГЖ. Пл.
Extractum Valerianae spissum,
ФХ

Rp.: Extr. Valerianae spissi 1,2
Pulv. et extr. rad. Glycyrrhizae q. s.
M. f. pilulae N. 30
D. S. По 1 пилюле 2—3 раза в день

Валериана — корневище и ко- Сб. Инф. 1 : 30
рень
Rhizoma et radix Valerianae, ФХ

Rp.: Rhiz. et rad. Valerianae 50,0
D. S. 1 столовую ложку сбора заварить в стакане ки-
пятку; выпить в течение дня в 3 приема
Rp.: Inf. rhiz. et rad. Valerianae 6,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Валериана — настойка 20—30 клл.
Tinctura Valerianae, ФХ

Rp.: T-rae Valerianae 25,0
D. S. По 20—30 капель 2—3 раза в день

Валокормид 10—20 клл. Ж. (оф.) — состав:
Valocormidum (Б) настойка валерианы и на-
стойка ландыша — аа 10,0,
настойка красавки — 5,0, на-
трия бромид — 4,0, ментол —
0,25, вода дистиллирован-
ная — до 30,0

Rp.: Valocormidi 30,0
D. S. По 10—20 капель 3 раза в день

Корвалол 5—40 клл. Ж. (оф.) — состав:
Corvalolum этиловый эфир α-бромизова-
лериановой кислоты — 2%,
фенобарбитал натрия — 2%,
масло мятное — 0,14%, спирт
50%, вода — 45,86%. Фл. 20,0

Rp.: Corvaloli 20,0
D. S. По 20 капель 2—3 раза в день

Пассифлора инкарнатная — жид- 15—40 клл.
кий экстракт
Passiflora incarnata — extractum
fluidum

Rp.: Extr. Passiflorae incarnatae fluidi 40,0
D. S. По 20 капель 3 раза в день

Противорвотная смесь
Tabulettae Antivomicae

Тб. (оф.) — состав: платифиллина битартрат — 0,005, кофеина бензоат-натрий и натрия бромид — аа 0,15

Рр.: Tab. Antivomicae N. 10

D. S. По 1 таблетке за 30 мин до поездки на самолете или пароходе

Пустырник — трава
Herba Leonuri, ФХ

Инф. 1,5 : 20. Настойка 20—40 кл.

Рр.: Inf. herbae Leonuri 15,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Рр.: T-rae Leonuri 25,0

D. S. По 30 капель 2—3 раза в день

Хмель обыкновенный — железки
Humulus Lupulus glandularum

Сб. Инф. 1 : 10

Рр.: Inf. glandularum Lupuli 20,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Рр.: Glandularum Lupuli 50,0

D. S. 1 столовую ложку хмеля заварить в стакане кипятку; настаивать 30 мин — на 2 приема

Чай успокоительный

Сб. (оф.) — состав: листья мяты и трилистника — аа 2 части, корневище и корень валерьяны и хмель — аа 1 части

Зарубежные препараты

Белласпон (Чехословакия)

1 држ. Држ. (оф.)

Bellaspomum (Б)

(соответствует отечественному препарату беллатаминалу)

Рр.: Dragée Bellasponi N. 30

D. S. По 1 драже 3 раза в день после еды

Беллоид (Венгрия)

Belloidum (Б)

1—2 држ. Држ. (оф.) — состав: сумма алкалоидов белладонны — 0,0001, эрготоксин — 0,0003, бутилэтилбарбитуровая кислота — 0,03

Рр.: Dragée Belloidi N. 25

D. S. По 1—2 драже 3 раза в день

Валокордин (ГДР)
Valocordinum

5—10 кпл. Ж. (оф.) — состав:
этиловый эфир α -бромизова-
лериановой кислоты и натрие-
вая соль фенилэтилбарбитуро-
вой кислоты — аа 2%, масло
перечной мяты — 0,1%, эти-
ловый спирт — 51,6%, вода —
до 100%. Фл. 15,0 и 30,0.

Rp.: Valocordini 15,0

D. S. По 5—10 капель 3 раза в день на сахаре или в не-
большом количестве воды

Ленбирен (Румыния)
Lenbirenum (Б)

1—2 држ. Држ. (оф.)

(соответствует отечественному
препарату беллатаминалу)

Rp.: Dragée Lenbireni N. 30

D. S. По 1—2 драже 2 раза в день

Мидокалм (Венгрия)
Mydocalmum (Б),
(1-пиперидино-2-метил-3-п-толил-
пропанола гидрохлорид)

0,05—0,15. Држ. 0,05
Амп. 1,0—10%

Rp.: Dragée Mydocalmi 0,05

D. t. d. N. 30

S. По 1 драже 3 раза в день, постепенно увеличивая дозу
до 2—3 драже 3 раза в день

АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ГРУППЫ ОПИЯ И ИХ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЗАМЕНИТЕЛИ¹

Леморан *
Laemoranium (А),
(тарtrat левого изомера 3-окси-
N-метилморфинана)

0,005 (0,015). П. в. р. Тб. 0,002.
Амп. 1,0—0,2%

Rp.: Sol. Laemorani 0,2% 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1 мл подкожно 2—3 раза в день

Rp.: Laemorani 0,002

D. t. d. N. 10 in tab.

S. По 1 таблетке 2 раза в день

¹ См. также таблетки желудочные с опиум, термопий.

Морфина гидрохлорид *	0,02 (0,05). П. в. р. Пр. Тб.
Morphini hydrochloridum (A), ФХ	0,01 Амп. 1,0—1%

Rp.: Sol. Morphini hydrochloridi 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл подкожно

Rp.: Morphini hydrochloridi 0,02
Sacchari 0,25
M. f. pulv. D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 2 раза в день

Rp.: Morphini hydrochloridi 0,01
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Омнопон *	0,03 (0,1). П. в. р. Пр. Амп.
Омнопоронит (A), ФХ	1,0—1 и 2%

Rp.: Sol. Омнопорони 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл подкожно 1—2 раза в день

Опий — порошок *	0,1 (0,3). Пр. Тб. 0,01. Спп.
Opium pulveratum (A), ФХ	

Rp.: Opii pulverati 0,015
Sacchari 0,25
M. f. pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp.: Opii pulverati 0,01
Butyri Casao q. s.
M. f. suppos. D. t. d. N. 6
S. По 1 свече 2 раза в день в прямую кишку

Rp.: Opii pulverati 0,01
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Опий — простая настойка *	0,5 мл или 22 кпл. (1,25 мл или 50 кпл.)
Tinctura Opii simplex (A), ФХ	— водно-спиртовая настойка опия

Rp.: T-rae Opii simplicis 5,0
D. S. По 5—10 капель 2 раза в день

Опий — сухой экстракт *	0,05 (0,15). П. в. мт. р. Пр.
Extractum Opii siccum (A), ФХ	Пл. Спп.

Rp.: Extr. Opii 0,3
Pulv. et extr. rad. Taraxaci q. s.
M. f. pilulae N. 30
D. S. По 1 пилюле 2—3 раза в день

Rp.: Extr. Opii 0,01
Butyri Cacao q. s.
M. f. suppos. D. t. d. N. 10
S. По 1 свече в задний проход 1—2 раза в день

Rp.: Extr. Opii 0,015
Sacchari 0,25
M. f. pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 1—2 раза в день

Промедол*	П/к — 0,04 (0,16). Вн. — 0,05
Promedolum (A), ФХ	(0,2). Пр. Тб. 0,025. Амп. 1,0—1 и 2%

Rp.: Sol. Promedoli 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл подкожно 1—2 раза в день

Rp.: Promedoli 0,025
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Rp.: Promedoli 0,03
Sacchari 0,25
M. f. pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 2 раза в день

Текодин*	0,01 (0,03). П. в. р. Пр. Тб. 0,005
Thecodinum (A), ФХ	и 0,01. Амп. 1,0—1 и 2%

(оксигидрокодеинона гидрохлорид)

Rp.: Sol. Thecodini 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл подкожно 1—2 раза в день

Rp.: Thecodini 0,005
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Фенадон*	0,01 (0,03). П. в. р. Пр. Тб.
Phenadonum (A), ФХ	0,0025 и 0,005

Rp.: Phenadoni 0,005
Sacchari 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 1—2 раза в день

Эскодол*	0,5—1 мл. Ж. (оф.) — состав:
Escodolum (A)	промедол — 0,02, скопола- мин — 0,0005, эфедрин — 0,025 в 1 мл. Амп. 1 мл

Rp.: Escodoli 1 ml
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 0,75 — 1 мл подкожно 1—2 раза в день

Зарубежные препараты

Фентанил (Венгрия) *	0,00005—0,00025. Ампл. 10 мл →
Phentanylum (Б)	0,005%
[1 (2-фенэтил)-4-(N-пропионил-анилинопиперидин)]	

Rp.: Sol. Phentanyli 0,005% 10 ml
D. t. d. N. 5 in amp.
S. Для предоперационной подготовки; за полчаса до операции внутримышечно 1—2 мл

АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ СРЕДСТВА — ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРАЗОЛОНА, САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И АНИЛИНА

ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРАЗОЛОНА

Амидопирин (пирамидон)	0,5 (2,0). П. в. р. Пр. Тб. 0,25.
Amidopyrinum (Pyramidonum)	Амп. 5,0 и 10,0—4% и 1,0—2%. Сложные тб. (стр. 45)
(Б), ФХ	

Rp.: Amidopyrini 0,25
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Amidopyrini 2% 1,0
D. t. d. N. 16 in amp.
S. Для разведения пенициллина

Анальгин	Вн 1,0 (3,0). П/к, В/м и
Analginum (Б), ФХ	В/в — 0,5 (1,5). П. в. р. Тб. 0,5. Ампл. 1,0—50%. Сложные тб. (стр. 45)

Rp.: Analgini 0,5
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Analgini 50% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно при сильных болях

Антипирин	1,0 (3,0). П. в. р. Тб. 0,25. Пр.
Antipyrinum (Б), ФХ	Р-ры

Rp.: Antipyrini 0,25
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Antipyrini 3,0
Aq. destill. 150,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Бутадион
Butadionum (Б), ФХ

0,2 (0,6). П. в. нр. Тб. 0,05 и 0,15

Rp.: Butadioni 0,15
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 4—5 раз в день после еды

ПРОИЗВОДНЫЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

Ацетилсалициловая кислота (ас-
пирин)
Acidum acetylsalicylicum (Aspi-
rinum), ФХ

0,25—1,0. П. в. нр. Пр. Тб.
0,25 и 0,5

Rp.: Ac. acetylsalicylici 0,25
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки до 5 раз в день

Натрия салицилат
Natrii salicylas, ФХ

0,5—1,0 (до 10,0 в сутки). П. в.
р. Пр. Р-ры. Тб. 0,025 и 0,5
(сложные тб. стр. 45)

Rp.: Natrii salicylatis 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки до 8—10 раз в сутки

Rp.: Natrii salicylatis 6,0
Natrii hydrocarbonatis 3,0
Aq. Menthae 20,0
Aq. destill. ad 180,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 3—6 раз в день

Салициламид
Salicylamidum, ФХ

0,25—1,0. П. в. гр. с. р. Пр. Тб.
0,25 и 0,5

Rp.: Salicylamidi 0,25
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день как болеутоляющее
и жаропонижающее. Для лечения острого и подострого
ревматизма по 1 г 6—10 раз в день

ПРОИЗВОДНЫЕ АНИЛИНА

Парацетамол
Paracetamolum (Б), ФХ

0,5 (1,5). П. в. нр. Пр. Тб. 0,1
и 0,2

Rp.: Paracetamoli 0,2
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Phenacetini 0,25
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза
в день

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ
В АПТЕКЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ (В ТАБЛЕТКАХ)

Rp.: Amidopyrini
Analginі aa 0,3
Codeini 0,015
Phenobarbitali 0,01
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза
в день

Rp.: Amidopyrini
Streptocidi aa 0,3
Codeini 0,015
Coffeini-natrii benzoatis 0,05
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза
в день

Rp.: Amidopyrini
Analginі aa 0,25
Coffeini-natrii benzoatis 0,1
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза
в день

Rp.: Amidopyrini
Phenacetini aa 0,2
Coffeini 0,1
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза
в день

Rp.: Amidopyrini
Analginі aa 0,25
Coffeini-natrii benzoatis 0,1
Codeini 0,015
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза
в день

Rp.: Amidopyrini
Phenacetini aa 0,25
Coffeini-natrii benzoatis 0,1
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза
в день

Rp.: Amidopyrini 0,25
Coffeini 0,025
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза
в день

Rp.: Amidopyrini
Phenacetini aa 0,25
Phenobarbitali 0,03
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза
в день

Rp.: Amidopyrini 0,3
Coffeini 0,05
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза
в день

Rp.: Natrii salycilatis 0,25
Coffeini 0,05
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1—2 таблетки 4—5 раз
в день

Rp.: Amidopyrini 0,25
Coffeini-natrii benzoatis 0,1
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза
в день

Rp.: Natrii salycilatis 0,3
Coffeini 0,05
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1—2 таблетки 4—5 раз
в день

Rp.: Phenacetini 0,25
Coffeini-natrii benzoatis 0,1
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза
в день

Rp.: Phenacetini 0,15
Ac. acetylsalicylici 0,25
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза
в день

Адофен
Adophenum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: аналъ-
гин, амидопирин и фенацетин —
аа 0,2, кофеин-бензоат натрия —
0,05, кодеина фосфат — 0,015

Rp.: Tab. Adopheni N. 20
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Акофин
Acofinum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: ацетил-
салициловая кислота — 0,25 и
кофеин — 0,05

Rp.: Tab. Acofini N. 10
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Амазол
Amazolum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: амидо-
пирин — 0,3 и дибазол — 0,02

Rp.: Tab. Amazoli N. 12
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Анальфен
Analphenum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: анти-
пирин и фенацетин — аа 0,25,
кофеин-бензоат натрия —
0,005

Rp.: Tab. Analpheni N. 10
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Анкофен
Ancorphenum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: анти-
пирин и фенацетин — аа 0,25
кофеин-бензоат натрия — 0,005

Rp.: Tab. Ancorpheni N. 10
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Апикодин
Apicodinum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: амидо-
пирин и аналъгин — аа 0,3,
кодеина фосфат — 0,015

Rp.: Tab. Apicodini N. 10
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Аскофен Ascorphenum	1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: ацетилсалициловая кислота и фенацетин — \overline{aa} 0,2, кофеин — 0,04
--------------------------------------	--

Rp.: Tab. Ascorpheni N. 10
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Асфен Asphenum	1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: ацетилсалициловая кислота — 0,25, фенацетин — 0,15
---------------------------------	---

Rp.: Tab. Aspheni N. 10
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Веродон Verodonum (Б)	1 тб. Тб. (оф.) — состав: амидо- пирин — 0,1, барбитал — 0,3
--	--

Rp.: Tab. Verodoni N. 6
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Диафен Diaphenum (Б)	1 тб. Тб. (оф.) — состав: аналъ- гин и амидопирин — \overline{aa} 0,25, кофеин-бензоат натрия — 0,05, фенобарбитал — 0,02
---------------------------------------	---

Rp.: Tab. Diapheni N. 10
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Дикафен Dicarphenum (Б)	1 тб. Тб. (оф.) — состав: аналъ- гин и фенацетин — \overline{aa} 0,25, кофеин-бензоат натрия — 0,05, кодеин — 0,015
--	---

Rp.: Tab. Dicarpheni N. 10
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Кофадин Coffadinum (Б)	1 тб. Тб. (оф.) — состав: аналъ- гин и амидопирин — \overline{aa} 0,25 кофеин-бензоат натрия — 0,1 кодеин — 0,015
---	---

Rp.: Tab. Coffadini N. 12
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Кофальгин Cofalginum (Б)	1 тб. Тб. (оф.) — состав: аналъ- гина — 0,3, кофеин-бензоат натрия — 0,05
---	--

Rp.: Tab. Cofalгинi N. 10
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Кофекристин Coffecristinum (Б)	1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: эрго- кристина этансульфонат — 0,0005, кофеин — 0,1
---	--

Rp.: Tab. Coffecristini N. 20
D. S. По 1—2 таблетки на прием (до 4 таблеток в день)

Кофетамин Coffetaminum (Б)	1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: эрготамина тартрат — 0,001, кофеин — 0,1
---	---

Rp.: Tab. Coffetamini N. 20
D. S. По 1—2 таблетки на прием (до 4 таблеток в день)

Коффен Coffenum (Б)	1 тб. Тб. (оф.) — состав: фена- цетин — 0,25, кофеин — 0,05
--------------------------------------	---

Rp.: Tab. Coffeni N. 12
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Новомигрофен Novomigrophenum (Б)	1 тб. Тб. (оф.) — состав: амидо- пирин — 0,2, фенацетин — 0,1, кофеин и лимонная кисло- та аа 0,015, сахар — 0,1
---	--

Rp.: Tab. Novomigropheni N. 12
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Новоцефальгин Novocephalginum (Б)	1 тб. Тб. (оф.) — состав: ацетил- салициловая кислота — 0,3, фенацетин — 0,2, кофеин — 0,03
--	---

Rp.: Tab. Novocephalgini N. 20
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Пентальгин Pentalginum (Б)	1 тб. Тб. (оф.) — состав: амидо- пирин и анальгин — аа 0,3, кофеин-бензоат натрия — 0,05, фенобарбитал — 0,01, коде- ин — 0,015
---	--

Rp.: Tab. Pentalgini N. 10
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пирамеин Pyrameinum (Б)	1 тб. Тб. (оф.) — состав: амидо- пирин — 0,3, кофеин — 0,03
--	---

Rp.: Tab. Pyrameini N. 12
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Пираминал
Pyraminalum (Б) 1 тб. Тб. (оф.) — состав: амидопирин — 0,25, кофеин — 0,03, фенобарбитал — 0,02

Rp.: Tab. Pyraminali N. 12
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Пиранал
Pyranalum (Б) 1 тб. Тф. (оф.) — состав: амидопирин и анальгин — аа 0,25

Rp.: Tab. Pyranali N. 12
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пирафен
Pyraphenum (Б) 1 тб. Тб. (оф.) — состав: амидопирин и фенацетин — аа 0,25

Rp.: Tab. Pyrapheni N. 12
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Пиркофен
Pyrcophenum (Б) 1 тб. Тб. (оф.) — состав: амидопирин и фенацетин — аа 0,25, кофеин — 0,05

Rp.: Tab. Pyrcopheni N. 12
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Фенальгин
Phenalginum (Б) 1 тб. Тб. (оф.) — состав: анальгин, амидопирин и фенацетин — аа 0,125

Rp.: Tab. Phenalгинi N. 12
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Цитрамон
Citramonum (Б) 1 тб. Тб. (оф.) — состав: ацетилсалициловая кислота — 0,24, фенацетин — 0,18, кофеин и какао в порошке — аа 0,03, лимонная кислота — 0,02, сахар — 0,5

Rp.: Tab. Citramoni N. 6
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пирабутол (Чехословакия)
Pyrabutolum (Б)

В/м 3—5 мл. Вн 1—2 држ.
Амп. (оф.) — 5,0; состав: амидопирин и бутаднон — $\bar{a}\bar{a}$ 0,75.
Држ. (оф.) — состав: амидопирин и бутаднон — $\bar{a}\bar{a}$ 0,125

Rp.: Sol. Pyrabutoli 5,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 3—5 мл 1 раз в день внутримышечно (вводить медленно)

Rp.: Dragée Pyrabutoli N. 50

D. S. По 1 драже 3—5 раз в день

Реопирин (Венгрия)
Rheopyrinum (Б)

0,25—1,5. П. в. р. Држ. (оф.).
Амп. (оф.) 5,0 — состав: амидопирин и бутаднон — $\bar{a}\bar{a}$ 0,75
в амп. и $\bar{a}\bar{a}$ 0,125 в држ.

Rp.: Dragée Rheopyrini N. 25

D. S. По 1—2 драже 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Rheopyrini 5,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 5 мл внутримышечно 1 раз в день (вводить медленно)

Седальгин (Болгария)
Sedalginum (Б)

1—2 тб. Тб. (оф.) — состав:
кодеина фосфат — 0,01, кофеин — 0,05, фенацетин и ацетилсалицилат — $\bar{a}\bar{a}$ 0,2, фенобарбитал — 0,025

Rp.: Tab. Sedalini N. 10

D. S. По 1—2 таблетки 1—2 раза в день

п

ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА¹

Бензонал
Benzonalum (Б), ФХ
(1-бензоил-5-фенил-5-этилбарбитуровая кислота)

0,3 (1,0). П. в. нр. Пр. Тб. 0,1

Rp.: Benzionali 0,1

D. t. d. N. 50 in tab.

S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день

¹ См. также хлоралгидрат, фенобарбитал, красавка, корбелла, магния сульфат, атропин, скополамин, димедрол, кондельфин, мелликтин, бромиды.

Гексамидин Hexamidinum (Б), ФХ	0,75 (2,0). П. в. нр. Пр. Тб. 0,125 и 0,25
-----------------------------------	---

Rp.: Hexamidini 0,25
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По $\frac{1}{2}$ таблетки 1 раз в день (2 дня); затем по 1 таблетке, постепенно увеличивая дозу до 6 таблеток в день

Глютаминовая кислота Acidum glutaminicum, ФХ	Вн — 1,0—2,0. В/в — 0,1—0,2 П. в. р. Пр. Ам п. 10,0 — 1% Тб. 0,25
---	---

Rp.: Acidi glutaminici 1,0
D. t. d. N. 40
S. По 1 порошку 3 раза в день через 15—20 мин после еды, с вареньем или сладким чаем

Rp.: Acidi glutaminici 4,5
Sol. Glucosi 25% 450,0
M. D. S. По 1—3 столовые ложки 3 раза в день после еды

Rp.: Sol. Ac. glutaminici 1% 10,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 10 мл внутривенно ежедневно или через день (капельным способом в 25—40% растворе глюкозы)

Rp.: Acidi glutaminici 0,25
D. t. d. N. 40 in tab.
S. По 3—4 таблетки после еды 3 раза в день

Глюконат кальция Calcii gluconas	Вн 2,0—5,0 в 10% растворе. В/в — 1,0 в 10%. П. в. р. Р-ры. Ам. 2,0 и 10,0 — 10% Спп.
-------------------------------------	---

Rp.: Sol. Calcii gluconatis 10% 10,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 10 мл внутривенно ежедневно или через день капельным способом (на первую инъекцию не более 5 мл)

Rp.: Calcii gluconatis 1,0
Butyri Casao q. s.
M. f. suppos. D. t. d. N. 20
S. По 1 свече в прямую кишку на ночь

Динезин Dinezinum (Б)	0,05—0,2 (до 1,2 в сутки). П. в. р. Тб. 0,05, 0,1 и 0,2
--------------------------	--

Rp.: Dinezini 0,05
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—5 раз в день, постепенно увеличивая дозу до эффективной и хорошо переносимой

Дифения
Dipheninum (Б)

3 тб. (8 тб.). П. в. р. Тб. (оф.) —
содержат 0,117 дифенина

Rp.: Tab. Diphenini N. 20
D. S. По 1 таблетке 2—4 раза в день

Мебедрол
Mebedrolum (Б)
[(2-диметиламиноэтиловый
эфир о-метилбензгидрола)
гидрохлорид]

0,05. П. в. р. Тб. 0,025 и 0,05
Амп. 1,0—2,5 и 5%

Rp.: Mebedroli 0,025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Ридиноп
Ridinolum (А)
(3-пиперидил-1,1-дифенил-про-
панола гидрохлорид)

0,005 (высшая суточная доза
для взрослых—6 таблеток по
0,005 в день). Тб. 0,001 и
0,005

Rp.: Ridinoli 0,005
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 1 таблетке 1 раз в день, постепенно повышая дозу
до 3 таблеток в день

Таблетки Кармановой № 1 и 2
Tabulettae Karmanovae
№ 1 et 2 (А)

1 тб. Тб. (оф.) — состав:
Тб. № 1 — фенобарбитал —
0,1 калия бромид — 0,13, ко-
денн — 0,01, стрихнина нит-
рат — 0,001, камфора — 0,017,
кальция глицерофосфат — 0,4,
порошок корневища и корней
вадерианы — 0,042, наполни-
тели — в достаточном количе-
стве. Тб. № 2 — дозы веществ
такие же, как и в таблетках
№ 1, за исключением фенобар-
битала, доза которого в два
раза меньше — 0,05

Rp.: Tab. Karmanovae N. 1
D. t. d. N. 30
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Триметин
Trimethinum (Б), ФХ

0,4 (1,2). П. в. р. Пр. Тб. 0,1

Rp.: Trimethini 0,1
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Тропацин Tropacium (A), ФХ	0,03 (0,1). П. в. р. Пр. Тб. 0,005, 0,01 и 0,015
-------------------------------	---

Rp.: Tropacini 0,015.
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Фенакон Phenaconium (Б) (N-фенил-этил-β-хлорпропион-амид)	1,0—2,0. П. в. тр. Пр. Тб. 0,5
---	--------------------------------

Rp.: Phenaconi 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 2 таблетки 2—3 раза в день (начиная с 1 таблетки 2—3 раза в день)

Хлоракон Chloraconum (Б)	1,0—1,2. П. в. нр. Пр. Тб. 0,2, 0,25 и 0,5
-----------------------------	---

Rp.: Chloraconi 0,5
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 2 таблетки 3 раза в день

Циклодол Cyclodolum (A), ФХ (гидрохлорид-1-фенил-1-цикло-гексил-3-N-пиперидил-пропа-нола)	0,01 (0,02). П. в. р. Тб. 0,001, 0,002 и 0,005
---	---

Rp.: Cyclodoli 0,001
D. t. d. N. 20 in tab.
S. В первый день 1 таблетку. В следующие дни увеличивать дозировку на 1—2 тб. в день, доводя суточную дозу до 6—10 тб.

Зарубежные препараты

Беллазон (Болгария) Bellazonum (Б)	Држ. (оф.) — три вида: желтые, голубые и красные; содержат по 0,15 п-ацетаминобензальдегидизоникотиноил-гидразона и, кроме того, сумму алкалоидов корня болгарской белладонны: желтые — 0,00025, голубые — 0,0005 и красные — 0,001
---------------------------------------	---

Rp.: Dragée Bellazoni flav., bl., rubr. á N. 50
D. S. По 1 желтому драже 3 раза в день, постепенно увеличивая дозу, а затем уменьшая ее (лечение курсовое до 6 месяцев, с постепенным увеличением до 3 красных драже 3 раза в день и последующим постепенным уменьшением дозы)

Паркан (Венгрия) 0,005. Тб. 0,005

Parcanum (B)
[3-(1-пиперидил)-1-фенил-1-циклогексил-пропанола гидрохлорид]

Rp.: Parcani 0,005

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По $\frac{1}{4}$ таблетки в день, постепенно повышая дозу до 1—2 таблеток в день

Паркопан (ГДР) 0,001—0,01. Тб. 0,002 и 0,005

Parcopan (A)
(соответствует отечественному препарату циклодолу)

Rp.: Parcopani 0,002

D. t. d. N. 10 in tab.

S. По 1 таблетке в день, постепенно увеличивая дозу до 3 таблеток в день

Ромпаркин (Венгрия) 0,001—0,02. Тб. 0,002

Romparkinum (A)
(соответствует отечественному препарату циклодолу)

Rp.: Tab. Romparkini 0,002

D. t. d. N. 50

S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке в день. В случае необходимости дозу можно увеличить до 2 таблеток 5 раз в день

Суксилеп (ГДР) 0,25. Кпс. 0,25

Suxilepum (B)
(α -этил- α -метил-сукцинимид)

Rp.: Suxilepi 0,25

D. t. d. N. 100 in caps.

S. По 1 капсуле 4—6 раз в день

Тегретол ()** 0,2. Тб. 0,2

Tegretolum (B)
[5-карбамил-5Н дибензо (в.ф.)-азепин]

Rp.: Tab. Tegretoli 0,2

D. t. d. N. 50

S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

АНОРЕКСИГЕННЫЕ СРЕДСТВА ((угнетающие аппетит) ¹

Мефоллин Mepholinum (A) (гидрохлорид 2-фенил-3-метил- морфолина)	0,025. П. в. р. Тб. 0,025
---	---------------------------

Rp.: Mepholini 0,025
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке за 30—60 мин до еды 2 раза в день (курс
лечения — 1¹/₂—2¹/₂ месяца)

Фепранон Phepranopum (A) (гидрохлорид 1-фенил-2-этил- -амино-1-пропанона)	0,025. П. в. с. р. Тб. 0,025
--	------------------------------

Rp.: Phepranoni 0,025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день за час до еды

Эндоксикрин Endoxycrinum	Тб. (оф.) — препарат из эмбрио- нальных тканей животных
-----------------------------	--

Rp.: Tab. Endoxycrini N. 20
D. S. По 2 таблетки 2—3 раза в день, постепенно увеличи-
вая число приемов до 5

Зарубежные препараты

Дезопимон (Венгрия) Desopimopum (A)	1 тб. Тб. (оф.) — содержит 0,025 хлорфентермина гидрохлори- да
--	--

Rp.: Tab. Desopimoni N. 50
D. S. По 1 таблетке 3 раза в день во время приема пищи,
при условии малокалорийного рациона

ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ

ПРОИЗВОДНЫЕ ПУРИНА

Кофеин Coffeinum (Б), ФХ	0,3 (1,0). П. в. Тр. Пр. Комбини- рованные таблетки (см. стр. 45)
-----------------------------	--

Rp.: Coffeini 0,05
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 1—2 раза в день

¹ См. также адипозин.

Кофеин-бензоат натрия
Coffeinum-natrii benzoas (Б),
ФХ

П/к — 0,4 (1,0); Вн. — 0,5 (1,5).
П. в. р. Тб. 0,1 и 0,2. Ампл.
1,0—10 и 20%. Комбиниро-
ванные таблетки (см. стр. 46)

Rp.: Coffeini-natrii benzoatis 0,1
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день
Rp.: Sol. Coffeini-natrii benzoatis 10% — 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл подкожно 1—2 раза в день

ГРУППА ФЕНАМИНА

Фенамин *
Phenaminum (А), ФХ

0,01 (0,02). П. в. р. Пр. Тб. 0,01

Rp.: Phenamini 0,01
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке в день
Rp.: Phenamini 0,02 (20 мг)
Sacchari 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 3
S. По 1 порошку при слабости родовой деятельности

Фенатин *
Phenatinum (А), ФХ

0,2 (0,6). П. в. р. Пр. Р-ры
Тб. 0,05

Rp.: Phenatini 0,05
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день
Rp.: Sol. Phenatini 5% 5,0
Sterilisetur!
D. S. По 1 мл подкожно 1—2 раза в день

ПРОИЗВОДНЫЕ ДИФЕНИЛМЕТАНА, ОКСАЛИДИНА И ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ ГРУПП

Ацефен
Асерphenum (Б)
(диметиламиноэтиловый эфир
парахлорфеноксиуксусной кис-
лоты гидрохлорид)

0,1—0,3. П. в. р. Тб. 0,1.
Спл. 0,2. Пр. во фл. 0,25

Rp.: Асерpheni 0,1
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Acepheni 0,25

D. t. d. N. 5

S. Содержимое 1 флакона развести в 2 мл воды для инъекций; на 1 внутримышечную инъекцию 1 раз в день

Меридил

Meridilum (A)

[метилового эфира фенил-(2)-пиперидилуксусной кислоты гидрохлорид]

0,01—0,015. П. в. р. Тб. 0,01 и 0,02

Rp.: Meridili 0,01

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пиридрол

Piridrolum (A)

[α-(2-пиперидил)-бензгидрола гидрохлорид]

0,001—0,0025. П. в. р. Тб. 0,001 и 0,0025

Rp.: Piridroli 0,001

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день в первую половину дня (при недостаточном эффекте и отсутствии побочных явлений дозу можно увеличить до 0,0025 3 раза в день)

Зарубежные препараты

Центедрин (Венгрия)

Centedrinum (A)

(соответствует отечественному препарату меридилу)

1—2 тб. Тб. 0,01

Rp.: Centedrini 0,01

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1—2 таблетки 2 раза в день, не позднее чем за 6 ч до сна

АНАЛЕПТИКИ

Аналептическая смесь

Mixtura Analeptica

1,0—1,5 мл Ж. (оф.) — состав: в 1,0 кофеин бензоата-натрия и коразол — аа 0,01, стрихнина нитрат и пикротоксин — аа 0,00005. Ампл. 1,0

Rp.: Mixturae Analepticae 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. 1) по 1—1,5 мл внутримышечно 4—5 раз в сутки через равные промежутки времени;
2) по 0,5—1 мл в 5% растворе глюкозы в пупочную вену при асфиксии новорожденных

Бемегрид
Bemegridum (Б), ФХ
(β-этил-β-метил-глутаримид)

П. в. тр. Амп. 10,0 — 0,5%.
Фл. 30 и 100 — 0,5% в изотоническом растворе натрия хлорида

Rp.: Sol. Bemegridi 0,5% 10,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. Для внутривенных вливаний:

- 1) для устранения остановки дыхания при барбитуровом наркозе;
- 2) для пробуждения от барбитурового наркоза;
- 3) для устранения остановки дыхания при наркозе летучими наркотиками;
- 4) в качестве аналептика ненаркотизированным больным.

(Дозировка строго индивидуальна в зависимости от степени отравления и эффекта — от 5—10 до 30 мл, с интервалами в 10—30 мин).

Камфора растертая
Camphora trita

0,1—0,2. П. в. нр. Кпс.

Rp.: Camphorae tritae 0,2

D. t. d. N. 10 in caps. gelat.

S. По 1 капсуле 3—4 раза в день

Rp.: Camphorae tritae 0,1

Sacchari 0,3

M. f. pulv. D. t. d. N. 10 in charta cerata

S. По 1 порошку 3—4 раза в день

Камфора — раствор в масле
20% для инъекций
Solutio Camphorae oleosa 20%
pro injectionibus, ФХ

1—5 мл. Амп. 1 и 2 мл — 20%

Rp.: Sol. Camphorae oleosae 20% pro injectionibus — 2 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 2 мл подкожно несколько раз в день

Коразол
Corazolum (Б), ФХ

0,2 (0,5), П. в. р. Пр. Тб. 0,1
Амп. 1,0 — 10%

Rp.: Sol. Corazoli 10% 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1 мл подкожно 1—2 раза в день

Rp.: Corazoli 0,1

D. t. d. N. 10 in tab.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Кордиамин
Cordiaminum (Б), ФХ

2 мл (6 мл). При отравлении наркотиками 5 мл (однократно) Ж. (оф.) — 25% раствор диэтиламида никотиновой кислоты. Амп. 1 и 2 мл. Фл. 10,0 и 30,0

Rp.: Cordiamini 2 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл подкожно

Rp.: Cordiamini 10,0
D. S. По 20—25 капель 2—3 раза в день

Лобелина гидрохлорид
Lobelini hydrochloridum (Б)

0,005 (0,01). П. в. р. Амп.
1,0 — 1%

Rp.: Sol. Lobelini hydrochloridi 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 0,3—0,5 мл внутривенно

Субехолин (коркорний)
Subecholinum (Б)
(диметилового эфира пробковой
кислоты дийодметилат)

0,025—0,05. П. в. р. Пр. в амп.
по 0,05

Rp.: Subecholini 0,05
D. t. d. N. 5 in amp.
S. Содержимое 1 ампулы растворить в 1 мл воды для инъекций; для внутримышечных инъекций по 0,5—1 мл

Тауремизин
Tauremisinum (Б)

0,0025—0,005. П. в. нр. Тб.
0,005. Амп. 1,0—0,25%. Фл.
10,0—0,5% (лактон, выделенный из травы полыни таврической)

Rp.: Tauremisini 0,005
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Tauremisini 0,25% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5—1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Цититон
Cytitonum (Б), ФХ

1 мл (3 мл). Ж. (оф.) — 0,15% раствор цитизина. Амп. 1 мл

Rp.: Cytitoni 1 ml
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл внутривенно

Этимизол
Aethimizolum (Б)
[4-5-бис-(метиламин)-1-этилими-
дазол-дикарбоновой кислоты]

0,05—0,1. П. в. тр. Тб. 0,1
Амп. 2,0—1,5%

Rp.: Sol. Aethimizoli 1,5% 2,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 2—3 мл внутривенно (медленно!), по 4—5 мл внутримышечно при асфиксии новорожденных и как дыхательный analeptik при наркозе

Rp.: Aethimizoli 0,1
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 2—3 раза в день

Зарубежные препараты

Кальций-кардиамид (Польша)
Calcium-cardiamidum (Б)

1—2 тб. Тб. (оф.) — состав:
кардиамид — 0,252 и кальция
родонат — 0,11

Rp.: Tab. Calcii-cardiamidi N. 20
D. S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

АНТИДЕПРЕССАНТЫ

АНТИМОНОАМИНОКСИДАЗНЫЕ СРЕДСТВА

Индопан
Indopanium (А)
(α -метил-триптамина гидрохлорид)

0,005—0,01. П. в. р. Тб. 0,005
и 0,01

Rp.: Indopani 0,005
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день (в первую половину дня)

Ипразид (ипрониазид)
Iprazidum (Iproniazidum) (Б)
(2-изопропил-1-изоникотиноил
гидразин)

0,01—0,05. П. в. р. Пр. Тб. и
Држ. 0,01, 0,025 и 0,05

Rp.: Dragée Iprazidi 0,01 N. 50
D. S. По 1—3 драже 2—3 раза в день (в первую половину дня)

Трансамин Transaminum (Б) (сульфат транс-1-фенил-2-амино- циклопропана)	0,02—0,03 (суточная доза не должна превышать 0,06). П. в. р. Тб. 0 005
--	--

Rp.: Transamini 0,005
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2 раза в день (в первую половину дня)

ТРИЦИКЛИЧЕСКИЕ АНТИДЕПРЕССАНТЫ

Азафен Azaphenum (Б)	0,025. П. в. р. Тб. 0,025. Амп. 2,0—1,25%
-------------------------	--

Rp.: Tab. Azapheni 0,025
D. t. d. N. 30
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день, постепенно повышая
дозу до 4 таблеток в день.

Имизин Imizinum (Б), ФХ [N-(3-диметиламинопропил)-ими- нодобензила гидрохлорид]	Вн. 0,1 (0,3); В/м—0,05 (0,2). П. в. р. Држ. 0,025. Амп. 2,0—1,25%
--	--

Rp.: Dragée Imizini 0,025
D. t. d. N. 50
S. По 2 драже 1—2 раза в
день (в дополнение к внут-
римышечным инъекциям)

Rp.: Sol. Imizini 1,25% 2,0
D. t. d. N. 20 in amp.
S. По 1 ампуле 2—4 раза
в день внутримышечно (по-
степенно увеличить дозу до
2 ампул 3—4 раза в день)

Фторацизин Phthoracizinum (Б)	0,025. П. в. тр. Тб. 0,025 и 0,01. Амп. 1,0—1,25%
----------------------------------	--

Rp.: Tab. Phthoracizini 0,025
D. t. d. N. 30
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день, постепенно повышая дозу
до 4 таблеток в день

АНТИДЕПРЕССАНТЫ ДРУГИХ ГРУПП

Гемофирин Haemophyrimum	1—5 мл. Ж. (оф.) — 0,2% раст- вор гематопорфирина, полу- чаемого из эритроцитов крови человека. Амп. 2 мл.
----------------------------	---

Rp.: Haemophyrimini 2 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—5 мл внутримышечно ежедневно или через день

Зарубежные препараты

Амитриптилин (Чехословакия) Amitriptylinum (Б) [5-(3'-диметиламинопропи- ден)-дibenzo-(a-d)-1,4-цикло- гептадиен]	0,025—0,25 в сутки. Тб. 0,025
---	-------------------------------

Rp.: Tab. Amitriptylini N. 50
 D. S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды, постепенно
 повышая дозу в зависимости от эффективности

Мелипрамин (Венгрия) Melipraminum (Б) (соответствует отечественному препарату имизину)	Максимальная доза 300—350 мг в день. Држ. — 0,025. Амп. 2,0—2,5%
---	--

Rp.: Sol. Melipramini 2,5% 2,0
 D. t. d. N. 10 in amp.
 S. По $1\frac{1}{2}$ —1 ампуле внутримышечно 1 раз в день, постепенно
 повышая дозу до 2 ампул в день (две инъекции), с 3—
 4-го дня перейти на пероральное применение препарата

Rp.: Dragée Melipramini 0,025
 D. t. d. N. 50
 S. По 1—2 драже 3 раза в день, постепенно повышая дозу
 до 12 драже в день с последующим уменьшением — до
 3 драже в день

Меллерил (Югославия) Mellerilum (Б) (соответствует польскому препа- рату сонapakc)	0,025—0,15. Држ. 0,025
---	------------------------

Rp.: Dragée Mellerili 0,025
 D. t. d. N. 50
 S. По 1 драже 1—3 раза в день, постепенно повышая дозу
 до 6 драже в день (преимущественно в первую половину
 дня)

Нуредаль (ниаламид) (Венгрия) Nuredalum (Nialamidum) (Б) [1-(2)-бензилкарбамил (этил)-2- -изоникотиноил-гидразин]	0,025—0,05. Тб. 0,025
--	-----------------------

Rp.: Nuredali 0,025
 D. t. d. N. 50 in tab.
 S. По 1 таблетке 3 раза в день

Триптизол (Югославия)	0,02—0,4 в сутки. Тб. 0,01 и
Tryptizolum (Б)	0,025
(соответствует чехословацкому препарату амитриптилину)	

Rp.: Tab. Tryptizoli 0,01
 D. t. d. N. 50
 S. По 1 таблетке 3 раза в день перед едой, постепенно повышая дозу в зависимости от эффективности

Хлорпротиксен (Чехословакия)	0,03—0,1. Држ. 0,015 и 0,05.
Chlorprothixenum (Б)	Амп. 2,0—2,5%

Rp.: Dragée Chlorprothixeni 0,015
 D. t. d. N. 50
 S. По 1 драже 1—3 раза в день (при неврозах)

Rp.: Dragée Chlorprothixeni 0,05
 D. t. d. N. 50
 S. По 1 драже 2—4 раза в день (при психозах — большую часть суточной дозы следует давать перед сном)

ОБЩЕТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

СТРИХНИН И ЕГО ЗАМЕНИТЕЛИ

Секуринина нитрат	П/к — 0,003 (0,005). Вн — 0,005
Securinini nitratis (А), ФХ	(0,015). П. в. р. Амп. 1,0—0,2%. Фл. 15,0—0,4%. Тб. 0,002

Rp.: Sol. Securinini nitratis 0,2% 1,0
 D. t. d. N. 6 in amp.
 S. По 1 мл подкожно 1 раз в день

Rp.: Sol. Securinini nitratis 0,4% 15,0
 S. По 10—20 капель 3 раза в день

Стрихнина нитрат	0,002 (0,005). П. в. р. Пр. Пл.
Strychnini nitratis (А), ФХ	Амп. 1,0—0,1%

Rp.: Sol. Strychnini nitratis 0,1% 1,0
 D. t. d. N. 10 in amp.
 S. По 1 мл подкожно 1—2 раза в день

Rp.: Strychnini nitratis 0,015
 Pulv. et extr. rad. Taraxaci q. s.
 M. f. pilulae N. 30
 D. S. По 1 пилюле 3 раза в день

Чилибуха — настойка <i>Tinctura Strychni (Б)</i>	15 клл. (30 клл.). Фл. 10,0
Rp.: T-rae Strychni 10,0 D. S. По 5—8 капель 2—3 раза в день	
Чилибуха — сухой экстракт <i>Extractum Strychni siccum (А)</i>	0,01 (0,03). П. в. мт. р. Пл. Пр.
Rp.: Extr. Strychni sicci 0,3 Pulv. et extr. rad. Glycyrrhizae q. s. M. f. pilulae N. 30 D. S. По 1 пилюле 2—3 раза в день	
Эхинопсина нитрат <i>Echinopsini nitras (А)</i>	П/к 0,004. Вн. 0,005—0,01. П. в. р. Амп. 1,0—0,4%. Р-ры
Rp.: Sol. Echinopsini nitratis 0,4% 1,0 D. t. d. N. 10 in amp. S. По 1 мл подкожно 1 раз в день	
Rp.: Echinopsini nitratis 0,1 Aq. destill. 10,0 M. D. S. По 10 капель 2 раза в день, постепенно увеличивая дозу до 20 капель на прием	
ЭКСТРАКТЫ ИЗ РАСТЕНИЙ И ПРЕПАРАТЫ ИЗ ТКАНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ОБЛАДАЮЩИЕ ОБЩЕТОНИЗИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ	
Аралия маньчжурская — настой- ка <i>Tinctura Aralii manshuricae</i>	30—40 клл.
Rp.: T-rae Aralii manshuricae 50,0 D. S. По 30—40 капель 2—3 раза в день	
Барвинкана гидрохлорид <i>Barvincani hydrochloridum (А)</i>	0,01. Пр. в. р. Амп. 1,0 — 1% (препарат, полученный из тра- вы и корней барвинка прямого)
Rp.: Sol. Barvincani hydrochloridi 1% 1,0 D. t. d. N. 15 in amp. S. По 1 мл подкожно 1 раз в день. Курс лечения — 20— 30 дней	
Женьшень — корень <i>Radix Ginsengi, ФХ</i>	Настойка 20—30 клл. Тб. 0,15
Rp.: T-rae Ginsengi 50,0 D. S. По 15—20 капель 3 раза в день до еды	

Rp.: Ginsengi 0,15

D. t. d. N. 30 in tab.

S. По 1—2 таблетки 3 раза в день до еды

Заманиха — настойка

30—40 капель

Tinctura Echinopanacis elati

Rp.: T-rae Echinopanacis elati 25,0

D. S. По 30—40 капель 2—3 раза в день

Левзея — настойка и жидкий

20—30—кпл.

экстракт

Tinctura et extractum fluidum

Leuzeae carthamoidis

Rp.: Extr. Leuzeae carthamoidis fluidi 40,0

D. S. По 20—30 капель 2—3 раза в день до еды

Rp.: T-rae Leuzeae carthamoidis 40,0

D. S. По 20—30 капель 2—3 раза в день до еды

Лимонник — плоды и семена
Fructus et semen Schizandrae chi-
nensis, ФХ

Настойка 20—30 кпл. Тб. 0,5

Rp.: T-rae Schizandrae chinensis 25,0

D. S. По 20—30 капель 2—3 раза в день

Rp.: Pulv. Schizandrae chinensis 0,5

D. t. d. N. 12 in tab.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пантокрин
Pantocrinum

П/к 1—2 мл. Вн. 30—40 кпл.
Ж. (оф.) — спиртовой эк-
стракт из пантов маралов,
изюбря и пятнистого оленя.
Амп. 1 мл. Фл. 30,0 и 50,0

Rp.: Pantocrini 1 ml

D. t. d. N. 12 in amp.

S. По 1 мл подкожно 1 раз в день

Rp.: Pantocrini 30,0

D. S. По 30 капель 2—3 раза в день

Стеркулия платанolistная
Tinctura Sterculiae platanifolii

Настойка 10—30 кпл.

Rp.: T-rae Sterculiae platanifolii 50,0

D. S. По 15 капель 2—3 раза в день

Элеутерококк
Extractum Eleutherococcus fluidum

20—30 кпл.

Rp.: Extr. Eleutherococcus fluidi 50,0

D. S. По 20—30 капель 3 раза в день за полчаса до еды в течение 25—30 дней

Зарубежные препараты

Эскузан (ГДР)
Escuzanum

Држ. (оф.) — состав: вытяжка из конского каштана — 0,004, витамин B₁ — 0,00225. Ж. (оф.) — состав: вытяжка из конского каштана, витамин B₁, спирт этиловый, вода дистиллированная. Фл. 20,0

Rp.: Dragée Escuzani N. 50

D. S. По 1—2 драже 3 раза в день до еды

Rp.: Escuzani 20,0

D. S. По 15 капель на сахарной воде 3 раза в день до еды

СРЕДСТВА ДЛЯ ОТВЫКАНИЯ ОТ КУРЕНИЯ

Табекс (Болгария)
Tabexum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — содержат по 0,0015 цитизина

Rp : Tab. Tabexi N. 100

D. S. Курс лечения: лечение начинают с приема 1 таблетки каждые 2 ч — всего 6 таблеток в течение 3 дней. При получении положительного результата лечение продолжают по следующей схеме:

с 4-го по 12-й день — каждые 2½ ч по 1 таблетке — всего 5 таблеток в день;

с 13-го по 16-й день — каждые 3 ч по 1 таблетке — всего 4 таблетки в день;

с 17-го по 20-й день — каждые 5 ч по 1 таблетке — всего 3 таблетки в день;

с 21-го по 25-й день — по 1—2 таблетки в день.

Полный отказ от курения должен состояться не позднее 5-го дня с начала лечения.

По окончании лечения для получения устойчивого результата бывший курильщик ни в коем случае не должен проявлять излишней смелости и выкуривать хотя бы по одной сигарете.

Противопоказания: высокое кровяное давление, атеросклероз.

Внимание! Не допускать детей к препарату!

Глава II

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ОБЛАСТИ ОКОНЧАНИЙ ЭФФЕРЕНТНЫХ НЕРВОВ

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ОБЛАСТИ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ

ПИЛОКАРПИН И ЕГО ЗАМЕНИТЕЛИ (М-ХОЛИНОМИМЕТИКИ)

Ацеклидин	0,004 (0,012). П. в. р. Пр. Мз.
Aceclidinum (A), ФХ	Амп. 1,0 и 2,0 — 0,2%. Фл.
(3-ацетоксихинуклидина салици- лат)	10,0—2, 3 и 5%

Rp.: Sol. Aceclidini 0,2% 2,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 2 мл подкожно (в случае отсутствия эффекта инъек-
цию повторяют 2—3 раза с промежутками в 20—30 мин)

Rp.: Sol. Aceclidini 2% 10,0

D. S. Глазные капли

Rp.: Ung. Aceclidini 3% 5,0

D. S. Глазная мазь (закладывать за края век перед сном)

Бензамон	П. в. р. Глазные кпл. и мз. —
Benzamonum (A)	3—10%

Rp.: Sol. Benzamoni 10% 5,0

D. S. По 1—2 капли в оба глаза 3—4 раза в день

Rp.: Benzamoni 1,0

Lanolini

Vaselini aa 4,5

M. f. ung.

D. S. Глазная мазь

Карбахалин	Вн. — 0,001 (0,003). П/к —
Carbacholinum (A), ФХ	0,0005 (0,001). П. в. р. Глаз- ные кпл. — 0,5—0,75%

Rp.: Sol. Carbacholini 0,5% 5,0

D. S. По 1—2 капли в больной глаз 2—6 раз в день

Пилокарпина гидрохлорид <i>Pilocarpini hydrochloridum</i> (A), ФХ	0,01 (0,02). П. в. р. Глазные кпл. 1—2%. Глазные мз. 1—5%
---	---

Rp.: Sol. Pilocarpini hydrochloridi 1% 5,0
D. S. По 1—2 капли 2—6 раз в день в больной глаз

Rp.: Pilocarpini hydrochloridi 0,2
Vasellini albi 20,0
M. f. ung.
D. S. Глазная мазь

АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА

Армин <i>Arminum</i> (A)	Ж. в. р. Глазные кпл. 0,005% и 0,01%. Фл. 10,0
-----------------------------	---

Rp.: Sol. Armini 0,005% 10,0
D. S. Глазные капли

Галантамина гидробромид <i>Galanthamini hydrobromidum</i> (A), ФХ	0,01 (0,02). П. в. р. Ампл. 1,0— 0,1, 0,25, 0,5 и 1%
---	---

Rp.: Sol. Galanthamini hydrobromidi 0,25% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл подкожно 1—2 раза в день (постепенно увеличивая дозу до 4 мл в день)

Нибуфин <i>Nibuphinum</i> (A) (пара-нитрофениловый эфир ди- бутилфосфиновой кислоты)	3—5 мл — 0,033%. Ж. Ампл. 5,0—0,033%. Фл. 10,0— 0,033%
---	--

Rp.: Sol. Nibuphini 0,033% 5,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 3—5 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Rp.: Sol. Nibuphini 0,033% 10,0
D. S. Глазные капли

Оксазил <i>Oxazylum</i> (A), ФХ [N,N'-бис-(2-диэтиламино- этил)-оксамид-бис-(2-хлор-бен- зил-хлорид)]	0,025 (0,05). П. в. р. Тб 0,001. 0,005 и 0,01
---	--

Rp.: Oxazyli 0,005
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды, постепенно увеличивая дозу на 1/2 таблетки в день

Пиропфос Pyrophosum (A)	Ж. в. тр. м. р. Гл. клл. Фл. 10,0—0,01 и 0,02%
--	---

Rp.: Sol. Pyrophosi oleosae 0,01% 10,0
D. S. Глазные капли

Прозерин Proserinum (A), ФХ	П/к 0,002 (0,006). Вн 0,015 (0,05). П. в. р. Пр. Тб. 0,015. Амп. 1,0—0,05%
--	--

Rp.: Sol. Proserini 0,5% 5,0
D. S. Глазные капли

Rp.: Proserini 0,015
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Rp.: Sol. Proserini 0,05% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5—1 мл подкожно 1—2 раза в день

Rp.: Proserini 0,01
Sacchari 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3—4 раза в день

Физостигмина салицилат Physostigmini salicylas (A), ФХ	0,0005 (0,001). П. в. р. Амп. 1,0—0,1%. Гл. клл. — 0,25 и 1%
---	--

Rp.: Sol. Physostigmini salicylatis 1% 5,0
D. in vitro nigro
S. Глазные капли

Rp.: Sol. Physostigmini salicylatis 0,1% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5—1 мл подкожно 1 раз в день

Фосфакол Phosphacolum (A)	Ж. в. р. Гл. клл. 1 : 5 000, 1 : 7 500, 1 : 10 000. Фл. 10,0
--	---

Rp.: Sol. Phosphacoli 1 : 7 500—10,0
D. S. Глазные капли

Хлорофтальм Chlorophthalmum (A)	П. в. р. Р-ры 0,5—1,5% (гото- вятся ex tempore)
--	--

Rp.: Sol. Chlorophthalmi 0,5% 10,0
D. S. По 2 капли в каждый глаз, в зависимости от эффекта
3—5 раз в день

Зарубежные препараты

Калимин (ГДР) 0,06. Тб. 0,06

Kalyminum (Б)

(диметилкарбаминовый эфир
1-метил-3-оксипиридина бро-
мид)

Rp.: Kalymini 0,06
D. t. d. N. 100 in tab.
S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Местинон ()** Држ. 0,06. Тб. 0,01. Амп. 1,0—

Mestinonum (Б) 1%

(соответствует препарату калими-
ну из ГДР)

Rp.: Sol. Mestinoni 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1—2 мл внутримышечно 1 раз в день

Rp.: Tab. Mestinoni 0,01
D. t. d. N. 50
S. По 2—3 таблетки 3—4 раза в день

ХОЛИНОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ОБЛАСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ (М-ХОЛИНОЛИТИКИ)

Апрофен ¹

Argophenum (Б), ФХ

**Вн 0,03 (0,1). П/к и В/м 0,02
(0,06). П. в. р. Пр. Тб. 0,025.
Амп. 1,0—1%**

Rp.: Apropheni 0,025
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день после еды

Rp.: Sol. Apropheni 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5—1 мл внутримышечно

Арпенал

Arpenalum (Б)

**0,02—0,04. П. в. р. Тб. 0,05
Амп. 1,0—2 и 5%**

Rp.: Sol. Arpenali 2% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл 2—4 раза в день внутримышечно

¹ Обладает выраженным центральным холинолитическим действием.

Rp.: Tab. Arginali 0,05

D. t. d. N. 10

S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день

Атропина сульфат
Atropini sulfas (A), ФХ

0,001 (0,003). П. в. р. Амп.
1,0—0,1%. Р-ры. Мз.

Rp.: Atropini sulfatis 0,1

Aq. destill. 10,0

M. D. S. Глазные капли

Rp.: Atropini sulfatis 0,01

Aq. destill. 10,0

M. D. S. По 5 капель 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0,1% 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 0,5—1 мл подкожно 1—2 раза в день

Rp.: Atropini sulfatis 0,05

Lanolini

Vasellini aa 5,0

M. f. ung.

D. S. Глазная мазь

Аэрон
Aëronum (Б)

2 тб. (4 тб). Тб. (оф.) — состав:
скополамин камфорнокис-
лый — 0,0001, гиосциамин
камфорнокислый — 0,0004

Rp.: Tab. Aëroni N. 10

D. S. По 1 таблетке за 30—40 мин до отъезда на пароходе
или самолете

Бекарбон
Becarbonum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: экст-
ракта красавки — 0,01, на-
трия гидрокарбонат — 0,3

Rp.: Tab. Becarboni N. 12

D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Белена — сухой экстракт
Extractum Hyoscyami siccum (Б)

0,1 (0,3). П. — содержит 0,3%
алкалоидов белены. Пр. Пл.

Rp.: Extr. Hyoscyami sicci 0,6

Pulv. et extr. rad. Glycyrrhisae q. s.

M. f. pilulae N. 30

D. S. По 1 пилюле 2—3 раза в день

Бензацин¹ Benzacini (A)	П/к 0,001 (0,003). Вн. — 0,002 (0,006). П. в. р. Тб. 0,001 и 0,002. Ам. 1,0—0,1%
---	---

Rp.: Sol. Benzacini 0,1% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл под кожу 1—2 раза в день

Rp.: Benzacini 0,001
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Гиосциамин сульфат (гимали- на сульфат) Hyoscyamini sulfas (A)	Вн. 0,0005 (0,0015). П/к — 0,00012—0,0004. П. в. р. Ам. 1,0—0,04% Фл. 10,0—0,04%. Тб. 0,0001
---	---

Rp.: Sol. Hyoscyamini sulfatis 0,04% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,3—1 мл подкожно 1—2 раза в день

Rp.: Sol. Hyoscyamini sulfatis 0,04% 10,0
D. S. По 25 капель 3 раза в день

Гоматропина гидробромид Homatropini hydrobromidum (A), ФХ	0,001 (0,003). П. в. р. Гл. кпл 0,5 и 1%
--	---

Rp.: Sol. Homatropini hydrobromidi 0,5% 5,0
D. S. Глазные капли

Корбелла Corbella (Б)	1—3 тб. Тб. (оф.) — состав: 0,001 алкалоидов корня красавки в пересчете на атропин. Фл. 50 тб.
--	---

Rp.: Tab. Corbellae N. 50
D. S. По 1 таблетке перед сном (постепенно повышать дозу до наиболее эффективной и хорошо переносимой)

Красавка — густой экстракт Extractum Belladonnae spissum (Б), ФХ	0,05 (0,15). ГЖ. в. мт. р. Пр) Сп. Мкс. Пл.
---	--

Rp.: Extr. Belladonnae spissi 0,03
Sacchari lactis 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 in charta cerata
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Rp.: Extr. Belladonnae spissi 0,9
Pulv. et extr. rad. Glycyrrhizae q. s.
M. f. pilulae N. 30
D. S. По 1 пилуле 2—3 раза в день

¹ Обладает выраженным центральным действием.

Rp.: Extr. Belladonnae spissi 0,025

Ol. Cacao q. s.

M. f. suppos. D. t. d. N. 6

D. S. По 1 свече в задний проход на ночь

Rp.: Suppos. Anusoli N. 10

D. S. По 1 свече в задний проход на ночь (спл. оф.) —

состав: экстракт красавки — 0,02, ксероформ — 0,1,

цинка сульфат — 0,05, глицерин — 0,12

Красавка — настойка

23 клл. (70 клл.)

Tinctura Belladonnae (Б), ФХ

Rp.: T-rae Belladonnae 5,0

D. S. По 10 капель 2—3 раза в день

Красавка — сухой экстракт

0,1 (0,3). Пр. Спл. Пл.

Extractum Belladonnae siccum

(Б), ФХ

Rp.: Extr. Belladonnae sicci 0,015

Sacchari lactis 0,3

M. f. pulv. D. t. d. N. 12 in charta cerata

S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Мепанит

0,02—0,03. П. в. р. Ампл. 2,0—2%

Mepanitum (A)

Rp.: Sol. Mepaniti 2% 2,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1 мл подкожно 2—3 раза в день

Месфенал

0,01. П. в. р. Ампл. 1,0—1%

Mesphenalum (A)

(метилсульфо-метилат 3-диэтил-
аминопропилового эфира 1,1-дифе-
нилуксусной кислоты)

Rp.: Sol. Mesphenali 1% 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1 мл подкожно 1—2 раза в день

Метацин

Вн. 0,005 (0,015). П/к, В/м и

Methacinum (A), ФХ

В/в — 0,002 (0,006). П. в. тр.

Тб. 0,002 и 0,003. Ампл. 1,0—

0,1%

Rp.: Sol. Methacini 0,1% 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 0,5—1 мл подкожно 2—3 раза в день

Rp.: Methacini 0,002

D. t. d. N. 10 in tab.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Платифиллина гидротартрат Platyphyllini hydrotartras (А), ФХ	0,01 (0,03). П. в. р. Пр. Тб. 0,005. Амп. 1,0—0,2%
--	---

- Rp.: Platyphyllini hydrotartratis 0,005
Sacchari 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день
- Rp.: Sol. Platyphyllini hydrotartratis 0,2% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—2 мл подкожно 2 раза в день
- Rp.: Sol. Platyphyllini hydrotartratis 1% 5,0
D. S. По 10 капель 2—3 раза в день

Скополамина гидробромид Scopolamini hydrobromidum (А), ФХ	0,0005 (0,0015). П. в. р. Амп. 1,0—0,05%. Гл. клл. 0,25%
---	---

- Rp.: Scopolamini hydrobromidi 0,005
Aq. destill. 100,0
M. D. S. По 1 чайной ложке 2—3 раза в день
- Rp.: Sol. Scopolamini hydrobromidi 0,05% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По $\frac{1}{2}$ —1 мл подкожно 1—2 раза в день
- Rp.: Sol. Scopolamini hydrobromidi 0,25% 5,0
D. S. Глазные капли

Спазмолитин (дифацил) ¹ Spasmolytinum (Diphacilum) (Б)	0,1—0,25. П. в. р. Кпс. Р-ры
--	------------------------------

- Rp.: Spasmolytini 0,1
D. t. d. N. 20 in caps. gelat.
S. По 1 капсуле 2 раза в день (при деформирующем полиартрите)
- Rp.: Spasmolytini 0,25
D. t. d. N. 30 in caps. gelat.
S. По 1 капсуле 3 раза в день (при язвенной болезни)
- Rp.: Spasmolytini 0,25
Sol. Natrii chloridi isotonicae 50,0
M. Sterilisetur!
D. S. Для одной внутрикожной блокады

Сукрадбел Sucradbelum (Б)	3 клл. — 15 клл. Ж. (оф.) — сок из корней красавки. Фл. 30,0
------------------------------	---

- Rp.: Sucradbeli 30,0
D. S. По 3 капли 2—3 раза в день, постепенно повышая дозу до 15 капель

¹ Оказывает выраженное центральное холинолитическое действие.

Тифен
Tiphenum (Б)

0,1 (0,3). П. в. р. Пр. Тб. 0,02
и 0,03. Р-ры

Rp.: Tipheni 0,03
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Tipheni 1% 5,0
Sterilisetur!
D. S. По 0,5—1 мл подкожно 1—2 раза в день

Фубромеган
Fubromeganum (А)

0,005—0,05. П. в. р. Тб. 0,05
Амп. 1,0—2%

(1-метил-3-диэтиламинопропило-
вый эфир 5-бромфуран-2-кар-
боновой кислоты йодметилат)

Rp.: Sol. Fubromegani 2% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По $\frac{1}{2}$ —2 мл внутримышечно 1—3 раза в день

Rp.: Fubromegani 0,05
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день (после курса внутримы-
шечных инъекций)

ГАНГЛИОЛИТИКИ

Бензогексоний
Benzohexonium (Б), ФХ

Вн. 0,3 (0,9). П/к 0,075 (0,3)
П. в. р. Пр. Тб. 0,1 и 0,25.
Амп. 1,0—2%.

Rp.: Benzohexonii 0,1
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Sol. Benzohexonii 2% 1,0
D. t. d. N. 30 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 2—3 раза в день

Ганглерон
Gangleronum (Б), ФХ

Вн. 0,075 (0,3); П/к и в/м
0,06 (0,18). П. в. р. Амп.
2,0—1,5%. Кпс. Тб. 0,04.
Фл. 100,0—1,5%

Rp.: Sol. Gangleroni 1,5% 2,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 2—4 мл внутримышечно 2—3 раза в день

Rp.: Gangleroni 0,04
Sacchari 0,15
M. f. pulv. D. t. d. N. 20 in caps. gelat.
S. По 1 капсуле 3 раза в день

Rp.: Gangleroni 0,04
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Гигроний
Hygronium (Б)

(дйодметилат диметиламиноэти-
лового эфира *N*-метил- α -пир-
ролидинкарбоновой кислоты)

0,04—0,08. П. в. р. Пр. во
фл. — 0,1

Rp.: Hygronii 0,1
D. t. d. N. 5
S. Содержимое 1 флакона растворить в 100 мл воды для
инъекций; для капельного внутривенного введения,
начиная с 70—100 капель в минуту, по достижении
необходимого эффекта 30—40 капель в минуту (для
управляемой гипотонии)

Диколин
Dicolinum (Б), ФХ

(дйодметилат- β -диэтиламиноэти-
лового эфира 1-6-диметилпипе-
колиновой кислоты)

Вн 0,3 (1,0); П/к 0,03
(0,1). П. в. р. Тб. 0,05 и 0,1.
Држ. 0,05. Амп. 1,0 и 2,0—1%

Rp.: Dicolini 0,05
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день через 1 ч после еды

Rp.: Sol. Dicolini 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 2—3 раза в день (при малой
эффективности дозу можно увеличить до 3 мл 2—3 раза
в день)

Димеколин
Dimecolinum (Б)

(дйодметилат- β -диметиламиноэти-
лового эфира 1,6-диметилпи-
пеколиновой кислоты)

Вн 0,025—0,05. В/м 0,005—
0,01. Тб. 0,025 и 0,05. Амп.
1,0—1%

Rp.: Dimecolini 0,025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2 раза в день, постепенно увеличивая
дозу до 2 таблеток 2 раза в день

Rp.: Sol. Dimecolini 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5—1 мл внутримышечно 2 раза в день

Изоприн
Isoprinum (Б)
(днизопропилпутресцин)

Вн 0,025—0,05. П/к, В/м и
В/в 0,02—0,06. Пр. Тб.
0,05. Амп. 2,0—2%

Рр.: Isoprini 0,05
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Рр.: Sol. Isoprini 2% 2,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—2 мл 1—2 раза в день

Камфоний
Camphonium (Б)
[дийодметилат N-(диметилами-
нопропил)-камфидина]

0,005—0,05. П. в. р. Тб. 0,01
и 0,05. Амп. 1,0—1%

Рр.: Camphonii 0,01
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Рр.: Sol. Camphonii 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5—1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Кватерон
Quateronum (Б), ФХ
(йодэтилат α , β -диметил- γ -ди-
этиламинопропилового эфира-
пара-н-бутоксibenзойной ки-
слоты)

0,05 (0,2). в. тр. Пр. Тб. 0,02
и 0,03. Р-ры 0,6%

Рр.: Quateroni 0,02
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—1½ таблетки 3—4 раза в день

Рр.: Sol. Quateroni 0,6% 100,0
D. S. По 1 чайной ложке 3 раза в день

Нанопин
Nanophynum (Б)

Вн. 0,1—0,2. П/к и В/м 0,02—
0,05. П. в. р. Пр. Тб. 0,1.
Амп. 1,0—2 и 5%

Рр.: Nanophyni 0,1
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Рр.: Sol. Nanophyni 2% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл подкожно 2 раза в день

Пахикарпина гидроидид
Pachycarpini hydroiodidum
(Б), ФХ

Вн 0,2 (0,6). П/к 0,15 (0,45).
П. в. р. Тб. 0,1. Амп. 2,0—
3%

Rp.: *Pachycarpini hydroiodidi* 0,1

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 2 раза в день

Rp.: Sol. *Pachycarpini hydroiodidi* 3% 2,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 3—5 мл внутримышечно 1 раз в день

Пентамин
Pentaminum (Б), ФХ

0,15 (0,45). П. в. р. Амп. 1,0 и
2,0—5%

Rp.: Sol. *Pentamini* 5% 2,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 0,4 мл внутримышечно, постепенно увеличивая
дозу до 1—2 мл

Пирилен
Pirilenum (Б), ФХ
(толуолсульфонат 1,2,2,6,6-
-пентаметилпиперидин)

0,01 (0,03). П. в. р. Тб. 0,005

Rp.: *Pirileni* 0,005

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По $\frac{1}{2}$ таблетки 2—3 раза в день, постепенно повышая
дозу до 2 таблеток 3 раза в день

Сферофизина бензоат
Sphaerophysini benzoas (Б), ФХ

Вн 0,05 (0,1). П/к и В/м 0,01
(0,06). П. в. р. Пр. Р-ры

Rp.: *Sphaerophysini benzoatis* 0,025

Sacchari 0,3

M. f. pulv. D. t. d. N. 20

S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Rp.: Sol. *Sphaerophysini benzoatis* 1% 10,0

Sterilisetur!

D. S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Зарубежные препараты

Арфонад (**)
Arfonadum (Б)

0,05—0,1. П. в. р. Пр. в амп.
0,05

Rp.: *Arfonadi* 0,05

D. t. d. N. 6 in amp.

S. Растворить 1 ампулу в 50 мл 5% раствора глюкозы;
для 1 внутривенного введения капельным способом

МИОРЕЛАКСАНТЫ

Анатруксоний Anatruxonium (A) (дийодметилат пиперидилпропа- нолового эфира L-труксильной кислоты)	0,00015—0,0002 на 1 кг веса. Ампл. 2,0—0,3%
---	--

Rp.: Sol. Anatruxonii 0,3% 2,0
 D. t. d. N. 6 in amp.
 S. По 3—4 мл внутривенно (при условии «управляемого»
 дыхания)

Диоксоний Dioxonium (A)	В/в 0,04—0,05 на 1 кг веса. Ампл. 5,0—0,1%
--	---

Rp.: Sol. Dioxonii 0,1% 5,0
 D. t. d. N. 3 in amp.
 S. По 2,5—3 мл внутривенно (при необходимости можно
 ввести дополнительно $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ первоначальной дозы)

Диплацина дихлорид Diplacini dichloridum (A)	В/в при искусственном дыха- нии 2% — 25 мл (25 мл) Ампл. 5,0—2%
---	---

Rp.: Sol. Diplacini dichloridi 2% 5,0
 D. t. d. N. 10 in amp.
 S. Для внутривенного введения по 5—7 мл (вводить мед-
 ленно!)

Дитилин Dithylinum (A), ФХ (дихолинового эфира янтарной кислоты дийодид)	0,01—0,025. П. в. р. Ампл. 2,0—1 и 2%
---	--

Rp.: Sol. Dithylini 1% 2,0
 D. t. d. N. 10 in amp.
 S. По 1—2 мл внутривенно для кратковременного расслаб-
 ления мышц (без наркоза и при различных видах нар-
 коза)

Rp.: Sol. Dithylini 1% 20,0
 Sterilisetur!
 S. По 10—20 мл внутривенно капельным способом для
 получения длительного расслабления мускулатуры (при
 условии «управляемого» дыхания)

Кондельфин Condelphinum (A)	0,025—0,05. П. в. вр. Пр. Тб. 0,025
--	--

Rp.: Condelphini 0,025
 D. t. d. N. 20 in tab.
 S. По 1 таблетке 1—2 раза в день (постепенно повышая
 дозу до 2 таблеток от 1 до 3 раз в день в зависимости
 от эффективности и переносимости препарата)

Мелликтин
Mellictinum (A)

0,02. П. в. нр. Пр. Тб. 0,02

Rp.: Mellictini 0,02

Sacchari 0,3

M. f. pulv. D. t. d. N. 20

S. По 1 порошку в день, за час до еды (постепенно повышая дозу до 5 порошков в день)

Зарубежные препараты

Мио-релаксин (ГДР)

0,01—0,03. П. в. р. Пр. в амп.

Myo-Relaxinum (A)

0,1 и 0,25

(аналогичен отечественному препарату дитилину)

Rp.: Myo-Relaxini 0,1

D. t. d. N. 6 in amp.

S. Содержимое одной ампулы растворить в 10 мл 5% раствора глюкозы; по 2—3 мл внутривенно для кратковременного расслабления мускулатуры

**СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ОБЛАСТИ
АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ**

АДРЕНАЛИН И АДРЕНОМИМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ¹

Адреналина гидротартрат — раствор 0,18% для инъекций

1 мл (5 мл). Амп. 1,0—0,18%

Adrenalini hydrotartras — solutio 0,18% pro injectionibus
(Б), ФХ

Rp.: Sol. Adrenalini hydrotartratis 0,18% pro injectionibus 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 0,25—1 мл подкожно 1—2 раза в день

Адреналина гидрохлорид

0,001 (0,005). П. в. р. Амп.

Adrenalini hydrochloridum

1,0—0,1%. Фл. 30,0—0,1%

(Б), ФХ

Rp.: Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1% 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 0,25—1 мл подкожно 1—2 раза в день

Rp.: Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1% 30,0

D. S. Для примочек (при паренхиматозных кровотечениях)

¹ См. также эфедрин.

Изадрин Isadrinum (Б) (изопропилнорадреналина гид- рохлорид)	П. в. р. Р-ры. Фл. 10,0 и 25,0— 0,5%. Тб. 0,005
---	--

Rp.: Sol. Isadrini 0,5% 10,0
D. S. По 0,5—1 мл на одну ингаляцию

Rp.: Tab. Isadrini 0,005
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1/2—1 таблетке под язык

Мезатон Mesatonum (Б), ФХ	Вн 0,03 (0,15); П/к и В/м 0,01 (0,05); В/в 0,005 (0,025). Тб. 0,01. Амп. 1,0—1%
--	---

Rp.: Mesatoni 0,01
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Rp.: Sol. Mesatoni 0,25% 10,0
D. S. Капли в нос

Rp.: Sol. Mesatoni 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5 мл подкожно

Нафтизин Naphthyzinum (Б), ФХ (нитрат 2-нафтил-1-метил-имида- золина)	П. в. р. Р-ры 0,05 и 1%. Фл. 10,0. Эм. 0,05 и 0,1%
--	---

Rp.: Sol. Naphthyzini 1% 10,0
D. S. По 1—2 капли в полость носа 2—3 раза в день

Норадреналина гидротартрат Noradrenalini hydrotartras (Б), ФХ	0,002—0,004. П. в. р. Амп. 1,0—0,2%
---	--

Rp.: Sol. Noradrenalini hydrotartratis 0,2% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. Для капельного внутривенного вливания: 1—2 ампулы
развести в 1 л 5% раствора глюкозы

Фетанол Phethanolum (Б) (1-м оксифенил-2-этиламиноэта- нола гидрохлорид)	0,005. Тб. 0,005. Амп. 1,0—1%. Фл. 15,0—0,75%
---	--

Rp.: Phethanoli 0,005
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Rp.: Sol. Phethanoli 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл подкожно

Зарубежные препараты

Галазолин (Польша) Galazolinum (Б)	Капли в нос — 0,5 : 1000 и 1 : 1000. Фл. 10,0—0,1%
---	---

Rp.: Sol. Galazolini 1 : 1000—10,0
D. S. По 2—3 капли в каждую ноздрю 1—3 раза в день

Нафазолин (Венгрия) Naphazolinum (Б)	Ж. (оф.). Фл. 10,0
---	--------------------

Rp.: Naphazolini 10,0
D. S. Капли в нос

Новодрин для ингаляций (ГДР) Novodrinum pro inhalationibus (Б) (соответствует отечественному препарату изадринау)	10—20 кпл. Ингалируется посредством карманного ингалятора. Фл. 10,0
---	---

Rp.: Novodrini pro inhalationibus 10,0
D. S. По 10—20 капель для ингаляций 1 раз в день

Санорин (Чехословакия) Sanorinum (Б) (соответствует отечественному препарату нафтизину)	Ж. (оф.). Фл. 10,0—0,1% и 10,0—0,05%. Эм. 0,1%
---	---

Rp.: Sol. Sanorini 0,1% 10,0
D. S. Капли в нос

Rp.: Sol. Sanorini 0,05% 10,0
D. S. Глазные капли

Rp.: Emuls. Sanorini 0,1% 10,0
D. S. Капли в нос

Эуспиран (Чехословакия) Euspyranum (Б) (соответствует отечественному препарату изадринау)	Р-р (оф.). Фл. 25,0
---	---------------------

Rp.: Euspyrani 25,0
D. S. По 0,5—1 мл для ингаляции

СИМПАТОЛИТИЧЕСКИЕ И АДРЕНОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Анаприлин	0,02—0,04. П. в. р. Тб. 0,01;
Anaprilinum (Б)	0,02; 0,04. Амп. 1,0 и 5,0 —
(1-изопропиламино-3-(1-нафтилокси)-пропанола-2 гидрохлорид)	0,1%

Rp.: Anaprilini 0,02
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 4 раза в день (далее по схеме)

Rp.: Sol. Anaprilini 0,1% — 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутривенно, вводить в течение 1 минуты; эту дозу повторять с промежутками в 2 минуты до появления эффекта

Антисимпатин	3,0—20,0. Ж. (оф.). Фл. 50,0
Antisymphathinum	(препарат из печени крупного рогатого скота)

Rp.: Antisymphathini 50,0
D. S. По $\frac{1}{2}$ чайной ложки 2—3 раза в день перед едой, постепенно повышая дозу до 4 чайных ложек на прием

Дигидроэрготоксина этансульфонат	0,0005—0,0002. П. в. р. Амп.
Dihydroergotoxini ethansulfonas (Б)	1,0—0,03%. Фл. 10,0—0,1%

Rp.: Sol. Dihydroergotoxini ethansulfonatis 0,03%—1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5—2 мл внутримышечно 1 раз в день или через день

Rp.: Sol. Dihydroergotoxini ethansulfonatis 0,1%—10,0
D. S. По 5—20 капель 3 раза в день

Октадин	0,01—0,025. П. в. тр. Тб. 0,01
Octadinum (Б)	и 0,025
[сульфат 1-(N-азациклооктил)-этил-2-гуанидина]	

Rp.: Octadini 0,01
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке в день, затем в течение нескольких дней увеличить дозу до $2\frac{1}{2}$ таблеток три раза в день

Орнид Ornidum (Б) (<i>N</i> -орто-бромбензил- <i>N</i> -этил- <i>N</i> , <i>N</i> -диметиламмоний бромид)	0,05—0,1. П. в. р. Тб. 0,05. Амп. 1,0—5%
--	---

Rp.: Ornidi 0,05
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день, постепенно повышая
дозу до 2 таблеток 3 раза в день

Тропафен Troparphenum (Б) (тропил-2-фенилпропионат)	0,01—0,02. П. в. р. Амп. 1,0— 1 и 2%
--	---

Rp.: Sol. Troparpheni 1% 1,0
D. t. d. N. 20 in amp.
S. По 1—2 мл внутримышечно 1—3 раза в день

Фентоламина гидрохлорид Phentolamini hydrochloridum (Б) (гидрохлорид или метансульфо- нат 2-[<i>N</i> -пара-толил- <i>N</i> -(мета- оксифенил)-амино-метил] ими- дазолина)	0,05—0,1. П. в. р. Пр. Тб. 0,025. Пр. в амп. — 0,005
---	---

Rp.: Phentolamini hydrochloridi 0,025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Rp.: Phentolamini hydrochloridi 0,005
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Содержимое 1 ампулы растворить в 1 мл воды для инъ-
екций; внутримышечно 0,5—1 мл 1 раз в день

Зарубежные препараты

Дигидроэрготамин (Чехословакия) Dihydroergotaminum (Б)	0,0005—0,001. Амп. 1,0—0,1%. Фл. 10,0—0,2%
--	---

Rp.: Sol. Dihydroergotamini 0,1% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 0,5—1 мл 1 раз в день внутримышечно

Rp.: Sol. Dihydroergotamini 0,2%—10,0
D. S. По 10—30 капель 3 раза в день

Дигидроэрготоксин (Чехословакия)	0,0001—0,0003. Амп. 1,0—0,03%. Фл. 10,0—0,1%
Dihydroergotoxinum (Б)	

Rp.: Sol. Dihydroergotoxini 0,03% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 0,3 мл внутримышечно через день, постепенно повышая дозу до 1 мл

Rp.: Sol. Dihydroergotoxini 0,1% 10,0
D. S. По 5 капель 3 раза в день за 20—30 мин до еды, постепенно повышая дозу до 40 капель 3 раза в день

Изобарин (Югославия)	0,01—0,075. Тб. 0,025
Isobarinum (Б)	
(соответствует отечественному препарату октадину)	

Rp.: Isobarini 0,025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 1 раз в день, постепенно повышая дозу до 3 таблеток в день

Редергам (Венгрия)	П/к 0,00015—0,0003. Вн
Redergamum (Б)	0,00015—0,002. П. в. р. Амп.
(соответствует отечественному препарату дигидроэрготоксина этансульфонату)	1,0—0,03%. Фл. 10,0—0,1%. Тб. 0,00025

Rp.: Sol. Redergami 0,1% 10,0
D. S. По 3—5 капель 3 раза в день, постепенно повышая дозу до 20—40 капель 3 раза в день

Rp.: Sol. Redergami 0,03% 1,0
D. t. d. N. 5 in amp.
S. По 0,3 мл внутримышечно 1 раз в день, постепенно повышая дозу до 2 мл

Rp.: Tab. Redergami N. 20
D. S. По 1 таблетке в день под язык, постепенно повышая дозу до 7—8 таблеток в день

Эрготоксин (Чехословакия)	0,3—1 мл. Ж. (оф.) — содержит
Ergotoxinum (Б)	сумму гидрированных алкалоидов спорыньи. Амп. 1 мл

Rp.: Ergotoxini 1 ml
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 0,3—1 мл внутримышечно 1 раз в 2—3 дня

Глава III

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ОБЛАСТИ ОКОНЧАНИЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НЕРВОВ

СРЕДСТВА, РАЗДРАЖАЮЩИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ

СРЕДСТВА, РАЗДРАЖАЮЩИЕ КОЖУ И СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ¹

Акофит (радикулин) № 1, 2 и 3
Acophytum № 1, 2 и 3

6—10 клл. Ж. (оф.) — комплекс-
ные препараты, состоящие из
разведенных настоек расти-
тельного происхождения и ра-
створов неорганических ве-
ществ

Rp.: Acophyti N. 1—20,0

D. S. По 6—10 капель в период острых болей через каж-
дые 2 ч, в течение 3—7 дней (при радикулитах
любой этиологии)

Rp.: Acophyti N. 2—20,0

D. S. Принимать после акофита № 1. По 6—10 капель
через каждые 2 ч в течение 2—3 дней (в случаях
радикулитов ревматического происхождения число
дней может быть увеличено до 2 недель)

Rp.: Acophyti N. 3—20,0

D. S. После акофита № 2. По 8—10 капель через каждые
3 ч в течение 3—7 дней (за исключением радикулитов
ревматической этиологии).

(При лечении акофитом противопоказаны тепловые
процедуры).

¹ См. также венапиолин, випраксин, випросал, апизартрон,
випералгин, випратокс, вирапин.

Бальзам Санитас
Balsamum Sanitas

Мз. (оф.). Состав: метиловый эфир салициловой кислоты — 24 части, эвкалиптовое масло — 1,2 части, скипидар очищенный — 3,2 части, камфора — 5 частей, сало свиное и вазелин — аа 33,3 части

Rp.: Balsami Sanitas 25,0
D. S. Втирание

Бом-бенге
Boum-benge

Мз. (оф.). Состав: ментол — 4 части, метиловый эфир салициловой кислоты — 21 часть, вазелин — 75 частей

Rp.: Ung. Boum-benge 100,0
D. S. Для растираний

Горчичный спирт
Spiritus Sinapis, ФХ

Горчичный спирт (2% спиртовой раствор горчичного эфирного масла)

Rp.: Spiritus Sinapis 25,0
D. S. Втирание

Дарминол (масло дарминное)
Darminolum (oleum Cinae)

Эфирное масло из цветов цитварной полыни. Применяется в смеси с другими раздражающими веществами

Rp.: Darminoli
Methylii salicylatis
Ol. Lini аа 15,0
M. f. lin.
D. S. Втирание

Камфорная мазь
Unguentum Camphoratum

Мз. (оф.). Содержит 10% камфоры. Фл. 15,0 и 25,0

Rp.: Ung. Camphorati 25,0
D. S. Втирание

Камфорное масло для наружного применения
Oleum Camphoratum pro usum externum

Лзм. (оф.). Содержит 10% камфоры. Фл. 10,0, 15,0 и 30,0

Rp.: Ol. Camphorati 30,0
D. S. Втирание

Камфорный спирт
Spiritus Camphoratus

(Оф.). Состав: камфора — 10%,
вода — 20%, спирт — 70%

Rp.: Spiritus Camphorati 100,0
D. S. Для растираний

Капсин
Capsinum

Лнм. (оф.). Состав: метиловый
эфир салициловой кислоты —
10 частей, настойка стручко-
вого перца и беленное масло —
аа 20 частей. Фл. 50,0 и 100,0

Rp.: Capsini 50,0
D. S. Втирание

Капситрин
Capsitrinum

Лнм. (оф.). Состав: настойка
стручкового перца — 27 ча-
стей, настойка зверобоя — 1
часть, мыло зеленое — 10 ча-
стей, раствор аммиака 20% —
6 частей, спирт этиловый 60° —
56 частей. Фл. 50,0 и 100,0

Rp.: Capsitrini 100,0
D. S. Втирание

Линимент аммиачный
Linimentum ammoniatum

Лнм. (оф.). Состав: раствор ам-
миака — 25 частей, масло под-
солнечное — 74 части, олеино-
вая кислота — 1 часть. Фл.
25,0 и 50,0

Rp.: Lin. ammoniati 50,0
D. S. Втирание

Масло терпентинное очищенное
(скипидар очищенный)
Oleum Terebinthinae rectificatum,
ФХ

Ж. в. нр. с. р. Мз. (оф.) — 20%.
Лнм.

Rp.: Ung. Terebinthinae 25,0
D. S. Для втирания

Rp.: Ol. Terebinthinae 10,0
Adipis suilli ad 50,0
M. f. ung.
D. S. Для втирания

Rp.: Ol. Terebinthinae
Chloroformii аа 15,0
Methylis salicylatis 10,0
M. f. lin.
D. S. Втирать в область суставов

Rp.: Ol. Terebinthinae 10,0

D. S. По 10—15 капель на стакан кипящей воды для ингаляций

Ментол
Mentholum, ФХ

П. в. нр. с м. р. Мз. Лнм.

Rp.: Mentholi 0,1

Ol. Vaselinei 10,0

M. D. S. Капли в нос

Rp.: Mentholi 1,0

Spiritus vini 90° 50,0

M. D. S. Для втирания

Rp.: Mentholi 0,1

Protargoli 0,2

Vaselinei 10,0

M. f. ung.

D. S. Мазь для носа

Rp.: Mentholi 2,0

Ol. Helianthi ad 20,0

M. f. lin.

D. S. Для смазывания воспаленных лимфатических желез

Метилсалицилат
Methyl salicylas, ФХ

Ж. м. с. р. Мз. Лнм. Мз. (оф.) —
10% на вазелине

Rp.: Methyl salicylatis

Ol. Hyoscyami aa 30,0

M. f. lin.

D. S. Втирание

Rp.: Methyl salicylatis

Chloroformii

Ol. Terebinthinae aa 15,0

Ol. Hyoscyami 45, 0

M. f. lin.

D. S. Втирание

Rp.: Ung. Methyl salicylatis 25,0

D. S. Для втирания в больной сустав

Муравьиный спирт
Spiritus formicicus artificialis

5% спиртовой раствор муравьиной кислоты. Фл. 40,0 и 80,0

Rp.: Spiritus formicici artificialis 40,0

D. S. Для втирания

Перец стручковый — плод
Fructus Capsici

Настойка. Мазь от обмороживания

Rp.: T-rae Capsici 20,0

D. S. Для растирания

Rp.: T-rae Capsici 7,7
 Ac. Formicici 0,32
 Sol. Ammonii caustici 1,4
 Ol. Camphorati 6,4
 Spiritus saponis kalini 2,0
 Ol. Ricini
 Lanolini anhydrici aa 1,0
 Adipis suilli 9,75
 Vaselini flavi ad 100,0
 M. f. ung.
 D. S. Мазь от обмороживания

Перцовый пластырь
 Emplastrum Capsici

Плс. (оф.) — состав: экстракт стручкового перца — 11%, экстракт белладонны густой — 0,3%, настойка арники — 0,3%

Rp.: Empl. Capsici 10 × 18
 D. S. Кожу в области наибольшей болезненности обезжирить, насухо протереть и наложить пластырь клейкой стороной. Если нет сильного раздражения, оставить на 2 суток

Раствор аммиака (нашатырный спирт)
 Solutio Ammonii caustici

10% водный раствор аммиака.
 Фл. 50,0 и 100, 0. Лнм.

Rp.: Sol. Ammonii caustici
 Ol. Terebinthinae
 Ol. Lini aa 20,0
 M. f. lin.
 D. S. Для втирания

Салинимент
 Salinimentum

Лнм. (оф.). Состав: метиловый эфир салициловой кислоты и хлороформ — aa 10 частей, бензенное масло — 30 частей.
 Фл. 50,0

Rp.: Salinimenti 50,0
 D. S. Для втирания

Зарубежные препараты

Мараславин (Болгария)
 Maraslavinum

Наружно. Ж. (оф.). — из растительного сырья. Фл. 100,0

Rp.: Maraslavini 100,0
 D. S. Для смачивания тампонов при воспалительных формах пародонтоза

ГОРЕЧИ

Аир болотный — корневище
Rhizoma Acogus Calamus, ФХ

Инф. 1 : 10

Rp.: Inf. rhiz. Calami 20,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день за 10 мин до еды

Горечавка — корень
Radix Gentianae

Дек. 1 : 20. Сб.

Rp.: Dec. rad. Gentianae 10,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой

Золототысячник — трава
Herba Centaurii

Сб. Инф. 1 : 10. Настойка

Rp.: Inf. herbae Centaurii 20,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой

Rp.: Herbae Centaurii 100,0

D. S. Заварить 1 столовую ложку травы в стакане кипятку;
по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды

Настойка горькая
Tinctura amara

10—30 кпл. Ж. (оф.). Состав:
трава золототысячника и ли-
стья трилистника — аа 60 ча-
стей, корневище аира и трава
полыни — аа 30 частей; ко-
жура мандарина — 15 частей,
спирт 40° до 1 л

Rp.: T-rae amarae 15,0

D. S. По 15 капель 3 раза в день перед едой

Отавник — сухой экстракт
Extractum Leonticis siccum (Б)

0,5. П. в. с. р. Тб. 0,5. Пр.

Rp.: Extracti Leonticis sicci 0,5

D. t. d. N.10 in tab.

S По 1 таблетке за 15—30 мин до еды; таблетку разжевывать
и запить небольшим количеством воды

Подорожник — сок
Succus Plantaginis

Ж. (оф.) — состав: смесь равных
объемов сока подорожника
большого и блошного, консер-
вированного 20% спиртом.
Фл. 150,0

Rp.: Succu Plantaginis 150,0

D. S. По 1 столовой ложке за 15—20 мин до еды 3 раза
в день

Полынь — настойка
Tinctura Absinthii, ФХ

10—30 кпл.

Рр.: T-rae Absinthii 25,0

D. S. По 15—20 капель 3 раза в день перед едой

Трилистник водяной — лист
Folium Menyanthidis, ФХ

Сб. инф. 1 : 20

Рр.: Inf. fol. Menyanthidis 10,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой

Рр.: Fol. Menyanthidis

Herbae Absinthii

Rad. Taraxaci aa 20,0

M. D. S. 1 столовую ложку смеси заварить в стакане кипятку; выпить в течение дня в 3 приема перед едой

Цикорий — корень
Radix Cichorii

Сб. Дек. 1 : 10

Рр.: Dec. rad. Cichorii 20,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой

Рр.: Rad. Cichorii

Rad. Taraxaci

Fol. Trifolii fibrini

Fol. Menthae piperitae aa 20,0

M. D. S. 1 столовую ложку смеси заварить в стакане кипятку; выпить в течение дня в три приема перед едой

Чай аппетитный

Сб. (оф.) — состав: трава полы-
ни — 8 частей, трава тысяче-
листника — 2 части

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Растительные слабительные,
содержащие антрагликозиды

Алоэ
Aloë

0,03—0,2. П. в. р. Пр

Рр.: Aloës 0,03

Sacchari 0,2

M. f. pulv. D. t. d. N.10

S. По 1 порошку 2 раза в день

Алоэ — густой экстракт
Extractum Aloës spissum

0,05—0,1. ГЖ Пл

Rp.: Extr. Aloës spissi 3,0
Pulv. et extr. rad. Taraxaci q. s.
M. f. pilulae N.30
D. S. По 1 пилюле 3 раза в день

Алоэ — настойка
Tinctura Aloës

10—20 кпл.

Rp.: T-rae Aloës 15,0
D. S. По 10—20 капель 2—3 раза в день

Алоэ — сухой экстракт
Extractum Aloës siccum

0,015 — 0,1. П. в. р. Пр.

Rp.: Extr. Aloës sicci 0,45
Pulv. et extr. rad. Glycyrrhizae q. s.
M. f. pilulae N. 30
D. S. По 1 пилюле 3 раза в день

Жостер — плоды
Fructus Rhamni catharticae, ФХ

Сб. Дек. 1 : 10

Rp.: Dec. fructus Rhamni catharticae 20,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

Крушина имеретинская —
жидкий экстракт
Extractum Rhamni imeretinae
fluidum

5,0—10,0

Rp.: Extr. Rhamni imeretinae fluidi 100,0
D. S. По 2 чайные ложки перед сном

Крушина ломкая — кора
Cortex Frangulae, ФХ

Дек. 1 : 10. Жидкий экстракт
20—40 кпл. Сухой экстракт.
Тб. 0,2

Rp.: Dec. corticis Frangulae 20,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке утром и вечером

Rp.: Extr. Frangulae fluidi 50,0
D. S. По 20—40 капель утром и вечером

Rp.: Extr. Frangulae sicci 0,2
D. t. d. N.50 in tab.
S. По 1—2 таблетки на ночь

Рамнил
Rhamnilum

0,2. П. в. нр. Тб. 0,2 (сухой стандартизованный препарат коры крушины)

Rp.: Rhamnili 0,2
D. t. d. N.10 in tab.
S. По 1 таблетке на ночь

Ревень — корень и корневище
Rhizoma et radix Rhei palmati,
ФХ

0,5. Пр. Тб. 0,3 и 0,5. Сухой экстракт. Настойка ревеня горькая. Сироп ревенный (оф.). Сб.

Rp.: Pulv. radicis Rhei 0,5
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку на ночь

Rp.: Extr. Rhei 7,5
Pulv. et extr. radicis Glycyrrhizae q. s.
M. f. pilulae N.30
D. S. По 2 пилюли на ночь

Rp.: Tab. radicis Rhei 0,5
D. t. d. N.12
S. По 1 таблетке на ночь

Rp.: Sirupi Rhei 50,0
D. S. По 1 столовой ложке на ночь

Rp.: T-rae Rhei amarae 50,0
D. S. По 1 чайной ложке 2 раза в день перед едой

Сенна — лист
Folium Sennae, ФХ

Инф. 1 : 10

Rp.: Inf. fol. Sennae 20,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке утром и вечером

Сенна — сложный настой
(венское питье)
Infusum Sennae compositum

Инф. (оф.). Состав: листья сенны, сенъетова соль, мёд, спирт аа 10 частей, вода — 75 частей

Rp.: Inf. Sennae compositi 120,0
D. S. По 1—2 столовые ложки на ночь

Солодкового корня сложный порошок
Pulvis Glycyrrhizae compositus

5,0. Пр. (оф.). Состав: порошок из листьев сенны и порошок солодкового корня — аа 20 частей, порошок плодов фенхеля и сера очищенная — аа 10 частей, сахар — 40 частей

Rp.: Pulv. Glycyrrhizae compositi 50,0
D. S. По 1 чайной ложке 2 раза в день (запивать водой)

Франгин
Franginum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — содержит сухой
стандартизованный препарат
коры крушины (в 1 тб. — 0,05
антрагликозидов)

Rp.: Tab. Frangini N.20
D. S. По 1 таблетке на ночь

Чай слабительный

Сбор, состав: александрийский
лист — 3 части, кора крушины
и плоды жостера — аа 2 части,
плоды аниса и корень солод-
ки — аа 1 части

Солевые слабительные

Карловарская соль искусствен-
ная (карлсбадская)
Sal carolinum factitium

15,0—20,0. Пр. (оф.). Состав:
сульфат натрия — 22 части,
натрия гидрокарбонат — 18 ча-
стей, натрия хлорид — 9 ча-
стей, сульфат калия — 1 часть

Rp.: Salis carolini factitii 50,0
D. S. По 1 столовой ложке в $\frac{1}{2}$ стакана теплой воды на
ночь

Магния сульфат (английская
соль)
Magnesii sulfas, ФХ

Вн 10,0—30,0. П. в. р. Пр.

Rp.: Magnesii sulfatis 20,0
D. S. На 1 прием; развести в $\frac{1}{2}$ стакана теплой воды

Натрия сульфат
(глауберова соль)
Natrii sulfas, ФХ

15,0—30,0. П. в. р. Пр.

Rp.: Natrii sulfatis 20,0
D. S. На один прием в $\frac{1}{2}$ стакана теплой воды

Соль Исти-Су
Sal Isthī-Su

3,0—6,0. В. в. р. Пр.

Rp.: Salis Isthī-Su 30,0
D. S. По $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке в $\frac{1}{2}$ стакана теплой воды
за 1—1 $\frac{1}{2}$ ч до еды 3 раза в день

Слабительные растительные масла

Касторовое масло <i>Oleum Ricini</i> , ФХ	15,0—30,0. Кпс. Эм.
--	---------------------

Rp.: Olei Ricini 30,0
D. S. На 1 прием

Rp.: Emuls. ol. Ricini 180,0
Sirupi simplicis 20,0
M. D. S. По 1 столовой ложке через час (до наступления
слабительного эффекта)

Rp.: Olei Ricini 1,5
D. t. d. N.20 in caps. gelat. elasticis
S. По 10—20 капсул на прием

Органические синтетические слабительные средства

Изафенин <i>Isapheninum</i> (Б)	0,025 (0,05). П. в. нр. Тб. 0,01
------------------------------------	----------------------------------

Rp.: Isaphenini 0,01
D. t. d. N.6 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Фенолфталеин — таблетки (пурген) <i>Tabulettae Phenolphthaleini</i> (Purgenum), ФХ	0,1—0,2. Тб. 0,05 и 0,1
---	-------------------------

Rp.: Phenolphthaleini 0,1
D. t. d. N.25 in tab.
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Слабительные средства других групп

Вазелиновое масло <i>Oleum vaselini</i> (Paraffinum liqui- dum), ФХ	15,0—30,0
---	-----------

Rp.: Ol. vaselini 100,0
D. S. По 1—2 столовые ложки в день

Гулявник струйчатый — жидкий экстракт <i>Extractum Descurinae Sophiae</i> <i>fluidum</i>	15—20 кпл.
---	------------

Rp.: Extr. Descurinae Sophiae fluidi 20,0
D. S. По 15—20 капель 2 раза в день после еды

Льняное семя Semen Lini	5,0. Per se. Слизь (добавляется к различным микстурам)
----------------------------	---

Rp.: Seminis Lini 100,0

D. S. По 1 чайной ложке истолченных семян утром и
вечером; запивать теплой водой

Морская капуста — порошок Pulvis Laminariae saccharinae	3,0—5,0. П. в. нр. Пр.
--	------------------------

Rp.: Pulv. Laminariae saccharinae 100,0

D. S. По $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке на ночь

Сера очищенная Sulfur depuratum	0,5—1,0. П. в. нр. Пр.
------------------------------------	------------------------

Rp.: Sulfuris depurati 1,0

D. t. d. N.6

S. По 1 порошку на ночь

Rp.: Sulfuris depurati 5,0

Magnesiae ustae 10,0

Sacchari 15,0

M. f. pulv.

D. S. По 1 чайной ложке на ночь

Стальник пашенный — корень Radix Ononidis arvensis	Дек. 1 : 30. Настойка 40—50 кпл.
---	----------------------------------

Rp.: Dec. rad. Ononidis arvensis 6,0—200,0

D. S. По $\frac{1}{4}$ стакана 3 раза в день перед едой

Rp.: T-rae Ononidis arvensis 100,0

D. S. По 1 чайной ложке 3 раза в день за полчаса до еды

Ртути монохлорид (каломель) Hydrargyri monochloridum (Calomelas) (Б)	0,5 (1,0). П. в. нр. Пр.
--	--------------------------

Rp.: Hydrargyri monochloridi 0,5

D. t. d. N.5

S. По 1 порошку в день (слабительное)

Rp.: Hydrargyri monochloridi 0,03

Sacchari lactis 0,25

M. f. pulv. D. t. d. N.12

S. По 1 порошку 2—3 раза в день (желчегонное)

ЖЕЛЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА ¹

Аллохол
Allocholum

1—2 тб. Тб. (оф.). Фл. 50 тб.

Rp.: Tab. Allocholi N. 50
D. S. По 1—2 таблетки 3 раза в день после еды

Барбара
Barbara

5,0—10,0. П. в. р. Пр. (Натуральная соль источника № 4 — «Барбара» курорта Трускавец)

Rp.: Barbarae 150,0
D. S. По 1—2 чайные ложки в 1½ стаканах теплой воды натощак, 2—3 раза в неделю

Берберина сульфат
Berberini sulfas

0,005—0,01. Тб. 0,005

Rp.: Berberini sulfatis 0,005
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день за 15—20 мин до еды

Бессмертник — сухой экстракт
Extractum Helichrysi arenarii sic-
cum

1,0—2,0. Гранулированный порошок

Rp.: Extr. Helichrysi arenarii sicci 30,0
D. S. По ¼ чайной ложки 3 раза в день перед едой

Бессмертник — цветки
Flores Helichrysi arenarii, ФХ

Сб. Дек. 1 : 10

Rp.: Dec. Helichrysi arenarii 20,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день перед едой

Дегидрохолевая кислота (хологон)
Acidum dehydrocholicum (Chologolum), ФХ

0,25—0,5. П. в. нр. Тб. 0,2

Rp.: Acidi dehydrocholic 0,2
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

¹ См. также магния сульфат — внутрь, каломель.

Дехолин
Decholinum

0,25—0,5. П. в. р. Р-ры. Амп.
5,0—5%

Rp.: Sol. Decholini 5% 5,0

D. t. d. N. 5 in amp.

S. По 5—10 мл внутривенно 1 раз в день, постепенно увеличивая дозу до 10 мл —20% (вводить медленно!)

Кукурузные рыльца
Stigmata Maydis

Сб. Инф. 1 : 10. Жидкий экстракт 30—40 кпл.

Rp.: Extr. stigmatis Maydis fluidi 25,0

D. S. По 30—40 капель 2—3 раза в день перед едой

Rp.: Stigmatis Maydis 100,0

D. S. 2 столовые ложки сбора настоять в стакане кипятку. Выпить в течение дня в 3 приема

Rp.: Inf. stigmatis Maydis 20,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 4—6 раз в день

Мята перечная — лист
Folium Menthae piperitae, ФХ

Сб. Инф. 1 : 10. Настойка

Rp.: Inf. fol. Menthae piperitae 20,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день перед едой

Rp.: T-rae Menthae piperitae 40,0

D. S. По 20—30 капель 3 раза в день перед едой

Никодин (изохол)
Nicodinum (Isocholum), ФХ
(оксиметиламид пиридин-3-карбоновой кислоты)

0,5—1,0. П. в. р. Тб. 0,5

Rp.: Nicodini 0,5

D. t. d. N. 100 in tab.

S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день до еды, запивать $\frac{1}{2}$ стакана воды

Одуванчик — корень
Radix Taraxaci

Сб. Дек. 1 : 10

Rp.: Dec. rad. Taraxaci 40,0—400,0

D. S. По 1 стакану 2 раза в день перед едой

Rp.: Rad. Taraxaci 50,0

D. S. 1 чайную ложку сбора заварить в стакане кипятку; выпить в течение дня в 3 приема перед едой

Оксафенамид Oxaphenamidum, ФХ (пара-оксифенилсалициламид)	0,25—0,5. П. в. нр. е. р. Тб. 0,25 и 0,5
---	---

Rp.: Oxaphenamidi 0,25
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день перед едой в течение
15—20 дней

Редька посевная — сок Raphanus sativus — succus	Натереть редьку, отжать сок. На ночь по 1/2 стакана, постепенно повышая дозу до 2 стаканов
--	--

Фламин Flaminum	0,05. Сухой концентрат бессмерт- ника Тб. 0,05
--------------------	---

Rp.: Flaminum 0,05
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день до еды

Холелитин № 1 Cholelitinum N. 1	10 кпл. Ж. (оф.). Состав: смесь равных объемов настоек сухой коры барбариса, семян остро- pestро и свежего корня диоско- реи кавказской. Фл. 30,0
------------------------------------	---

Холелитин № 2 Cholelitinum N. 2	10 кпл. Ж. (оф.). Состав: смесь равных объемов настоек коры хинного дерева, свежего корня чистотела и листьев лептандры виргинской. Фл. 30,0
------------------------------------	--

Холелитин № 3 Cholelitinum N. 3	10—15 кпл. Ж. (оф.) — состав: смесь равных объемов настоек коры и корня барбариса и чи- либухи с добавлением кальция карбоната осажденного и же- леза сульфата Фл. 50,0
------------------------------------	--

Rp.: Cholelitini N. 1—30,0
Cholelitini N. 2—30,0
Cholelitini N. 3—50,0
D. S. № 1 и № 2 принимать по 10 капель 3 раза в день
за 15 мин до еды, чередуя их по дням; № 3 — по
10—15 капель 3 раза в день через 2 ч после еды
ежедневно

Холензим
Cholenzymum

0,5. Држ. 0,5 — состав: сухая желчь, сухая поджелудочная железа, сухая слизистая кишок убойного скота — аа

Rp.: Dragée Cholenzymi 0,5
D. t. d. N. 50
S. По 1 драже 1—3 раза в день перед едой

Холецин
Cholecinum

0,3. П. в. р. Тб. 0,15 (комплексное соединение холенната натрия и лецитина)

Rp.: Cholecini 0,15
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 2 таблетки 3 раза в день за 15—20 мин до еды

Холосас
Cholosasum

5,0. Ж. (оф.) — экстракт из плодов шиповника. Фл. 250,0

Rp.: Cholosasi 250,0
D. S. По 1 чайной ложке 2—3 раза в день

Циквалон
Cycvalonium
(2,6-диванилиден-циклогексанон)

0,1. П. в. нр. Тб. 0,1

Rp.: Cycvaloni 0,1
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день после еды

Чай желчегонный

Сб. (оф.). Состав: цветы бессмертника — 4 части, листья трилистника — 3 части, листья мяты и плоды кориандра — аа 2 части

Чистотел — корень и трава
Herba et radix Chelidonii

Инф. 1 : 10. Сб.

Rp.: Inf. rad. et hb. Chelidonii 10,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp.: Rad. et hb. Chelidonii 100,0
D. S. 1 столовую ложку сбора заварить в стакане кипятку; выпить в течение дня в 3 приема

Растительные смеси, обладающие
желчегонным действием

- Рр.:** Fol. Menthae piperitae
Flor. Chamomillae aa 40,0
Fol. Trifolii
Herbae Centaurii aa 20,0
M. D. S. 1 столовую ложку смеси заварить в 1½ стаканах кипятку. Выпить в течение дня в 3 приема перед едой
- Рр.:** Flor. Chamomillae
Fol. Menthae
Herbae Serpylli aa 30,0
M. D. S. 1 столовую ложку смеси заварить в 1½ стаканах кипятку. Выпить в течение дня в 3 приема перед едой
- Рр.:** Rad. Taraxaci
Rad. et herbae Chelidonii
Rhiz. Rhei aa 30,0
M. D. S. 1 столовую ложку смеси заварить в стакане кипятку; выпить в течение дня в 3 приема перед едой
- Рр.:** Rad. et hb. Chelidonii 15,0
Fol. Menthae
Flor. Crataegi aa 30,0
M. D. S. 1 столовую ложку смеси заварить в стакане кипятку; выпить в 3 приема в течение дня перед едой

Зарубежные препараты

Билихол (Чехословакия) Bilicholum	1—2 држ. Држ. (оф.) — состав: комплексная соль уротропина с холевой кислотой. Амп. (оф.) содержат тот же препарат
--	--

- Рр.:** Dragée Bilicholi N. 30
D. S. По 1—2 драже 3 раза в день после еды, не раскусывая
- Рр.:** Sol. Bilicholi 1 ml
D. t. d. N. 5 in amp.
S. По 1 мл подкожно или внутримышечно 1—2 раза в неделю (для усиления лечебного эффекта)

Холагол (Чехословакия) Cholagolum	5—20 кл. ГЖ. (оф.) — состав: красящее вещество корня ку- румы — 0,0225, эмодин из кру- шины — 0,009, магния сали- цилат — 0,18, эфирные мас- ла — 5,535, спирт — 0,9, олив- ковое масло — до 10,0. Фл. 10,0
--	--

- Рр.:** Cholagoli 10,0
D. S. По 5 капель на кусочке сахара 3 раза в день за пол-
часа до еды

СРЕДСТВА, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ

ОБВОЛАКИВАЮЩИЕ И АДСОРБИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Алтейный корень Radix Althaeae, ФХ	Сироп. Инф. (оф.) — 1 : 30
---	----------------------------

Rp.: Inf. Althaeae 200,0
 Sirupi Althaeae 40,0
 M. D. S. Через каждые 2 ч по 1 столовой ложке

Алюминия гидроокись Aluminii hydrooxydum, ФХ	П. в. нр. Пр.
---	---------------

Rp.: Aluminii hydrooxydi 0,5
 D. t. d. N. 10
 S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp.: Aluminii hydrooxydi 30,0
 D. S. Размешать в $\frac{1}{2}$ стакана воды; на 1 прием при отравлении

Бентонитовая глина — гильаби Gilabi	1,0—2,0. П. в. нр. Пр. Тб. 1,0
--	--------------------------------

Rp.: Gilabi 2,0
 D. t. d. N. 10
 S. По 1 порошку 2—3 раза в день до еды

Rp.: Gilabi 1,0
 D. t. d. N. 20 in tab.
 S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день до еды

Бентонитовая глина — тиха-ас-кане Ticha-askane	1,0—2,0. П. в. нр. Пр. Кпс.
---	-----------------------------

Rp.: Ticha-askanis 1,0
 D. t. d. N. 10 in caps. gelat.
 S. По 1—2 капсулы 3 раза в день до еды

Глина белая (каолин) Bolus alba, ФХ	П. в. нр. Пр. Пст. Мз.
--	------------------------

Rp.: Boli albae 50,0
 D. S. На 1 прием в стакане теплой воды при отравлении

Магния трисиликат Magnesii trisilicas	0,5—1,0. П. в. нр. Пр. Кпс.
--	-----------------------------

Rp.: Magnesii trisilicatis 0,5
 D. t. d. N. 10
 S. По 1 порошку 3 раза в день

Уголь активированный (карбон-
лен)
Carbo activatus (Carbolenum),
ФХ

П. в. нр. Пр. Тб. (оф.) — состав:
уголь активированный — 0,5,
наполнителей — q. s.

Rp.: Carbonis activati 30,0
D. S. На 1 прием в $\frac{1}{2}$ стакана воды при отравлении
Rp.: Tab. Carbonis activati 0,5
D. t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

ВЯЖУЩИЕ СРЕДСТВА

Вяжущие средства растительного
происхождения

Бузина — цветки
Flores Sambuci

Сб. Инф. 1 : 10

Rp.: Flor. Sambuci 100,0
D. S. 2 столовые ложки цветов заварить в стакане кипятку.
Выпить в течение дня в три приема перед едой
Rp.: Inf. flor. Sambuci 20,0—200,0
D. S. Полоскание

Галаскорбин
Galascorbinum

П. в. р. Р-ры. 0,5—1% (комплесное
соединение аскорбино-
вой и галловой кислот)

Rp.: Sol. Galascorbinum 1% 100,0
Sterilisetur!
D. S. Для смачивания салфеток при лечении ран, ожогов

Горец мясочерный — жидкий
экстракт
Extractum Polygoni carnei fluidum

3,0—5,0

Rp.: Extr. Polygoni carnei fluidi 100,0
D. S. По $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке 2 раза в день

Дуб — кора
Cortex Quercus, ФХ

Дек. 1 : 10 и 2 : 10

Rp.: Dec. cort. Quercus 30,0—300,0
D. S. Для полоскания
Rp.: Dec. cort. Quercus 40,0—200,0
D. S. Для смачивания кожи при ожогах

Rp.: Dec. cort. Quercus 30,0—300,0
Aluminis 4,5
Glycerini 30,0
M. D. S. Для полоскания

Зверобой — трава
Herba Hyperici perforati, ФХ

Сб. Инф. 1 : 10. Настойка

Rp.: Inf. herbae Hyperici perforati 20,0—200,0
D. S. На 3 приема в течение дня, перед едой
Rp.: Herbae Hyperici perforati 50,0
D. S. Одну столовую ложку травы залить стаканом кипятка, варить 10 мин, остудить, процедить; полоскание
Rp.: T-rae Hyperici 40,0
D. S. По 20—30 капель 3 раза в день перед едой

Змеевик — корневище
Rhizoma Bistortae, ФХ

Инф. 1 : 30. Жидкий экстракт
20—30 кпл.

Rp.: Inf. rhiz. Bistortae 6,0—180,0
D. S. На 3 приема в течение дня перед едой
Rp.: Extr. Bistortae fluidi 30,0
D. S. По 30 капель 3 раза в день

Кровохлебка — корень и корне-
вище
Rhizoma et radix Sanguisorbae

Дек. 1 : 10. Жидкий экстракт

Rp.: Dec. rhiz. et rad. Sanguisorbae 40,0—400,0
D. S. По 1 столовой ложке через каждые 2 ч до действия, затем по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 5—6 дней
Rp.: Extr. Sanguisorbae fluidi 30,0
D. S. По 40 капель 4—5 раз в день

Лапчатка — корневище
Rhizoma Tormentillae

Сб. Настойка. Дек.

Rp.: T-rae Tormentillae 30,0
D. S. По 15—20 капель 3 раза в день
Rp.: Dec. rhizomae Tormentillae 20,0—200,0
D. S. Полоскание

Ольха — кора
Cortex Alni

Инф. 1 : 10

Rp.: Inf. cort. Alni 20,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Ромашка — цветки
Flores Chamomillae, ФХ

Сб. Инф. 1 : 20

Rp.: Inf. flor. Chamomillae 10,0—200,0
D. S. На 3 приема в течение дня

Rp.: Flor. Chamomillae 100,0
D. S. Две столовые ложки цветов настоять в двух стаканах кипятку в течение часа; полоскание, промывание, примочка

Rp.: Flor. Chamomillae 50,0
D. S. 1 столовую ложку цветков заварить в стакане кипятку, охладить, профильтровать; принять в 2—3 приема в течение дня

Танальбин
Tannalbinum

0,3—1,0. П. в. нр. Пр. Тб. 0,25,
0,3, 0,5

Rp.: Tannalbini 0,5
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Танин
Tanninum, ФХ

П. в. с. глц. р. Р-ры.

Rp.: Tannini 3,0
Aq. destill. 100,0
M. D. S. Для смачивания кожи при ожогах

Rp.: Tannini 1,0
Glycerini ad 10,0
M. D. S. Для смазывания гортани

Rp.: Sol. Tannini 0,5% 500,0
D. S. Для промывания желудка

Rp.: Tannini 3,0
T-rae Iodi 1,0
Glycerini ad 20,0
M. D. S. Для смазывания десен

Rp.: Tannini 1,5
Spiritus vini 50,0
M. D. S. Для смазывания трещин сосков

Теальбин
Thealbinum, ФХ

0,3—0,5. П. в. нр. Пр. (продукт взаимодействия дубильных веществ чайного листа с казеином)

Rp.: Thealbini 0,5
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3—4 раза в день

Тхмелини Tchmelinum	0,3—0,6. П. в. нр. (сухой экстракт из соплодий ольхи). Пр.
Rp.: Tchmelini 0,5 D. t. d. N. 20 in charta cerata S. По 1 порошку 3 раза в день	
Черемуха — ягода Bacca Pruni racemosae	Сб.
Rp.: Baccae Pruni racemosae 100,0 D. S. 1 столовую ложку ягод заварить 1 стаканом кипящей воды, кипятить 20 мин, принимать по 1/2 стакана 2—3 раза в день	
Черника — плод Fructus Myrtilli	Сб.
Rp.: Fructus Myrtilli 100,0 D. S. 2 чайные ложки ягод на стакан кипятку (готовить так же, как отвар из черемухи)	
Шалфей — лист Folium Salviae, ФХ	Инф. 1 : 10. Настойка
Rp.: T-rae Salviae 15,0 D. S. По 30 капель на стакан воды для полоскания Rp.: Inf. fol. Salviae 20,0—200,0 D. S. Полоскание	
Препараты тяжелых металлов, алюминия, висмута и комбинированные препараты, обладающие вяжущим действием	
Бисал * Bisalum (A)	1 тб. Тб. (оф.) — состав: опия порошок — 0,01, висмута нитрат основной и фенолсалицилат — аа 0,25
Rp.: Tab. Bisali N. 12 D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день	
Викалин Vicalinum	1—4 тб. Тб. (оф.) — состав: висмута нитрат основной — 0,36, магния карбонат — 0,4, натрия гидрокарбонат — 0,2, порошок корневища айры и коры крушины — аа 0,025, келлин и рутин — аа 0,005
Rp.: Tab. Vicalini N. 100 D. S. По 1—4 таблетки 3 раза в день после еды	

Гальманин
Galmaninum

Пр. (оф.). Состав: окись цинка — 10 частей, салициловая кислота — 2 части, тальк и крахмал аа 44 части

Rp.: Galmanini 50,0
D. S. Присыпка

Детская присыпка

Пр. (оф.). Состав: окись цинка — 1 часть, крахмал — 1 часть, тальк — 8 частей

Карандаш кровоостанавливающий
Stilus aluminis

(Оф.). Состав: квасцы — 20%, алюминия сульфат — 78%, окись кальция — 2%

Rp.: Stili aluminis N. 2
D. S. Для остановки кровотечений при мелких порезах

Квасцы
Aluminii et Kalii sulfas

П. в. р. Пр. Тб. 1,0. Р-ры

Rp.: Aluminii et Kalii sullatis 2,0
Aq. destill. 200,0
M. D. S. Для полоскания или спринцевания

Rp.: Aluminii et Kalii sulfatis 50,0
D. S. 1 столовую ложку для ножной ванны

Rp.: Sol. Aluminii et Kalii sulfatis 1% 5,0
D. S. Глазные капли

Rp.: Aluminii et Kalii sulfatis 1,0
D. t. d. N. 20 in tab.
S. Растворить 2 таблетки в стакане воды для полоскания

Квасцы жженные
Alumen ustum

П. в. тр. Пр.

Rp.: Aluminis usti
Talci аа 50,0
M. f. pulv.
D. S. Присыпка

Rp.: Ac. salicylici 2,0
Aluminis usti
Talci аа 50,0
M. f. pulv.
D. S. Присыпка

Неоанузол
Neonanosolum

Сп. (оф.). Состав: висмута нитрат основной — 0,075, танин — 0,05, окись цинка — 0,2, йод и резорцин — аа 0,005, метиленовый синий — 0,003

Rp.: Suppos. Neonansoli N. 10
D. S. По 1 свече 1—2 раза в задний проход

Паста «ГС»
Pasta «GS»

Пст. (оф.) — состав: измельченные в пудру осадки славяновской воды — 25% и вазелин — 75%

Rp.: Pastae «GS» 100,0
D. S. Для компрессов при радикулитах, невритах, тендовагинитах, нейродермитах и поражениях кожи, сопровождающихся зудом

Раствор Бурова
Solutio Burovi

Ж. (оф.). Содержит 8% алюминия ацетата

Rp.: Sol. Burovi 50,0
D. S. Для примочек (1 чайная ложка на стакан воды)

Свинца ацетат
Plumbi acetat (Б)

П. в. р. Р-ры. 0,25—0,5%

Rp.: Sol. Plumbi acetatis 0,25% 50,0
D. S. Примочка для глаз

Rp.: Plumbi acetatis 10,0
Aq. destill. ad 100,0
D. S. По 2 чайные ложки на кружку воды для спринцевания

Свинцовая вода
Solutio Plumbi

Ж. (оф.) — содержит 2% основного ацетата свинца. Наружно (готовится ex tempore)

Rp.: Sol. Plumbi 100,0
D. S. Примочка

Свинцовый пластырь простой
Emplastrum Plumbi simplex

(Оф.). Состав: окись свинца, свиной жир и масло подсолнечное — аа 10 частей, вода — q. s.

Rp.: Emplastri Plumbi simplicis 50,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Тансал
Tansalum

1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: те-
альбин и фенилсалицилат —
аа 0,3

Rp.: Tab. Tansali N. 30
D. S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Тесальбен
Thesalbenum

1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: те-
альбин — 0,5, фенилсалици-
лат и бензонафтол — аа 0,1

Rp.: Tab. Thesalbeni N. 20
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА¹

Анальгезирующая эмульсия
Emulsum analgesias

(Оф.). Состав: метилсалицилат,
анальгин, нафталан, эмульга-
тор — аа 2,5%, кашалотовый
жир — 7,5%, вода дистилли-
рованная — 82,5%

Rp.: Emulsi analgesias 100,0
D. S. Для втираний

Анестезин
Anaesthesinum (Б), ФХ

0,5 (1,5). П. в. нр. Пр. Мз. Спп.
Тб. 0,3

Rp.: Anaesthesini 0,3
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp.: Anaesthesini 0,5
Mentholi 0,1
Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1% 0,5
Vasellini ad 10,0
M. f. ung.
D. S. Мазь для носа

Анестезол
Anaesthesolum

Спп. (оф.). Состав: анестезин —
0,05, экстракт водяного пер-
ца — 0,06, цинка окись —
0,016, активированный уголь —
0,01

Rp.: Supp. Anaesthesoli N. 10
D. S. По 1 свече в прямую кишку на ночь

¹ См. также хлористый этил.

Бенкаин
Bencainum (Б)

Назначается в 0,5—2% растворах по методике и в количествах, применяемых для инфильтрационной анестезии новокаином. Пр. Ампл. 1,0, 2,0 и 5,0—1 и 2%

Rp.: Bencaini 0,5
Sol. Natrii chloridi isotonicae 200,0
M. Sterilisetur!
D. S. Для инфильтрационной анестезии

Rp.: Sol. Bencaini 2% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Для анестезии в стоматологической практике

Дикаин
Dicainum (А), ФХ

Высшая разовая доза: для анестезии верхних дыхательных путей — 0,09 или 3 мл — 3% (однократно); для перидуральной анестезии — 0,075 или 25 мл — 0,3% (однократно). П. в. р. Р-ры. Гл. клп. 0,25—2%

Rp.: Sol. Dicaini 0,5% 5,0
D. S. Глазные капли

Кокаина гидрохлорид *
Cocaini hydrochloridum (А),
ФХ

0,03 (0,03). Только для поверхностной анестезии и как адъюванс в составе капель и мазей в отоларингологии и в глазной практике. Р-ры 1—5%

Rp.: Sol. Cocaini hydrochloridi 2% 5,0
Sol. Adrenalinii hydrochloridi 0,1% gtts V¹
M. D. S. Для анестезии роговицы, конъюнктивы, слизистой носа (в руки врача)

Rp.: Zinci sulfatis 0,05
Acidi borici 0,2
Cocaini hydrochloridi 0,1
Aq. destill. 10,0
M. D. S. Глазные капли

¹ Адреналин добавляется для уменьшения всасывания кокаина и удлинения его анестезирующего действия в количестве 1 капли 0,1% раствора на каждый миллилитр раствора кокаина.

Rp.: Sol. Cocaini hydrochloridi 5% 10,0
Sol. Adrenalini hydrochloridi 1 : 1000 gtts X
M. D. S. Для анестезии носоглотки (в руки врача)

Ксякаин
Хусайним (Б),
(гидрохлорид диэтиламино-2,6-
диметил-ацетанилида)

П. в. с. р. Р-ры в амп. 50,0 и
100,0—1%, 50,0—2%, 5,0—
5%

Rp.: Sol. Хусайни 1% 100,0

D. t. d. N. 2 in amp.

S. Для инфильтрационной анестезии 0,25% до 1000 мл
или 0,5% до 500 мл; для проводниковой анестезии 1% —
25—50 мл

Новокаин
Novocainum (Б), ФХ

Вн 0,25 (0,75). В/м (2%
раствор) — 0,1 (0,1). В/в
(0,25% раствора) 0,05 (0,1).
Для инфильтрационной анесте-
зии: первая разовая доза не
свыше 1,25 в 0,25% растворе
и 0,75 в 0,5%. В дальнейшем
на каждый час операции не
свыше 2,5 в 0,25% и 2,0 в
0,5% растворах.
П. в. р. Ампл.:
1,0—1 и 2%
2,0—0,25, 0,5, 1 и 2%
5,0—0,25 и 0,5%
10,0—0,25, 0,5 и 1%

Rp.: Novocaini 1,25
Natrii chloridi 3,0
Kalii chloridi 0,038
Calcii chloridi 0,062
Aq. destill. 500, 0
M. Sterilisetur!

D. S. Для анестезии по методу Вишневского по 100—150 мл

Rp.: Novocaini 0,5
Aq. destill. 200,0

M. D. S. По 1 столовой ложке 3—5 раз в день

Rp.: Sol. Novocaini 2% 2,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. Для проводниковой анестезии

Rp.: Novocaini 0,2

Sol. Natrii chloridi isotonicae 200,0

M. Sterilisetur!

D. S. Для инфильтрационной анестезии

Rp.: Novocaini 0,2
Sol. Natrii chloridi 0,85% 20,0
M. Sterilisetur!
D. S. Для проводниковой анестезии

Новокаин — масляный раствор
Solutio Novocaini oleosae

5—10 мл. Ампл. 5 мл 5% раствора
основания новокаина в перси-
ковом масле

Rp.: Sol. Novocaini oleosae 5% 5,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 5—10 мл в область болезненных рубцов

Совкаин
Sovcainum (A), ФХ

Высшая разовая доза при введе-
нии в спинномозговой канал —
однократно 0,01. П. в. р.
Ампл. 1,0—0,5 и 1%

Rp.: Sol. Sovcaini 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 0,25—0,5 мл для спинномозговой анестезии

Тримекаин (мезокаин)
Trimecainum (Mesocainum) (Б)
(α -диэтиламино-2,4,6-триметил-
ацетанилида)

П. в. р. Р-ры

Rp.: Sol. Trimecaini 0,25% 400,0
Sterilisetur!

D. S. Для инфильтрационной анестезии 0,25% — до
800 мл; 0,5% — до 400 мл; 1% — до 100 мл; для про-
водниковой анестезии 1% — до 100 мл; 2% — до
20 мл

Глава IV

РВОТНЫЕ, ОТХАРКИВАЮЩИЕ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА

Анис обыкновенный — плод
Anisum vulgare — fructus, ФХ

Сб. Инф. 1,5 : 20

Рр.: Inf. fructus Anisi vulgaris 15,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 4—5 раз в день перед едой

Рр.: Fructus Anisi vulgaris 20,0

D. S. 1 чайную ложку сбора заварить в стакане кипятку;
принять в течение дня в 3—4 приема перед едой

Анисовое масло
Oleum Anisi, ФХ

Входит в состав различных мик-
стур и готовых лекарственных
форм, по 1—2 капли на прием

Апоморфина гидрохлорид
Apomorphini hydrochloridum
(А), ФХ

П/к 0,005 (0,01). Вн 0,01
(0,03) П. в. р. Р-ры (ex tem-
pore!)

Рр.: Sol. Apomorphini hydrochloridi 1% 5,0

Steriliseturi

D. S. По 0,5 мл подкожно (рвотное)

Багульник — трава
Herba Ledi palustris

Сб. Инф. Дек. 1 : 20

Рр.: Inf. herbae Ledi palustris 10,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 4—5 раз в день

Рр.: Herbae Ledi palustris 50,0

D. S. 1 столовую ложку сбора настоять в стакане кипятку;
принять в течение дня в 3 приема

Гидрокодона фосфат	0,02 (0,06). П. в. р. Пр. Тб.
Hydrocodoni phosphas (A), ФХ	0,001, 0,002, 0,005

Rp.: Hydrocodoni phosphatis 0,005
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Hydrocodoni phosphatis 0,01
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Девясил — корень и корневище	Сб. Дек. 1 : 40
Rhizoma et radix Inulae helenii	

Rp.: Dec. rad. Inulae helenii 5,0—200,0
D. S. Выпить в течение дня в три приема

Rp.: Rhiz. et rad. Inulae helenii 50,0
D. S. 1 чайную ложку смеси заварить в стакане кипятку;
выпить в течение дня в 3—5 приемов

Деморфан	0,005—0,015. П. в. р. Тб. 0,005
Demorphanum (Б)	и 0,01
[гидробромид (+)-3-метокси-N-метилморфинана]	

Rp.: Demorphani 0,005
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Доверов порошок*	0,5 (1,5). П. (оф.). Состав: поро-
Pulvis Doveri (Pulvis Ipecacua-	шок опия — 1 часть, порошок
phae opiatu) (Б)	корня ипекакуаны — 1 часть,
	сахар молочный — 8 частей.
	Пр. Тб. 0,25

Rp.: Pulv. Doveri 0,5
D. t. d. N. 10 in charta cerata
S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp.: Tab. pulv. Doveri 0,25
D. t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Душица — трава	Сб. Инф. 1,5 : 20
Herba Origani	

Rp.: Inf. herbae Origani 15,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке каждые 2—3 ч

Ипекакуана — корень <i>Radix Ipecacuanhae</i> (Б)	Отхарк. 0,1 (0,4). Рвотн. 1,0. Инф. 1 : 400
--	--

Rp.: Inf. rad. Ipecacuanhae 0,5—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

Ипекакуана — настойка <i>Tinctura Ipecacuanhae</i> (Б)	15 кпл. (30 кпл.)
---	-------------------

Rp.: T-gae Ipecacuanhae 10,0
D. S. По 5—10 капель 3 раза в день

Ипекакуана — сироп <i>Sirupus Ipecacuanhae</i>	Ж. (оф.) — Состав: настойка ипекакуаны — 1 часть, сироп сахарный — 9 частей
---	---

Rp.: Sirupi Ipecacuanhae 100,0
D. S. По $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ чайной ложки 3—4 раза в день

Истод — корень <i>Radix Polygalae</i>	Сб. Дек. 1 : 10
--	-----------------

Rp.: Dec. rad. Polygalae 20,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 4—5 раз в день

Кодеин * <i>Codeinum</i> (Б), ФХ	0,05 (0,2). П. в. тр. Пр. Тб. 0,01 и 0,015. Сложные тб. (стр. 122)
-------------------------------------	---

Rp.: Tab. Codeini 0,015
cum Saccharo 0,25
D. t. d. N. 6
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Кодеина фосфат * <i>Codeini phosphas</i> (Б), ФХ	0,1 (0,3). П. в. р. Пр. Тб. 0,015. Сложные тб. (стр. 122)
---	--

Rp.: Codeini phosphatis 0,015
Sacchari 0,25
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Codeini phosphatis 0,025
Sacchari 0,25
M. f. pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 3 раза в день

Кодтерпин * <i>Codterpinum</i> (Б)	1 тб. Тб. (оф.) — состав: кодеин — 0,015, натрия гидрокарбонат и терпингидрат — аа 0,25
---------------------------------------	---

Rp.: Tab. Codterpini N. 12
D. S. По 1 таблетке 3 раза в день

Котермопс * Cothermopsium (Б)	1 тб. Тб. (оф. — состав: термоп- сис — 0,01, натрия гидрокар- бонат 0,25, кодеин — 0,02, ла- кричный порошок — 0,2
--	---

Rp.: Tab. Cothermopsi N. 10
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Ликорина гидрохлорид (нар- циссин) Lycorini hydrochloridum (A) (диокси- <i>N</i> -метилфенантредин)	Вн 0,0001—0,0002. П/к и В/м 0,002—0,005 (как рво- тное). Пр. Р-ры (алкалоид из растений семейства амарилли- совых и лилейных)
---	--

Rp.: Lycorini hydrochloridi 0,0002
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3—4 раза в день до еды (для усиления сек-
реции желудочного сока)

Rp.: Sol. Lycorini hydrochloridi 0,5% 3,0
Sterilisetur!
D. S. По 1 мл внутримышечно (как рвотное)

Мать-и-мачеха — лист Folium Farfarae	Сб. Дек. 1 : 10
---	------------------------

Rp.: Fol. Farfarae 100,0
D. S. 1 столовую ложку листьев заварить в стакане кипят-
ку; выпить в течение дня в 3—4 приема

Rp.: Dec. fol. Farfarae 20,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 4—5 раз в день

Мыльный корень Radix Saponariae	Сб. Дек. 1 : 10
--	------------------------

Rp.: Dec. rad. Saponariae 20,0—200,0
Sirupi simplicis 20,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

Rp.: Rad. Saponariae 100,0
D. S. 1 чайную ложку корня на стакан холодной воды,
настаивать 8 ч; выпить в течение дня в 3—4 приема

Натрия бензоат Natrii benzoas, ФХ	0,2—0,5. П. в. р. Применяется в комбинации с другими отхар- кивающими средствами
--	---

Rp.: Dec. rad. Polygalae 20,0—200,0
Natrii benzoatis 3,0
Sirupi simplicis 20,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

Натрия гидрокарбонат
Natrii hydrocarbonas, ФХ

0,3—0,5. П. р. в. Применяется
per se и в комбинации с дру-
гими отхаркивающими сред-
ствами, а также для ингаля-
ций и внутривенно. Сложные
тб. (стр. 122)

Rp.: Inf. herbae Thermopsisidis 0,5—200,0
Natrii hydrocarbonatis 4,0
Sirupi Althaeae 20,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

Нашатырно-анисовые капли
Solutio Ammonii anisatus, ФХ

10—15 кпл. Ж. (оф.) — состав:
масло анисовое — 3,3, спирт
90° — 80 мл, раствор аммиа-
ка — 16,7. Фл. 10,0, 15,0 и
25,0

Rp.: Sol. Ammonii anisati 25,0
D. S. По 10—15 капель 3—5 раз в день

Опийно-бензойная настойка
Tinctura Opii benzoica (Б), ФХ

2 мл (5 мл). Ж. (оф.) — состав:
настойка опия простая—50 мл,
анисовое масло — 5,0, бен-
зойная кислота — 20,0, спирт
70° — до 1 л. Фл. 15,0 и 25,0

Rp.: T-rae Opii benzoicae 25,0
D. S. По 25 капель 3—4 раза в день

Пектол *
Pectolum (А)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: экстракт
термописа сухой и порошок
опия — аа 0,01, натрия гид-
рокарбонат — 0,2, лакричный
порошок с анисовым мас-
лом — 0,2

Rp.: Tab. Pectoli N. 30
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пектуссин
Pectussinum

1 тб. Тб. (оф.) — состав: мен-
тол — 0,004, эвкалиптовое ма-
сло — 0,0005, тальк — 0,03,
сахар — 0,77

Rp.: Tab. Pectussini N. 10
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день (сосать)

Пертуссин
Pertussinum

15,0. Ж. (оф.) — состав: экстракт чабреца или экстракт тимьяна — 12 частей, бромид калия — 1 часть, спирт 95° — 5 частей, сироп сахарный — 52 части. Фл. 100,0

Rp.: Pertussini 100,0
D. S. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Подорожник — лист
Folium Plantaginis

Сб. Инф. 1 : 10

Rp.: Inf. fol. Plantaginis 20,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

Rp.: Fol. Plantaginis 100,0
D. S. 1 столовую ложку сбора настоять в стакане кипятку; выпить в течение дня в 3 приема

Сенега — корень
Radix Senegae

Инф. Дек. 1 : 30

Rp.: Inf. rad. Senegae 6,0—180,0
Sol. Ammonii anisati
Natrii hydrocarbonatis aa 4,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 4—6 раз в день

Rp.: Dec. rad. Senegae 6,0—180,0
Sol. Ammonii anisati 4,0
Sirupi simplicis 20,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 4—6 раз в день

Сен-сен — гранулы
Granula sen-sen

(Оф.). Содержат: экстракт солодкового корня и ментол

Rp.: Granulorum sen-sen 3,0
D. S. По 2—5 гранул 3—4 раза в день

Солодковый корень — сироп
Sirupus Glycyrrhizae

5,0. Состав: экстракт солодкового корня густой — 4 части, спирт — 10 частей, сироп сахарный — 86 частей

Rp.: Sirupi Glycyrrhizae 100,0
D. S. По 1 чайной ложке 3 раза в день или в комбинации с другими отхаркивающими средствами

Солодковые капли от кашля

20—40 кпл. (оф.). Состав: экстракт солодкового корня — 6 частей, раствор аммиака — 1 часть, настойка фенхеля или аниса — 10 частей, вода — 13 частей. Фл. 25,0 и 50,0

Сосновые почки
Gemmae Pini

Дек. 1 : 20

Rp.: Dec. gem. Pini 10,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Термопий *
Thermopium (A)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: термопсис — 0,01, опий — 0,005, натрия гидрокарбонат 0,25

Rp.: Tab. Thermopii N. 10

D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Термопсис — сухой экстракт
Extractum Thermopsidis siccum

0,05. Тб. 0,05. Сложные тб. (стр. 122)

Rp.: Extr. Thermopsidis sicci 0,05

D. t. d. N. 10 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Термопсис — трава
Herba Thermopsidis (Б), ФХ

Пр. из травы 0,1 (0,3). Инф. 1 : 200. Сложные тб. (стр. 122)

Rp.: Inf. herbae Thermopsidis 1,0—200,0

Sol. Ammonii anisati 4,0

Sirupi simplicis 20,0

M. D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Терпингидрат
Terpinum hydratum, ФХ

0,25—0,5. П. в. р. Тб. 0,25 и 0,5. Сложные тб. (стр. 122)

Rp.: Terpini hydrati 0,5

D. t. d. N. 12 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Чабрец — трава
Herba Serpylli

Инф. 1 : 10. Жидкий экстракт. Сб.

Rp.: Inf. herbae Serpylli 20,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp.: Extr. Serpylli fluidi 20,0

Sirupi simplicis 100,0

M. D. S. По 1 чайной ложке 3 раза в день

Укропная вода
Aqua Foeniculi

Ж. (оф.). Фл. 100,0. Per se и как
adjuvans в составе микстур

Rp.: Aquae Foeniculi 100,0
D. S. По 1 чайной ложке 3 раза в день

Rp.: Inf. herbae Thermopsidis 1,0—180,0
Aq. Foeniculi
Sirupi simplicis aa 20,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Фиалка душистая — корень
Radix Violae odoratae

Инф. 1 : 10

Rp.: Inf. rad. Violae odoratae 20,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 5—6 раз в день

Эвкалипт — лист
Folium Eucalypti, ФХ

Инф. 1 : 20. Настойка 20—
25 кпл. Масло эвкалиптовое

Rp.: Inf. Eucalypti 10,0—200,0
D. S. Для полосканий

Rp.: T-rae Eucalypti 25,0
D. S. По 20—25 капель 3 раза в день

Rp.: Mentholi 1,0
Ol. Eucalypti ad 10,0
M. D. S. Для ингаляций

Эликсир грудной
Elixir pectorale

20—40 кпл. Ж. (оф.). Состав:
экстракт солодкового корня —
60 частей, аммиак — 10 ча-
стей, масло анисовое — 1 часть,
спирт — 49 частей, вода —
180 частей. Фл. 15,0 — 25,0 и
50,0

Rp.: Elixir pectoralis 50,0
D. S. По 20—40 капель 3 раза в день

Этилморфина гидрохлорид (дио-
нин)
Aethylmorphini hydrochloridum
(Dioninum) (A), ФХ

0,03 (0,1). П. в. р. Пр. Тб. 0,01
и 0,015. Гл. кпл. и мз. 1—10%

Rp.: Aethylmorphini hydrochloridi 0,01
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Tab. Aethylmorphini hydrochloridi 0,01 cum Natrio hydrocarbonico 0,2
D. t. d. N. 12
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Sol. Aethylmorphini hydrochloridi 2% 5,0
D. S. Глазные капли

**КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА,
ИМЕЮЩИЕСЯ В АПТЕКЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ (В ТАБЛЕТКАХ)**

Rp.: Codeini 0,015
Natrii hydrocarbonatis 0,3
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Codeini 0,01
Natrii hydrocarbonatis
Terpini hydrati aa 0,25
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Codeini 0,01
Kalii bromidi 0,5
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Codeini 0,015
Terpini hydrati 0,25
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Codeini phosphatis 0,015
Terpini hydrati 0,25
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Codeini phosphatis 0,015
Natrii hydrocarbonatis 0,25

D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Extr. Thermopsidis 0,005
Codeini
Ammonii chloridi aa 0,01
Natrii hydrocarbonatis 0,3
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Pulv. rad. Glycyrrhizae 0,1
Natrii hydrocarbonatis 0,2
Terpini hydrati 0,25
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Pulv. herbae Thermopsidis 0,01
Natrii hydrocarbonatis 0,25
Opii pulverati 0,005
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Terpini hydrati
Natrii hydrocarbonatis aa 0,25
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Глава V

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

СЕРДЕЧНЫЕ СРЕДСТВА

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ

Препараты наперстянки пурпурной

Гитален Gitalenum (Б)	27 кпл. (54 кпл.). Ж. (оф.). Со- держит сумму гликозидов Фл. 15,0
--------------------------	---

Rp.: Gitaleni 15,0
D. S. По 10—15 капель 3 раза в день

Гитоксин Gitoxinum (А)	0,0003—0,0004. П. в. нр. Тб. 0,0002
---------------------------	--

Rp.: Gitoxini 0,0002
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По $\frac{1}{2}$ таблетки 3 раза в день, постепенно уменьшая дозу
до $\frac{1}{2}$ таблетки в день

Дигипурен Digipurenum (Б)	10—15 кпл. Ж. (оф.). Содержит сумму гликозидов. Фл. 15,0.
------------------------------	--

Rp.: Digipureni 15,0
D. S. По 10—20 капель 2—3 раза в день

Rp.: Digipureni 15,0
D. S. В микроклизме по 10—15 капель 2 раза в день

Дигитоксин
Digitoxinum (A), ФХ

0,0005—0,001. П. в. нр. Тб.
0,0001

Дозировка строго индивидуальна. Обычная схема:

Тяжелая форма сердечной недостаточности

Rp.: Digitoxini 0,0001
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 1 таблетке 5 раз в день (далее по схеме)

Более легкая степень сердечной недостаточности

Rp.: Digitoxini 0,0001
D. t. d. N. 15 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день (далее по схеме)

Кордигит — таблетки
Tabulettae Cordigitum (Б)

Тб. (оф.). Содержит сумму гли-
козидов (0,0008)

Rp.: Tab. Cordigiti N. 12
D. S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 2 раза в день

Наперстянка — лист
Folium Digitalis (Б), ФХ

Инф. 1 : 400

Rp.: Inf. fol. Digitalis 0,5—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Наперстянка — порошок из
листьев
Pulvis folii Digitalis (Б)

0,1 (0,5). П. в. нр. Пр. Спн.

Rp.: Pulv. fol. Digitalis 0,05
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp.: Pulv. fol. Digitalis 0,1
Butyri Cacao q. s.
M. f. suppos. D. t. d. N. 12
S. По 1 свече в прямую кишку 3 раза в день

Наперстянка — сухой концент-
рат
Extractum folii Digitalis siccum
(Б)

0,2. Тб. 0,05. Пр.

Rp.: Extr. folii Digitalis sicci 0,05
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Препараты наперстянки шерстистой

Абизин
Abicinum (A) 0,0002—0,0004. П. в. нр. Тб.
0,00025. Амп. 1,0—0,02%

Rp.: Abicini 0,00025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Abicini 0,02% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—2 мл в 20 мл 20% раствора глюкозы внутривенно
1 раз в день

Диланизид
Dilanisidum (Б) В/в 1 мл (2 мл). Ж. (оф.) —
содержит сумму гликозидов
наперстянки шерстистой. Амп.
1,0 (водный раствор, актив-
ность 1 мл 7—9 ЛЕД)

Rp.: Dilanisidi 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 0,5—1 мл внутривенно в 20 мл 40% раствора глю-
козы

Лантозид
Lantosidum, ФХ 25 кпл. (75 кпл). Ж. (оф.). Со-
держит сумму гликозидов на-
перстянки шерстистой. Фл.
15,0 (спиртовый раствор). Ак-
тивность 1 мл 9—12 ЛЕД

Rp.: Lantosidi 15,0
D. S. По 10—20 капель 2—3 раза в день

Rp.: Lantosidi 15,0
D. S. В микроклизме по 10 капель 2 раза в день

Целанид
Celanidum (A), ФХ Вн 0,0005 (0,001); В/в
0,0004 (0,0008). П. в. тр. Тб.
0,00025. Амп. 1,0—0,02%.
Фл. 0,05%—10,0 (активность
1 мл — 2,5—3 ЛЕД)

Rp.: Celanidi 0,00025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Celanidi 0,02%—1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—2 мл внутривенно в 20 мл 20% раствора глюкозы
один раз в день

Препараты наперстянки ржавой

Дигален-нео
Digalen-neo (Б), ФХ

Вн 20 кпл. (60 кпл.). П/к
1 мл (3 мл). Ж. (оф.). Амп.
1 мл (активность — 3 ЛЕД).
Фл. 15,0 (активность — 6 ЛЕД
в 1,0)

Rp.: Digalen-neo 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл подкожно 1 раз в день

Rp.: Digalen-neo 15,0
D. S. По 10—20 капель 2—3 раза в день

Сатитурани
Satituranum (Б)

1 тб. Тб. (оф.), содержат сумму
гликозидов ржавой наперстян-
ки. Активность 1 тб. — 3 ЛЕД

Rp.: Tab. Satiturani N. 20
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Суккудифер
Succudiferum (Б)

10—20 кпл. Ж. (оф.) — сок из
свежих листьев ржавой напер-
стянки. Активность 1 мл —
5—6 ЛЕД. Фл. 25,0

Rp.: Succudiferi 25,0
D. S. По 10—20 капель 2—3 раза в день

Препараты наперстянки реснитчатой

Дигицил
Digicilum (Б)

0,025—0,05. П. в. р. Тб. 0,05
(активность 1 тб. — 5,5—
6 ЛЕД)

Rp.: Digicili 0,05
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1/2—1 таблетке 2—3 раза в день

Дигицилен
Digicilenum (Б)

0,5—1 мл. Ж. (оф.), содержит
сумму гликозидов наперстян-
ки реснитчатой. Амп. 1 мл.
Активность 1 мл — 6 ЛЕД

Rp.: Digicileni 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5—1 мл подкожно (внутримышечно) 1—2 раза
в день

П р е п а р а т ы г о р и ц в е т а

Адонизид
Adonisidum, (Б) ФХ

0,5—1 мл. Ж. (оф.). Водный раствор гликозидов горичвета. Ампл. 1 мл — активность 23—27 ЛЕД. Фл. 15 мл. Активность 1 мл — 27—28 ЛЕД

Rp.: Adonisidi 1 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 0,5 мл внутривенно в 10 мл 40% раствора глюкозы 1-раз в день (постепенно увеличивая дозу до 1 мл в день)

Rp.: Adonisidi 15,0

D. S. По 15 капель 2—3 раза в день

Адонизид в таблетках
Tabulettae Adonisidi (Б)

Тб. (оф.). Состав: адонизид сухой экстракт — 0,00075, крахмал — 0,2, сахар — 0,2. Активность 1 тб. — 10—15 ЛЕД

Rp.: Tab. Adonisidi N. 10

D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Адонис-бром — таблетки
Tabulettae Adonis-brom

Тб. (оф.). Состав: концентрат адониса сухой и бромид калия — аа 0,25 (активность 1 тб. — 12 ЛЕД). Фл. 25 тб.

Rp.: Tab. Adonis-brom N. 25

D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Бехтерева — микстура
Mixtura Bechterevi

См. рецепт

Rp.: Inf. herbae Adonidis vernalis 6,0—180,0

Natrii bromidi 6,0

Codeini phosphatis 0,2

M. D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Бехтерева микстура в таблетках
Tabulettae Bechterevi

(Оф.). Состав: концентрат адониса сухой — 0,138, бромид калия — 0,25, кодеин чистый — 0,006. Фл. 25 тб.

Rp.: Tab. Bechterevi N. 25

D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день в течение 4—5 дней

Горицвет — трава
Herba Adonidis vernalis, (Б), ФХ

Инф. 1 : 30

Rp.: Inf. herbae Adonidis vernalis 6,0—180,0

D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp.: Inf. herbae Adonidis vernalis 6,0—180,0
Sol. Kalii acetatis 12,0
Sirupi simplicis 20,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Препараты строфанта

Строфантин К	0,0005 (0,001). П. в. р. Амп.
Strophanthinum K, (A), ФХ	1,0—0,05%

Rp.: Sol. Strophanthini K 0,05% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,25—0,5 мл внутривенно в 20 мл 40% раствора глюкозы (вводить медленно!)

Строфант — настойка	10 кпл. (20 кпл.). Фл. 10,0
Tinctura Strophanthi (A), ФХ	

Rp.: Tincturae Strophanthi 5,0
D. S. По 5 капель 2—3 раза в день

Rp.: T-rae Strophanthi 5,0
T-rae Valerianae 10,0
M. D. S. По 15 капель 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Glucosi sterilisatae 10,0
Adde aseptice t-rae Strophanthi gtts II
M. D. S. Для одного внутривенного введения (вводить в течение 3—5 мин)

Препараты майского ландыша

Конваллятоксин	0,0003 (0,0006). П. в. р. Амн.
Convallatoxinum (A), ФХ	1,0 0,03%. Активность 1 мл 22,5 ЛЕД

Rp.: Sol. Convallatoxini 0,03% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5—1 мл внутривенно в 10—20 мл 40% раствора глюкозы

Коргликон — раствор 0,06% для инъекций	1 мл (2 мл). Содержит сумму гликозидов листьев ландыша
Corglyconum — solutio 0,06% pro injectionibus (Б), ФХ	Амп. 1,0—0,06% (активность 1 мл — 8—10 ЛЕД)

Rp.: Sol. Corglyconi 0,06% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 0,5—1 мл внутривенно в 10—20 мл 40% раствора глюкозы

Ландыш — сухой концентрат
Extractum Convallariae siccum

Тб. 0,1 (активность — 12 ЛЕД)

Rp.: Extr. Convallariae sicci 0,1
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Препараты желтушника

Корезид
Coresidum (A)

В/в 0,00025—0,0005. Амп.
1,0—0,05% (активность 1 мл —
26—29 ЛЕД) — содержит сум-
му гликозидов из желтушника
левкойного

Rp.: Sol. Coresidi 0,05% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 0,5—1 мл внутривенно в 20 мл 40% раствора глюкозы
1—2 раза в день

Эризимин
Erysiminum (A), ФХ

0,00033 (0,00066). П. в. р.
(кристаллический гликозид из
желтушника). Амп. 1,0—
0,033% (активность 1 мл —
18—20 ЛЕД)

Rp.: Sol. Erysimini 0,033% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 0,5—1 мл внутривенно в 10—20 мл 40% раствора
глюкозы

Эризимозид
Erysimosidum (A)

0,00025—0,0005. П. в. р. Тб.
0,00005 (для подъязычного
применения) и 0,0005 (внутрь)

Rp.: Erysimosidi 0,00005
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день (под язык)

Rp.: Sol. Erysimosidi spirituosae 0,2% 10,0
D. S. По 15—20 капель 2—3 раза в день

Препараты обвойника

Обвойник — настойка
Tinctura Periplocae

5—10 кпл. (активность 1 мл —
8—9 ЛЕД)

Rp.: T-gae Periplocae 15,0
D. S. По 5—10 капель 3 раза в день

Периплоцин
Periplocinum (A)

0,00025 (0,0005). П. в. р. Кри-
сталлический аглюкон — пе-
риплогенин. Амп. 1,0—0,025%

Rp.: Sol. Periplocini 0,025% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 0,5—1 мл внутривенно в 10—20 мл 40% раствора
глюкозы

Препарат кендыря коноплевого

Цимарин
Cymarinum (A)

0,0005 (0,00075). П. в. р. Кри-
сталлический гликозид кен-
дыря коноплевого. Амп. 1,0—
0,05% (активность 1 мл —
22,5 ЛЕД)

Rp.: Sol. Cymarini 0,05% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 0,5—1 мл внутривенно в 10—20 мл 40% раствора
глюкозы

Препараты олеандра

Корнерин — таблетки
Tabulettae Cornerini (Б)

0,0001 (0,0002). Тб. — 0,0001.
Активность 1 тб. — 2,8—4
ЛЕД

Rp.: Tab. Cornerini N. 25
D. S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Нериолин
Neriolinum (A), ФХ

0,0002 (0,0004). П. в. нр. с. р.
Тб. 0,0001. Фл. 10,0. Актив-
ность 1 мл — 7—9 ЛЕД

Rp.: Neriolini 0,0001
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день
Rp.: Sol. Neriolini spirituosae 10,0
D. S. По 20 капель 2—3 раза в день

Препарат морского лука

Морской лук — порошок
Pulvis bulbi Scillae (Б)

0,3 (1,5). Пр. Инф. 1 : 100. Пл.

Rp.: Pulv. bulbi Scillae 0,05
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 3—4 раза в день

Rp.: Inf. bulbi Scillae 2,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

Препарат морозника краснеющего

Корельборин
Corelborinum (A)

0,0001—0,0002. П. в. тр. Тб.
0,0002 (активность — 17 ЛЕД),
амп. 1 мл — 0,025% (актив-
ность — 22 ЛЕД). Препарат
морозника краснеющего и кав-
казского

Rp.: Tab. Corelborini 0,0002

D. t. d. N. 20

S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Sol. Corelborini 0,025% 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 0,5—1 мл внутривенно (медленно!) в 10—20 мл 40%
раствора глюкозы

Препараты из семян джута
длинноплодного

Корхорозид
Corchorosidum (A)

В/в 0,2—1 мл 0,033%. П. в.
нр. Амп. 1,0—0,033% (актив-
ность 1 мл — 20—25 ЛЕД)

Rp.: Sol. Corchorosidi 0,033% 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 0,2—0,5 мл внутривенно 1 раз в день в 20 мл 20%
раствора глюкозы, постепенно увеличивая дозу до 1 мл
(вводить медленно!)

Олиторизид
Olitorisidum (A)

В/в 0,5—1 мл 0,04%. П. в. р.
Амп. 1,0—0,04% (активность
1 мл — 25 ЛЕД)

Rp.: Sol. Olitorisidi 0,04% 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 0,5—1 мл 1 раз в день внутривенно в 10 мл 40% рас-
твора глюкозы

Препарат из листьев харга
кустарникового

Гомфотин
Gomphotinum (A)

Тб. 0,0002

Rp.: Tab. Gomphotini 0,0002

D. t. d. N. 10

S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 2—3 раза в день

Комбинированные препараты, содержащие
сердечные гликозиды

Капли Зеленина
Guttae Zelenini (Б)

20—25 кпл. Ж. (оф.) — состав:
настойка ландыша и настойка
валерианы — аа 10,0, настой-
ка красавки — 2,5, ментол —
0,1

Rp.: *Guttae Zelenini* 25,0
D. S. По 20—25 капель на прием

Кардиовален
Cardiovalenum (Б)

10—15 кпл. Ж. (оф.) — состав:
сок из свежей травы желтуш-
ника — 17 частей, адонизид —
30 частей, жидкий экстракт
плодов кроваво-красного бо-
ярышника — 2 части, настой-
ка валерианы — 46,9 частей,
камфора — 0,4 части, натрия
бромид — 2 части, спирт 96° —
1,6 части, хлорэтон — до
0,25%. Фл. 25,0 (активность
1 мл — 45—55 ЛЕД)

Rp.: *Cardiovaleni* 25,0
D. S. По 10—15 капель 2—3 раза в день

Кордиазид
Cordiasidum (Б)

15—20 кпл. Ж. (оф.) — состав:
смесь аа адонизид и кордиа-
мина. Фл. 20,0

Rp.: *Cordiasidi* 20,0
D. S. По 15—20 капель 2—3 раза в день

Зарубежные препараты

Ацетилдигитоксин (ациланид)
(Польша)
Acetyldigitoxinum (А)

0,0002. Амп. 1,0—0,02%. Тб.
0,0002

Rp.: *Acetyldigitoxini* 0,0002
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день (в зависимости от
состояния больного)

Rp.: *Sol. Acetyldigitoxini* 0,02% 1,0
D. t. d. N. 12 in amp.
S. По 1—2 мл внутривенно в 10—20 мл 40% раствора
глюкозы

Дигоксин (Венгрия)
Digoxinum (A)

0,001. П. в. р. Тб. 0,00025. Фл.
15,0 с содержанием в 1 мл —
0,001. Ам. 2,0—0,025% (кри-
сталлический гликозид — ди-
госин)

Rp.: Digoxini 0,00025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Rp.: Sol. Digoxini 0,025% 2,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутривенно в 20 мл 20% раствора глюкозы:
вводить медленно!

Изоланид (Венгрия)
Isolanidum (A)
(соответствует отечественному
препарату целаниду)

Вн 5—10 кпл. В/в 1—2 мл
Ж. (оф.). Содержит С-глико-
зид наперстянки шерстистой.
Фл. 10,0 (1 мл — 0,001 глико-
зида). Ам. 2 мл (1 мл —
0,0002 гликозида). Тб. —
0,00025.

Rp.: Isolanidi 2 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—2 мл внутривенно 1—2 раза в день в 20 мл 40%
раствора глюкозы (вводить медленно!)

Rp.: Tab. Isolanidi 0,00025
D. t. d. N. 20
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Rp.: Sol. Isolanidi 0,1% 10,0
D. S. По 5—10 капель 3 раза в день.

АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА¹

Боярышник — плод
Fructus Crataegi, ФХ

Настойка и жидкий экстракт —
20—30 кпл.

Rp.: T-rae Crataegi 25,0
D. S. По 20—30 капель 3—4 раза в день

Rp.: Extr. Crataegi fluidi 25,0
D. S. По 20—30 капель 3—4 раза в день

¹ См. также наперстянка, препараты хинина, новокаин, дифенин,
калия оротат.

Калия хлорид Kalii chloridum, ФХ	1,0—1,5. П. в. р. Пр. Р-ры
Rp.: Kalii chloridi 1,0 D. t. d. N. 10 S. По 1 порошку 5 раз в день; принимать в $\frac{1}{2}$ стакана воды или сиропа	

Новокаиnamид Novocainamidum (Б), ФХ	Вн 1,0 (4,0); В/в 1,0 (3,0). Тб. 0,25. Амп. 5,0—10%. Фл. 10,0—10%
--	---

Rp.: Novocainamidi 0,25 D. t. d. N. 20 in tab. S. По 2 таблетки 2 раза в день, постепенно увеличивая дозу до 16 таблеток в день	
Rp.: Sol. Novocainamidi 10% 5,0 D. t. d. N. 10 in amp. S. По 5—10 мл внутримышечно; по 2—5 мл внутривенно в растворе глюкозы	

Хинидина сульфат Chinidini sulfas (Б)	0,25—0,5. П. в. тр. Пр. Тб. 0,05
--	-------------------------------------

Rp.: Chinidini sulfatis 0,2 D. t. d. N. 20 S. По 1 порошку 1 раз в день перед едой, постепенно повышая дозу до 4—6 порошков в день	
--	--

Зарубежные препараты

Индерал (Югославия) Inderalum (Б) (соответствует препарату обзидану из ГДР)	0,01—0,04. Тб. 0,01 и 0,04 Амп. 1,0—0,1% и 5,0—0,1%
---	--

Rp.: Inderali 0,01 D. t. d. N. 50 in tab. S. По 1 таблетке 3—4 раза в день, постепенно повышая дозу в зависимости от эффекта до 12 тб. в день	
Rp.: Sol. Inderali 0,1% 1,0 D. t. d. N. 10 in amp. S. По 1 мл внутривенно (вводить в течение минуты). В зависимости от эффекта повторить дозу через 2 мин.	

Обзидан (ГДР) Obsidanum (Б) (пропранолола гидрохлорид)	0,01—0,04. Тб. 0,04
--	---------------------

Rp.: Obsidani 0,04 D. t. d. N. 30 in tab. S. По $\frac{1}{2}$ таблетки 2 раза в день, постепенно повышая дозу до 1 таблетки 4 раза в день	
---	--

СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ГИПОТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА¹

Производные изохинолина

Папаверина гидрохлорид Papaverini hydrochloridum (Б), ФХ	Вн 0,2 (0,6); П/к, В/м и В/в 0,1 (0,3). П. в. р. Пр. Тб. 0,02. Амп. 2,0 — 2%. Спп. Сложные таблетки (стр. 142)
--	---

Rp.: Papaverini hydrochloridi 0,02
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Rp.: Sol. Papaverini hydrochloridi 2% 2,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл подкожно 1—2 раза в день

Rp.: Papaverini hydrochloridi 0,05
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 3 раза в день

Сальсолидина гидрохлорид Salsolidini hydrochloridum (Б)	0,1 (0,3). П. в. р. Тб. 0,03. Пр.
--	-----------------------------------

Rp.: Salsolidini hydrochloridi 0,03
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Сальсолина гидрохлорид Salsolini hydrochloridum (Б), ФХ	0,1 (0,3). П. в. р. Амп. 1,0—1%. Тб. 0,03. Комбинированные таблетки (стр. 142)
---	--

Rp.: Salsolini hydrochloridi 0,03
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Sol. Salsolini hydrochloridi 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл подкожно 1—2 раза в день

¹ См. также холинолитические средства, ганглиолитики, адрено-
литические и симпатолитические средства.

Производные пурина¹

Дипрофиллин Diprophyllinum (Б), ФХ [7-(2,3-диоксипропил)-теофиллин]	Вн 1,0 (3,0); В/м и В/в 0,5 (1,5). П. в. р. Тб. 0,2. Амп. 10,0—2,5% и 10%. Спп.
---	---

- Rp.: Sol. Diprophyllini 2,5% 10,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 10 мл внутривенно 1—2 раза в день
- Rp.: Sol. Diprophyllini 10% 10,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 5 мл внутримышечно или 2,5 мл внутривенно 1—2 раза в день
- Rp.: Diprophyllini 0,2
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день
- Rp.: Diprophyllini 0,5
Butyri Cacao q. s.
M. f. suppos. D. t. d. N. 10
S. По 1 свече 2—3 раза в день в задний проход

Темисал (диуретин) Themisalum (Diuretinum), ФХ (теобромин-натрий с салицилатом натрия)	0,3—0,75. Пр. в. р. Пр. Кпс.
--	------------------------------

- Rp.: Themisali 0,5
D. t. d. N. 20 in caps. gelat.
S. По 1 капсуле 3—4 раза в день

Теобромин Theobrominum (Б), ФХ	1,0 (3,0). П. в. р. Пр. Тб. 0,25 и сложные таблетки (стр. 145)
-----------------------------------	--

- Rp.: Theobromini 0,4
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 3 раза в день

Алкалоиды раувольфии змеевидной

Раунатин Raunatinum (Б)	0,002—0,004. П. в. р. Тб. 0,002 (сумма алкалоидов раувольфии змеевидной)
----------------------------	--

- Rp.: Raunatini 0,002
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 1 раз в день после еды, постепенно увеличивая дозу до 2 таблеток 3 раза в день

¹ См. также эуфиллин, теофиллин.

Резерпин Reserpinum (А), ФХ	0,002 (0,01). П. в. тр. Тб. 0,0001 и 0,00025
--------------------------------	---

Rp.: Reserpini 0,0001
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1—2 таблетки в день, при необходимости постепенно
повышать дозу до 5—10 таблеток

Зарубежные препараты

Раувазан (ГДР) Rauwasanum (Б)	1 држ. Држ. (оф.) — содержит 0,0023 суммы алкалоидов рау- вольфии змеиевидной
----------------------------------	---

Rp.: Dragée Rauwasani N. 20
D. S. По 1 драже в день после еды; постепенно увеличить
дозу до 3 драже — по 1 драже 3 раза в день

Рауседил (Венгрия) Rausedylum (Б)	0,0001. Тб. 0,0001 и 0,00025. Амп. 1,0—0,1 и 0,25% (сумма алкалоидов раувольфии зме- евидной)
--------------------------------------	--

Rp.: Rausedyli 0,0001
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 1 раз в день после еды, изменяя дозу
в зависимости от эффекта

ГИПОТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА ДРУГИХ ГРУПП

Апрессин Apressinum (Б), ФХ	0,1 (0,3). П. в. р. Пр. Тб. 0,01 и 0,025
--------------------------------	---

Rp.: Apressini 0,01
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день, постепенно повышая дозу
до 10—25 тб. в сутки (учитывая реакцию больного на
предыдущие дозы)

Баметансульфат Bamethansulfatum (Б) [2-н-бутиламино-1-(N-гидроксифе- нил)-этанола сульфат]	0,0125—0,025. П. в. р. Тб. 0,025. Амп. 1,0—5%. Фл. 10,0—1%
---	---

Rp.: Bamethansulfati 0,025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 3—4 раза в день

Rp.: Sol. Bamethansulfati 5% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Дибазол Dibazolum (Б), ФХ	0,05 (0,15). П. в. р. Тб. 0,02. Пр. Амп. 1,0—1%. Сложные тб. (стр. 143)
------------------------------	---

Rp.: Dibazoli 0,02
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Dibazoli 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл подкожно 1—2 раза в день

Димекарбин Dimecarbinum (Б) (1-2-диметил-3-карбэтокси- 5-оксиндол)	0,01—0,02. П. в. нр. Тб. 0,02
---	-------------------------------

Rp.: Dimecarbini 0,02
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 3—4 раза в день

Дипрофен Diprophenum (Б)	0,025—0,1. П. в. тр. Пр. Тб. 0,025 и 0,05
-----------------------------	--

Rp.: Dipropheni 0,025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Dipropheni 0,025
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Метилapoгалантамина гидрохлорид Methylapogalantamini hydrochlo- ridum (Б)	0,002—0,004. Тб. 0,002. Амп. 1,0—0,2%
--	--

Rp.: Tab. Methylapogalantamini hydrochloridi 0,002
D. t. d. N. 50
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Methylapogalantamini hydrochloridi 0,2% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—3 мл внутримышечно 1 раз в день

Зарубежные препараты

Бупатол (Венгрия) Bupatolum (Б) [сульфат 1-(4'-гидроксифенил)- 1-гидрокси-2-н-бутиламино- этана]	0,0025—0,01. П. в. р. Амп. 1,0— 0,5%. Тб. 0,025
--	--

Rp.: Sol Bupatoli 0,5% 1,0
 D. t. d. N. 10 in amp.
 S. По 0,5—2 мл внутримышечно 1 раз в день — начальная
 доза 0,5 мл

Rp.: Tab. Bupatoli 0,025
 D. t. d. N. 20
 S. По 1/2 таблетки 3—5 раз в сутки

Винкапан (Болгария) Vincaparinum (Б) (соответствует венгерскому пре- парату винкатоноу)	0,005—0,01. Тб. 0,01
--	----------------------

Rp.: Vincapani 0,01
 D. t. d. N. 50 in tab.
 S. По 1/2—1 таблетке 2—3 раза в день

Винкатор (девинкан) (Венгрия) Vincatonum (Devincanum) (Б) (содержит алкалоид винкамин)	0,005—0,01. П. в. р. Тб. 0,005 и 0,01. Амп. 1,0—0,5%
---	---

Rp.: Vincatoni 0,005
 D. t. d. N. 50 in tab.
 S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Vincatoni 0,5% 1,0
 D. t. d. N. 10 in amp.
 S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Галидор (Венгрия) Halidogum (Б) [фумарат-1-бензил-1-(3'-диме- тил-аминопропокси)-цикло- гептана]	0,05—0,1. П. в. р. Тб. 0,05. Амп. 2,0—2,5%
--	---

Rp.: Halidori 0,05
 D. t. d. N. 20 in tab.
 S. По 1—2 таблетки 1—2 раза в день (курс лечения —
 2—4 недели)

Rp.: Sol. Halidori 2,5% 2,0
 D. t. d. N. 10 in amp.
 S. По 2 мл внутримышечно или внутривенно 1 раз в день
 (только в случае острого приступа — при висцеральных
 спазмах)

Допегит (Венгрия) 1 тб. Тб. 0,25
Dopegitum (Б)
(соответствует препарату α -метил-Дофа)

Rp.: Tab. Dopegiti N. 50

D. S. По 1 таблетке в первые два дня лечения, постепенно увеличивать дозу на 1 таблетку в день, до необходимого снижения уровня кровяного давления. Максимальная суточная доза — 8 таблеток. Поддерживающая доза — обычно 2—3 таблетки в день

α -Метил-Дофа (**)
 α -Methyl-Dopa (Б) 0,25—0,5. Тб. 0,25

Rp.: α -Methyl-Dopae 0,25

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день; в случае необходимости — до 8 таблеток в день

Эрпозид (Венгрия)
Erpozidum (Б)

1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: резерпин — 0,0001, дигидрохлортиазид — 0,01. Эрпозид форте: резерпин — 0,00025, дигидрохлортиазид — 0,025

Rp.: Tab. Erpozidi N. 50

D. S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

ЭКСТРАКТЫ ИЗ РАСТЕНИЙ И ТКАНЕЙ ЖИВОТНЫХ

Ангиотрофин
Angiotrophinum

1 мл. Ж. (оф.) — водный экстракт из поджелудочной железы, лишенный инсулина. Амп. 1 мл

Rp.: Angiotrophini 1 ml

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день

Василистник вонючий — настойка

30—40 кпл. Фл. 50,0

Tinctura Thalictri foetidi

Rp.: T-rae Thalictri foetidi 50,0

D. S. По 30—40 капель 3—4 раза в день

Астрагал — трава
Herba Astragali pubiflori

Инф. 1 : 10

Rp.: Inf. herbae Astragali pubiflori 15,0—150,0

D. S. По 1 столовой ложке 3—6 раз в день

Магнолия крупноцветная — жид-
кий экстракт 20—30 кпл.
Extractum Magnoliae grandiflorae
fluidum

Rp.: Extr. Magnoliae grandiflorae fluidi 50,0
D. S. По 20—30 капель 3 раза в день

Цимицифуга — настойка 50—60 кпл.
Tinctura Cimicifugae dahuricae

Rp.: T-rae Cimicifugae dahuricae 100,0
D. S. По 50—60 капель 2—3 раза в день

Шлемник байкальский — на-
стойка 20—30 кпл.
Tinctura Scutellariae

Rp.: T-rae Scutellariae 25,0
D. S. По 20—30 капель 2—3 раза в день

Зукомия — кора Дек. 1 : 10. Настойка и жидкий
Cortex Eucommiae экстракт — 15—30 кпл.

Rp.: Dec. cort. Eucommiae 10,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp.: Extr. Eucommiae fluidi 25,0
D. S. По 15—30 капель 2—3 раза в день

Rp.: T-rae Eucommiae 15,0
D. S. По 20 капель 2—3 раза в день

СОЛИ МЕТАЛЛОВ

Магния сульфат	П/к и В/м	1,25—5,0.	В/в
Magnesii sulfas, ФХ		0,25—1,0. П. в. р. Ампл.	5,0,
		10,0 и 20,0	— 20 и 25%

Rp.: Sol. Magnesii sulfatis 25% 10,0
D. t. d. N. 3 in amp.
S. По 5—10 мл внутримышечно 1 раз в день (при гиперто-
нической болезни)

Rp.: Sol. Magnesii sulfatis 25% 20,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 20 мл внутримышечно 4 раза в день (при нефропатии
беременных)

КОМБИНИРОВАННЫЕ ГИПОТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА

Андипал
Andipalum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: анальгин — 0,25, дибазол, папаверина гидрохлорид и фенобарбитал — аа 0,02

Rp.: Tab. Andipali N. 10
D. S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Депрессин
Depressinum (Б)

1/2—1 пр. Пр. (оф.) — состав: этаминал-натрий — 0,05, дибазол — 0,02, резерпин — 0,0001, гипотиазид — 0,025

Rp.: Pulv. Depressini N. 10
D. S. По 1/2—1 порошку 1—2 раза в день

Дивенал
Divenalum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: дибазол и папаверина гидрохлорид — аа 0,02, фенобарбитал — 0,025

Rp.: Tab. Divenali N. 10
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Дипасалин
Dipasalinum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: папаверина гидрохлорид и солицина гидрохлорид — аа 0,025, теобромин — 0,15, дибазол — 0,02, фенобарбитал — 0,015

Rp.: Tab. Dipasalini N. 10
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Келлатрин
Khellatrinum (А)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: атропина сульфат 0,00025, папаверина гидрохлорид и келлин — аа 0,02

Rp.: Tab. Khellatrini N. 20
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день после еды

Келливерин
Khelliverinum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: папаверина гидрохлорид — 0,02, келлин — 0,01

Rp.: Tab. Khelliverini N. 20
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Нигексин
Nihexinum (Б)

1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: гексилтеобромин — 0,02, никотиновая кислота — 0,05

Рр.: Tab. Nihexini N. 20
D. S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

НикOVERин
Nicoverinum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: папаверина гидрохлорид — 0,02, никотиновая кислота — 0,05

Рр.: Tab. Nicoverini N. 20
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Палюфин
Palufinum (А)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: платифиллина гидротартрат — 0,005, фенобарбитал и папаверина гидрохлорид — аа 0,02

Рр.: Tab. Palufini N. 20
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Папазол
Parazolum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: дибазол и папаверина гидрохлорид — аа 0,03

Рр.: Tab. Parazoli N. 20
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пафиллин
Paphyllinum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: папаверина гидрохлорид — 0,02, платифиллина гидротартрат — 0,005

Рр.: Tab. Paphyllini N. 20
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Платидин
Platydinum (А)

15—20 кпл. Ж. (оф.) — состав: платифиллина гидротартрат 0,01, папаверина гидрохлорид и сальсолидина гидрохлорид — аа 0,1, натрия бромид — 1,0, настойка ландыша и настойка валерианы — аа 10,0. Фл. 20,0

Рр.: Platyдини 20,0
D. S. По 15 капель 3—4 раза в день

Теминал
Theminalum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: фено-
барбитал — 0,02, теобромин и
амидопирин — аа 0,25

Rp.: Tab. Theminali N. 12
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Теоверин
Theoverinum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: теобро-
мин — 0,25, папаверина гид-
рохлорид — 0,03, барбамил —
0,075

Rp.: Tab. Theoverini N. 20
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Теодинал
Theodinalum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: теобро-
мин — 0,25, дибазол и фено-
барбитал — аа 0,02

Rp.: Tab. Theodinali N. 20
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Теодибаверин
Theodibaverinum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: теобро-
мин — 0,15, дибазол и папаве-
рина гидрохлорид — аа 0,02

Rp.: Tab. Theodibaverini N. 10
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Тепалюсал
Thepalusalum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: теобро-
мин — 0,25, сальсолина гид-
рохлорид, папаверина гидро-
хлорид и фенobarбитал — аа
0,03

Rp.: Tab. Thepalusali N. 20
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Тепафиллин
Theraphyllinum (А)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: плати-
филлина гидротартрат —
0,003, папаверина гидрохло-
рид и фенobarбитал — аа 0,03,
теобромин — 0,25

Rp.: Tab. Theraphyllini N. 10
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Тесаминал
Thesaminalum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: теобромин — 0,15, фенobarбитал и сальсолина гидрохлорид — аа 0,03, амидопирин — 0,3

Rp.: Tab. Thesaminali N. 10
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

СЛОЖНЫЕ ТАБЛЕТКИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В АПТЕКЕ
В ГОТОВОМ ВИДЕ

Rp.: Theobromini 0,25
Dibazoli
Papaverini hydrochloridi
Phenobarbitali аа 0,02
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—3 раза
в день

Rp.: Theobromini 0,25
Dibazoli 0,02
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—3 раза
в день

Rp.: Dibazoli
Phenobarbitali аа 0,025
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза
в день

Rp.: Theobromini 0,25
Dibazoli
Papaverini hydrochloridi аа
0,02
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—3 раза
в день

Rp.: Theobromini 0,25
Dibazoli 0,02
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—3 раза
в день

Rp.: Theobromini 0,25
Papaverini hydrochloridi
Phenobarbitali аа 0,02
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—3 раза
в день

Rp.: Theobromini 0,25
Papaverini hydrochloridi
Platyphyllini hydrotartratis
аа 0,03
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—3 раза
в день

Rp.: Theobromini 0,25
Phenobarbitali
Salsolini hydrochloridi аа
0,02
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—3 раза
в день

Rp.: Theobromini 0,25
Papaverini hydrochloridi
Salsolini hydrochloridi аа 0,03
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—3 раза
в день

Rp.: Theobromini 0,25
Salsolini hydrochloridi 0,03
Amidopyrini 0,3
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—3 раза
в день

Rp.: Theobromini 0,25
Papaverini hydrochloridi 0,02
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—3 раза
в день

Rp.: Dibazoli
Phenobarbitali
Papaverini hydrochloridi аа
0,025
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза
в день

СРЕДСТВА, РАСШИРЯЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

КОРОНАРНЫЕ СОСУДЫ ¹

НИТРИТЫ И НИТРАТЫ

Амилнитрит
Amylii nitris (Б), ФХ

Для вдыхания: 0,1 мл — 6 кпл.
(0,5 мл — 30 кпл.). Ж. в. нр.
Амп. 0,5 мл

Rp.: Amylii nitritis 0,5

D. t. d. N. 3 in amp.

S. Раздавить ампулу в носовом платке. Для вдыхания
в течение 10—30 сек.

Натрия нитрит
Natrii nitris (Б), ФХ

0,3 (1,0). П. в. р. Р-ры. Амп.
5,0 1%

Rp.: Natrii nitritis 1,2

Aq. destillatae 180,0

M. D. S. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Natrii nitritis 1% 20,0

Sterilisetur!

D. S. Для внутривенного введения по 10—20 мл (при отравлении цианидами)

Нитранол
Nitranolum (Б), ФХ

0,01 (0,02). П. в. нр. Тб. 0,002

Rp.: Nitranoli 0,002

D. t. d. N. 10 in tab.

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день после еды

Нитроглицерин
Nitroglycerinum (Б), ФХ

Высшие дозы под язык: 1% р-р —
4 кпл. (16 кпл.). Тб. — 1,5 тб.
(6 тб.). Тб. 0,0005. Р-р спир-
товой 1%

Rp.: Sol. Nitroglycerini 1% 5,0

D. S. По 1—2 капли под язык

Rp.: Nitroglycerini 0,0005

D. t. d. N. 40 in tab.

S. По 1 таблетке под язык

См. также производные пурина, ганглиолитики.

Нитросорбид 0,005—0,01. Тб. 0,005 и 0,01
Nitrosorbidum (Б)
(динитрат 1,4,3,6-диангидро-D-сорбита)

Rp.: Nitrosorbidi 0,005
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Эринит 0,01—0,02. П. в. нр. Тб. 0,01 и
Erynitum (Б) 0,02
(пентаэритритол тетранитрат)

Rp.: Eryniti 0,02
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 3—4 раза в день перед едой (в тяжелых случаях по 2 таблетки 2—4 раза в день)

Зарубежные препараты

Сустак (Югославия) 1—2 тб. мите. 1 тб. форте. Тб.
Sustacum (Б) мите — 0,0026; тб. форте —
(глицерола тринитрат) 0,0064

Rp.: Tab. Sustaci mite N. 25
D. S. По 1 таблетке 2 раза в день; в тяжелых случаях
можно заменить таблетками форте — по 1 таблетке
2 раза в день

КОРОНАРОРАСШИРЯЮЩИЕ СРЕДСТВА ДРУГИХ ГРУПП

Анетин 0,1. П. в. р. Тб. 0,1 (препарат из
Anethinum (Б) плодов укропа пахучего)

Rp.: Tab. Anethini 0,1
D. t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 3—5 раз в день

Валидол 4—5 кпл. Ж. (оф.) — 25—30%
Validolum (Б) раствор ментола в изовалериано-
ментоловом эфире. Фл. 5,0.
Тб. (оф.)

Rp.: Validoli 5,0
D. S. По 5 капель на кусочке сахара — сосать
Rp.: Tab. Validoli N. 10
D. S. По 1 таблетке под язык

Дaucapapин **0,02. П. в. нр. Пр. Тб. 0,2.**
Daucarinum (Б) (экстракт из семян моркови)

Rp.: Tab. Daucarini 0,02
D. t. d. N. 10
S. По 1 таблетке 3—5 раз в день

Диэтифен **0,025. П. в. р. Тб. 0,025. Амп.**
Diaethiphenum (Б) 5,0—0,2%

Rp.: Tab. Diaethipheni 0,25
D. t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день
Rp.: Sol. Diaethipheni 0,2% 5,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 5 мл внутримышечно 2—3 раза в день

Келлин **0,04 (0,12). П. в. нр. Тб. 0,02**
Khellinum (Б), ФХ

Rp.: Tab. Khellini 0,02
D. t. d. N. 25
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Пастинацин **0,02. П. в. р. Тб. 0,02 (препарат**
Pastinacinum (Б) из семян пастернака посев-
ного)

Rp.: Tab. Pastinacini 0,02
D. t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Хлорацизин **0,05 (0,15). П. в. р. Тб. 0,015**
Chloracyzinum (Б), ФХ

Rp.: Tab. Chloracyzini 0,015
D. t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Зарубежные препараты

Изоптин (Югославия) **Вн 0,04 — 0,08 В/в 0,02. Држ.**
Isoptinum (Vegaramylum) (Б) 0,04. Амп. 2,0—0,25%
(α -изопропил- α -[(N-метил-N-го-
мовератрил)-Г-аминопропил]-3,4-
диметоксифенилацетонитрила
гидрохлорид)

Rp.: Dragée Isoptini 0,04
D. t. d. N. 20
S. По 1 драже 3 раза в день, в случае необходимости дозу
можно увеличить до 1½ драже 3 раза в день

Rp.: Sol. Isoptini 0,25% 2,0
 D. t. d. N. 10 in amp.
 S. По 2 мл внутривенно 1—2 раза в день (вводить медленно!)

Интенсаин (Югославия) Intensainum (Б) [3-(β-диэтиламино-этил)-4-метил-7-карбэтокси-метокси-2-кето-(1,2-хромен)гидрохлорид]	Држ. 0,075. Амп. 0,04 в виде лиофилизированной субстанции. К каждой амп. прилагается амп. растворителя — 4 мл
--	---

Rp.: Dragée Intensaini á 0,075 N. 30
 D. S. По 2 драже 3 раза в день. Поддерживающие дозы — 1 драже 3 раза в день

Rp.: Intensaini in amp. 0,04 N. 5
 D. S. Развести содержимое ампулы в прилагаемом растворителе; вводить внутривенно (медленно — в течение 3—5 мин) 1—2 раза в день

Интеркордин (Польша) Intercordinum (Б)	0,075—0,15. Кпс. 0,075. Соответствует интенсаину
---	---

Rp.: Intercordini in caps. 0,075
 D. t. d. N. 100
 S. По 1—2 капсулы 3 раза в день

Коронтин (Венгрия) Corontinum (Б) [N-(3'-фенилпропил)-2'-(1,1-дифенилпропил)-амин лактат]	1—2 драже. Држ. 0,015. Држ. форте — 0,06. Спп. (оф.) — состав: коронтин — 0,06, фенобарбитал — 0,03
---	---

Rp.: Dragée Corontini N. 30
 D. S. По 1—2 драже 3 раза в день

Курантил (ГДР) Curantilum (Б)	0,025—0,05. Држ. 0,025. Амп. 2,0—0,005%
--	---

Rp.: Dragée Curantili á 0,025
 D. t. d. N. 100
 S. По 1—2 драже 2—3 раза в день за час до еды

Rp.: Sol. Curantili 0,005% 2,0
 D. t. d. N. 10 in amp.
 S. В острых случаях перед оральным применением внутривенно по 1—2 ампулы в день

Но-шпа (Венгрия) Nospanum (Б) (6,7,3',4'-тетраэтокси-1-бензил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина гидрохлорид)	0,04—0,08. П. в. р. Тб. 0,04. Амп. 2,0—2%
--	--

Rp.: Nospani 0,04
 D. t. d. N. 10 in tab.
 S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Nospani 2% 2,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 2—4 мл внутривенно (медленно!)

Панангин (Венгрия)
Pananginum

1—2 држ. Држ. (оф.) — состав:
Magnesii asparaginas anhydri-
cum 0,14, Kalii asparaginas
anhydricum 0,158. Ампл.
(оф.) — содержат 0,4 первого
препарата и 0,452 — второго

Rp.: Dragée Panangini N. 50
D. S. По 2 драже 3 раза в день

Rp.: Panangini in amp. N. 10
D. S. Содержимое 1 ампулы растворить в 50—100 мл
5% раствора глюкозы; вводить внутривенно (мед-
ленно) 2 раза в день

Фали-кор (ГДР)
Fali-corum (Б)

0,03. Држ. 0,015

(соответствует венгерскому пре-
парату коронтину)

Rp.: Dragée Fali-cori 0,015
D. t. d. N. 100
S. По 2 драже 3 раза в день

СРЕДСТВА, РАССЛАБЛЯЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МУСКУЛАТУРУ БРОНХОВ (бронхолитики) ¹

Сбор противоастматический
(астматол)

Species antiasthmaticae (Asthma-
tolum) (Б), ФХ

Пр. (оф.) — состав: листья бе-
лены — 1 часть, листья кра-
савки — 2 части, листья дур-
мана — 6 частей, нитрит на-
трия — 1 часть

Rp.: Species antiasthmatici 50,0
D. S. Порошок для курения; сжигать по 1/2 чайной ложки
для вдыхания

Теофедрин
Theophedrinum (Б)

1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: тео-
филлин, теобромин и кофеин —
аа 0,05, амидопирин и фенаце-
тин — аа 0,2, эфедрина гидро-
хлорид, листья красавки в по-
рошке и фенobarбитал — аа
0,02, лобелина гидрохлорид —
0,0002 (или цитизина — 0,0001)

Rp.: Tab. Theophedrini N. 10
D. S. По 1 таблетке 2 раза в день

¹ См. также адреналин и адреномиметические средства, холиноли-
гические средства, противогистаминные препараты.

Теofilлин
Theophyllinum (Б), ФХ

0,4 (1,2). П. в. р. Пр. Спп. 0,2

Rp.: Theophyllini 0,1
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp.: Theophyllini 0,2
Butyri Cacao q. s.
M. f. suppos. D. t. d. N. 10
S. По 1 свече 3 раза в день в задний проход

Эуфиллин
Euphyllinum (Б), ФХ

Вн, В/м и ректально 0,5 (1,5).
В/в 0,25 (0,5). П. в. р. Тб.
0,15. Ам. 2,0—12% и 10,0—
2,4%. Спп.

Rp.: Euphyllini 0,15
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Euphyllini 2,4% 10,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 5—10 мл внутривенно в 10—20 мл 20% раствора
глюкозы

Rp.: Euphyllini 0,2
Butyri Cacao q. s.
M. f. suppos. D. t. d. N. 10
S. По 1 свече 2 раза в день в задний проход

Rp.: Sol. Euphyllini 12% 2,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно

Эфедрин гидрохлорид
Ephedrini hydrochloridum (Б),
ФХ

0,05 (0,15). П. в. р. Пр. Тб.
0,025. Ам. 1,0—5%

Rp.: Tab. Ephedrini hydrochloridi 0,025
D. t. d. N. 10
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Rp.: Sol. Ephedrini hydrochloridi 2% 5,0
D. S. Капли в нос

Rp.: Sol. Ephedrini hydrochloridi 5% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5—1 мл подкожно

Зарубежные препараты

Антастман (Чехословакия)
Antasthmanum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: амидопирин и фенацетин — аа 0,2, теofilлин — 0,1, кофеин — 0,05, густой экстракт красавки — 0,01, порошок из листьев лобелии — 0,09, эфедрина гидрохлорид и фенобарбитал — аа 0,02

Rp.: Tab. Antasthmani N. 30
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Диафиллин (Венгрия)
Diaphyllinum (Б)

5—10 мл. Ж. (оф.). Для В/в амп. 1 мл — содержат 0,24 теofilлин-этилендиамина. Для В/м амп. 5 мл — 0,24 препарата. Тб. 0,1. Спп. 0,36

Rp.: Diaphyllini 5 ml
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 5 мл внутримышечно ежедневно или через день

Rp.: Tab. Diaphyllini N. 50
D. S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Rp.: Suppos. Diaphyllini N. 20
D. S. По 1—2 свечи в день в задний проход

Диафиллин венозум
(Чехословакия)
Diaphyllinum venosum (Б)

5 мл. Ж. (оф.). Ам. 5 мл содержат 0,24 теofilлин-этилендиамина

Rp.: Diaphyllini venosi 5 ml
D. t. d. N. 5 in amp.
S. По 5 мл 1 раз в день внутривенно (вводить медленно!)

Диафиллин глютеозум (Чехословакия)
Diaphyllinum gluteosum (Б)

1 мл. Ж. (оф.). Ам. (оф.) — 1 мл. Состав: теofilлин-этилендиамин — 0,24, нарканин — 0,01

Rp.: Diaphyllini gluteosi 1 ml
D. t. d. N. 5 in amp.
S. По 1 мл 1 раз в день внутримышечно

Солутан (Чехословакия)
Solutanum (Б)

10—30 кпл. Ж. (оф.) — состав:
extr. Belladonnae fl. — 0,5,
extr. Primulae fl., extr. Stramonii fl.,
extr. Balsami Tolutani fl., Ephedrini hydrochloridi — \overline{aa} 0,85, Natrii iodidi — 5,0, Procaini hydrochloridi — 0,2, Glycerinum et Spiritus — ad 50,0. Фл. 50,0

Rp.: Solutani 50,0

D. S. По 10—30 капель 3 раза в день после еды

**СРЕДСТВА, РАССЛАБЛЯЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
МУСКУЛАТУРУ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ¹**

Ависан
Avisanum

0,05—0,1. П. в. тр. Тб. 0,05
(препарат, содержащий сумму
веществ из плодов амми зуб-
ной)

Rp.: Tab. Avisani 0,05

D. t. d. N. 20

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день после еды

Беллалгин
Bellalginum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: анал-
гин и анестезин — \overline{aa} 0,25,
экстракт красавки — 0,015,
натрия гидрокарбонат — 0,1

Rp.: Tab. Bellalгинi N. 12

D. S. По 1 таблетке 3 раза в день

Бепасал
Bepasalum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: фенил-
салицилат — 0,3, папаверина
гидрохлорид — 0,03, экстракт
красавки — 0,012

Rp.: Tab. Bepasali N. 12

D. S. По 1 таблетке 3 раза в день

Павестезин
Pavesthesinum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: анесте-
зин — 0,3, папаверина гидро-
хлорид — 0,05

Rp.: Tab. Pavesthesini N. 20

D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

¹ См. также холинолитические средства, производные изохинолина, галидор.

Саррацина гидротартрат
Sarracini hydrotartras (Б)

0,01—0,03. П. в. р. Тб. 0,01
(алкалоид, выделенный из корневища крестовника широколистного)

Rp.: *Sarracini hydrotartratis* 0,01
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1—3 таблетки 3 раза в день

Синюха голубая — трава и корень
Herba et radix Polemonii coerulei

Дек. Инф. 6,0 : 200,0. Тб. 0,2

Rp.: *Tab. Polemonii coerulei* 0,2
D. t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды (предварительно обязательно развести в $\frac{1}{4}$ стакана теплой воды)

Сушеница топяная — порошок из травы
Pulvis herbae Gnaphalii uliginosi

0,2. П. в. нр. Тб. 0,2

Rp.: *Pulv. herbae Gnaphalii uliginosi* 0,2
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день до еды (перед употреблением обязательно развести в $\frac{1}{4}$ стакана теплой воды)

Сушеница топяная — трава
Herba Gnaphalii uliginosi, ФХ

Инф. 1,5 : 10. Жидкий экстракт 30—40 клл. Сб.

Rp.: *Inf. herbae Gnaphalii uliginosi* 30,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день перед едой

Rp.: *Extr. Gnaphalii uliginosi fluidi* 30,0
D. S. По 30—40 капель 3 раза в день до еды

Rp.: *Herbae Gnaphalii uliginosi* 100,0
D. S. 2 столовые ложки травы заварить в стакане кипятку. Выпить в 2 приема в день, до еды

Таблетки желудочные с опиумом *
Tabulettae Stomachicae cum opio
(А)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: экстракт полыни — 0,012, экстракт валерианы — 0,015, порошок опия — 0,01

Rp.: *Tab. Stomachicae cum opio* N. 10
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Таблетки желудочные с экстрактом красавки
Tabulettae Stomachicae cum extracto Belladonnae (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: экстракт полыни — 0,012, экстракт валерианы — 0,015, экстракт красавки — 0,01

Rp.: Tab. Stomachicae cum extracto Belladonnae N. 10
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Таблетки мятные
Tabulettae olei Menthae

1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: масло мятное — 0,0025, сахар — 0,5

Rp.: Tab. olei Menthae N. 20
D. S. По 1—2 таблетки на прием под язык

МОЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА¹

РТУТНЫЕ ДИУРЕТИКИ

Меркузал
Mercusalum (Б)

Высшая разовая и суточная доза
В/м 1 мл. Ж. (оф.) — 10% раствор органического соединения ртути. Амп. 1 мл

Rp.: Mercusali 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в 5 дней

Промеран
Promeranium (А), ФХ

2 тб. (8 тб.). Тб. (оф.)

Rp.: Tab. Promerani N. 10
D. S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды в течение 4 дней

БЛОКАТОРЫ КАРБОАНГИДРАЗЫ

Диакarb
Diacarbium (Б)
(2-ацетиламино-1,3,4-тиадиазол-5-сульфамид)

0,25. П. в. нр. Тб. 0,25

Rp.: Diacarbii 0,25
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1 раз в день

¹ См. также марена красильная, цистенал, средства, способствующие выделению солей.

ДИХЛОТИАЗИД И ЕГО АНАЛОГИ

Дихлотиазид

0,025—0,05. П. в. тр. Тб. 0,025

Dichlothiazidum (Б)

(6-хлор-7-сульфамил-3,4-дигидро-
1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диок-
сид)

Rp.: Dichlothiazidi 0,025

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1—2 таблетки в день (в тяжелых случаях дозу можно
увеличить до 8 таблеток в день в 1—2 приема)

Циклометназид

0,00025—0,001. П. в. нр. Тб.

Cyclomethiazidum (Б)

0,0005

(3-циклопентилметил-6-хлор-7-
сульфамил-3,4-дигидро-1,2,4-
бензотиадиазин-1, 1-диоксид)

Rp.: Cyclomethiazidi 0,0005

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке в день утром (в тяжелых случаях
до 4 таблеток один раз в день)

МОЧЕВИНА

Мочевина

10,0—20,0. П. в. с. р. Пр.

Urea pura

Rp.: Ureae purae 100,0

D. S. По 2 чайные ложки на сахарном сиропе 2—3 раза
в день

Мочевина для инъекций

Urea pro injectionibus

В/в до 1 г на кг веса больного.

П. в. с. р. Пр. во фл. 30,0—45,0—
60,0 и 90,0. К каждому флако-
ну прилагается 10% раствор
глюкозы — 75,0—115,0—150,0
и 225,0 для приготовления
33% раствора мочевины

Rp.: Ureae pro injectionibus 90,0

D. S. Содержимое флакона растворить в 225 мл 10%
раствора глюкозы. Для двух внутривенных вливаний
(капельно) 1—2 раза в сутки

ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРИМИДИНА

Аллацил
Allacilum (Б)
(1-аллил-3-этил-6-аминоурацил) 0,2—0,4. П. в. тр. Пр. Тб. 0,2

Rp.: Tab. Allacili 0,2
D. t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день во время еды (при больших отеках можно первые дни назначать по 2 таблетки 3—4 раза в день)

СОЛИ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ И АММОНИЯ

Аммония хлорид
Ammonii chloridum 0,2—0,5. П. в. р. Пр. Тб. 0,25.
Р-ры

Rp.: Ammonii chloridi 0,25
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Калия ацетат — раствор
Solutio Kalii acetatis 1,0—3,0. Р-ры (оф.) — 33—35%.

Rp.: Sol. Kalii acetatis 15,0
Aq. destill. ad 150,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ МОЧЕГОННЫМ ДЕЙСТВИЕМ

Маннитол
Mannitolum В/в 15,0—45,0. Ж. (оф.) — состав: маннит, сульфацил-натрий, трипофлавин и хлорид натрия. Фл. 500,0, содержащие 20,0 действующего вещества

Rp.: Mannitoli 500,0
D. S. По 15—30 мл внутривенно один раз в день

Зарубежные препараты

Верошпирон (Венгрия) 0,025—0,075. Држ. 0,025

Verospironum (Б)

[3-(3-оксо-7 α -ацетилтио-17 β -окси-4-андростен-17 α -ил)-пропионовокислый γ -лактон]

Rp.: Dragée Verospironi 0,025

D. t. d. N. 20

S. По 1 драже 3—4 раза в день. В тяжелых случаях дозу можно увеличить до 3 драже 3—4 раза в день

Гипотиазид (Венгрия)

0,025—0,05. П. в. р. Тб. 0,025 и 0,1

Hypothiazidum (Б)

(соответствует отечественному препарату дихлотиазиду)

Rp.: Tab. Hypothiazidi 0,025

D. t. d. N. 20

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Новурит (Венгрия)

0,3—1 мл Ж. (оф.) — ртутный диуретик. Ампл. 1 и 2 мл. Спп. (оф.)

Novuritum (Б)

Rp.: Novuriti 1 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 0,3—1 мл внутримышечно 1—2 раза в неделю (на первую инъекцию не более 0,5 мл)

Rp.: Suppos. Novuriti N. 6

D. S. По 1/2—1 свече 1—2 раза в неделю

Фонурит (Венгрия)

0,25—0,5. Тб. 0,25.

Fonuritum (Б)

(соответствует отечественному препарату диакарбу)

Rp.: Fonuriti 0,25

D. t. d. N. 10 in tab.

S. По 1 таблетке в день, постепенно снижая дозу до 2—3 таблеток в неделю

Фуросемид (Польша)

0,04. Тб. 0,04

Furosemidum (Б)

[4-хлор-N-(2-фурилметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота]

Rp.: Tab. Furosemidi 0,04

D. t. d. N. 50

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

**МОЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ**

Береза — лист
Folium Betulae

Инф. 1 : 10

Rp.: Inf. fol. Betulae 20,0—200,0
D. S. Выпить в 2 приема в течение дня

Береза — почки
Gemmae Betulae

Сб.

Rp.: Gemmarum Betulae 100,0
D. S. 1 чайную ложку сбора заварить в стакане кипятку;
выпить в 3 приема в течение дня

Брусника — лист
Folium Vitis idaeae

Сб. Инф. 1 : 10

Rp.: Inf. fol. Vitis idaeae 20,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день
Rp.: Fol. Vitis idaeae 100,0
D. S. 2 чайные ложки листьев заварить в стакане кипятку;
выпить в течение дня в 2—3 приема

Василек — цветки
Flores Centaureae

Сб.

Rp.: Flor. Centaureae 100,0
D. S. 1 чайную ложку сбора заварить в стакане кипятку;
выпить в течение дня в три приема

Грыжник — трава
Herba Herniariae

Сб.

Rp.: Herbae Herniariae 100,0
D. S. 1 столовую ложку сбора залить стаканом кипящей
воды, кипятить 10 мин, выпить в течение дня в
3 приема (рекомендуется после приготовления отвара
всыпать в кастрюлю столовую ложку листьев толок-
нянки и настаивать еще 15 мин)

Земляника — ягоды
Fructus Fragariae

Сб.

Rp.: Fructus Fragariae 50,0
D. S. 2 столовые ложки ягод заварить в стакане кипятку;
выпить в течение дня в 3 приема

Лопух — корень Radix Bardanae	Дек. 1 : 10
Rp.: Decocti rad. Bardanae 20,0—200,0 D. S. Выпить в течение дня в 3 приема	
Можжевельник — плод Fructus Juniperi, ФХ	Инф. 1 : 10
Rp.: Inf fructus Juniperi 20,0—200,0 D. S. По 1 столовой ложке 4—5 раз в день	
Ортосифон — листья Folium Orthosiphoni	Сб.
Rp.: Fol. Orthosiphoni 30,0 D. S. 1 чайную ложку листьев залить стаканом кипятку и кипятить 5 мин; настаивать в течение 4 ч, процедить; выпить в 2 приема в теплом виде, перед едой	
Петрушка — плод Fructus Petroselini	Дек. 1 : 10
Rp.: Dec. fructus Petroselini 20,0—200,0 D. S. По 1 столовой ложке 5 раз в день	
Толокнянка — лист Folium Uvae ursi, ФХ	Дек. 1 : 10
Rp.: Dec. fol. Uvae ursi 20,0—200,0 D. S. По 1—2 столовые ложки 3 раза в день	
Хвощ полевой — трава Herba Equiseti arvensis	Жидкий экстракт 1,0—3,0. Сб.
Rp.: Herbae Equiseti 100,0 D. S. 2 столовые ложки травы заварить в стакане кипятку; выпить в течение дня в 3 приема	
Rp.: Extr. Equiseti fluidi 30,0 D. S. По 1½ чайной ложки 4—6 раз в день	
Чай мочегонный № 1 Species diureticae N. 1	Состав: листья толокнянки — 3 части, цветы василька и солодковый корень — аа 1 часть
Чай мочегонный № 2 Species diureticae N. 2	Состав: листья толокнянки и плоды можжевельника — аа 4 части, солодковый корень — 1 часть

МАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА ¹
ПРЕПАРАТЫ СПОРЫНЬИ

Спорынья
Secale cornutum (Б), ФХ

Инф. 1 : 10

Rp.: Inf. *Secalis cornuti* 6,0—180,0
D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Спорынья — порошок
Pulvis Secalis cornuti (Б)

1,0 (5,0)

Rp.: Pulv. *Secalis cornuti* 0,5
D. t. d. N. 20 in charta cerata
S. По 1 порошку 3 раза в день

Эрготал
Ergotalum (Б), ФХ

Вн 0,001 (0,003); П/к 0,00025 —
0,0005 (0,0005—0,001). П. в. р.
Тб. 0,001. Амп. 1,0—0,05%
(сумма фосфорнокислых солей
алкалоидов спорыньи)

Rp.: Ergotali 0,001
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Ergotali 0,05% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 0,5—1 мл подкожно 1 раз в день

Эрготамина тартрат
Ergotamini tartras (А)

0,00025—0,001. П. в. тр. Амп.
1,0—0,05%. Фл. 10,0—0,1%.
Држ. 0,001

Rp.: Sol. Ergotamini tartratis 0,05% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5—1 мл подкожно или внутримышечно 1 раз в день

Rp.: Sol. Ergotamini tartratis 0,1% 10,0
D. S. По 20 капель 3 раза в день

¹ См. также питуитрин, питуитрин М, маммофизин.

Метилэргометрин (Чехословакия) Methylergometrinum (Б)	В/м и П/к 0,5—1 мл. В/в 0,25—0,5 мл. Ж. (оф.) — со- держит в 1 мл 0,0002 тар- трата метилэргометрина. Амп. 1,0—0,02%
--	--

Rp.: Methylergometrini 0,02% —1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5—1 мл внутримышечно или подкожно 1 раз в день

Окситоцин синтетический (Венгрия) Oxytocinum (Б)	0,5—2 мл. Ж. (оф.). Амп. 1 мл Активность 1 мл — 5 ЕД
--	---

Rp.: Oxytocini á 1 ml
D. t. d. N. 6 in amp.
S. 1) По 0,5 мл внутримышечно (для остановки послеродо-
вых кровотечений); 2) по 0,2—0,5 мл внутривенно
в 10 мл изотонического раствора натрия хлорида (для
получения быстрого эффекта или при отсутствии эффекта
от внутримышечных инъекций); 3) по 1—2 мл внутри-
мышечно (в гинекологии); 4) для ускорения родового
акта — 1 мл в 500 мл 5% раствора глюкозы (вводить
медленно — 8—10 капель в минуту!)

Эргометрина малеат (Чехосло- вакия) Ergometrini maleas (Б)	0,0002—0,0004. П. в. р. Тб. 0,0002. Амп. 1,0—0,02%
--	---

Rp.: Sol. Ergometrini maleatis 0,02% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Rp.: Ergometrini maleatis 0,0002
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Эрготамин (Чехословакия) Ergotaminum (Б) (соответствует отечественному препарату эрготамина тарт- рату)	0,00025—0,001. П. в. тр. Амп. 0,5 и 1,0—0,05%. Држ. 0,001
---	--

Rp.: Sol. Ergotamini 0,05% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5—1 мл внутримышечно 1 раз в день

МАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДРУГИХ ГРУПП И ПРЕПАРАТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Барбарис амурский — настойка 25—30 кпл.
Tinctura Berberis amurensis

Rp.: T-rae Berberis amurensis 10,0
D. S. По 25 капель 3 раза в день

Барбарис обыкновенный — на- стойка 30—40 кпл. Фл. 50,0
Tinctura Berberis vulgaris

Rp.: T-rae Berberis vulgaris 50,0
D. S. По 30 капель 3 раза в день перед едой

Бревиколлин 0,02—0,04. П.в.р. Амп. 2,0—1%.
Brevicollinum (Б) Фл. 30,0—3% (препарат из
листьев осоки нарвской)

Rp.: Sol. Brevicollini 1% 2,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—2 мл внутримышечно 3—4 раза с интервалами
в 1 ч

Rp.: Sol. Brevicollini 3% 30,0
D. S. По 20—30 капель 4—5 раз с интервалами в 1 ч

Ветразин 0,01—0,02. П. в. р. Тб. и Држ.
Vetrazinum (Б) 0,005. Амп. 1,0—1%
(3,4-диметоксibenзилгидразина
гидрохлорид)

Rp.: Sol. Vetrazini 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно

Rp.: Vetrazini 0,005
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 3—4 таблетки до 5 раз в сутки

Винкаметрин В/м 1—2 мл. — 1%. П. в. р.
Vincametrinum (Б) Амп. 1,0 и 2,0—1%
(гидрохлорид алкалоида винка-
мина)

Rp.: Sol. Vincametrini 1% — 2,0
D. t. d. N. 5 in amp.
S. По 1—2 мл внутримышечно при слабости родовой дея-
тельности

Водяной перец — жидкий экстракт 30—40 кпл.
ракт
Extractum Polygoni hydropiperis
fluidum, ФХ

Rp.: Extr. Polygoni hydropiperis fluidi 25,0
D. S. По 30 капель 3 раза в день

Изоверин В/м 0,02—0,05. Вн. 0,1. П. в.
Isoverinum (Б) р. Тб. 0,1. Амп. 1,0—2 и 5%

Rp.: Isoverini 0,1
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Isoverini 2% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Калина — жидкий экстракт 15—30 кпл.
Extractum Viburni fluidum, ФХ

Rp.: Extr. Viburni fluidi 10,0
D. S. По 20 капель 2—3 раза в день

Котарнина хлорид (стиптицин) 0,1 (0,3). П. в. р. Тб. 0,05
Cotarnini chloridum (Stypticinum) Р-ры
(Б), ФХ

Rp.: Cotarnini chloridi 0,05
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Cotarnini chloridi 5% 5,0
Sterilisetur!
D. S. По 1 мл подкожно 1—3 раза в день

Крапива — жидкий экстракт 30—40 кпл.
Extractum Urticae fluidum

Rp.: Extr. Urticae fluidi 100,0
D. S. По 30—40 капель 3 раза в день

Крапива — лист Сб. Инф. 15,0—200,0
Folium Urticae

Rp.: Fol. Urticae 100,0
D. S. 1 столовую ложку сбора заварить в стакане кипятка;
принимать по 1—2 столовые ложки 3—4 раза в день

Пастушья сумка — жидкий эк- 20—30 кпл.
стракт
Extractum Bursae pastoris fluidum

Rp.: Extr. Bursae pastoris fluidi 20,0
D. S. По 20 капель 3 раза в день

Прегнантол 0,01—0,02. П. в. р. Тб. 0,02.
Praegnantolum (citras et hydro- Амп. 1,0—1%
chloridum)

Rp.: Praegnantoli citratis 0,02
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день после еды
Rp.: Sol. Praegnantoli hydrochloridi 1% 1,0
D. t. d. N. in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Чистец буквицветный — жидкий 20—30 кпл.
экстракт
Extractum Stachys betonicaflorae
fluidum

Rp.: Extr. Stachys betonicaflorae fluidi 20,0
D. S. По 20—30 капель 3—4 раза в день

Глава VI

ГИСТАМИН И ПРОТИВОГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ГИСТАМИН

Гистамин Histaminum (A)	0,0005. П. в. р. Ампл. 1,0—0,1%
----------------------------	---------------------------------

Rp.: Sol. Histamini 0,1% 1,0

D. t. d. N. 3 in amp.

S. По 0,5 мл внутримышечно (для диагностики состояния желудочных желез)

Зарубежные препараты

Гистамин в возрастающих дозах СПОФА (Чехословакия) Histaminum ascendens (mite et forte) (A)	Мите: серия из 20 ампул с возрастающими дозами гистамина — от 0,01 до 10 мкг. Форте: серия из 10 ампул с содержанием в каждой двух ампулах одинаковой дозы гистамина — от 15 до 50 мкг (ампулы перенумерованы)
--	--

Rp.: Histamini ascendens mite in amp. N. 20

D. S. По 1 ампуле подкожно 1 раз в день или через день, соблюдая порядковый номер

ПРОТИВОГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Алооцимен Aloocimenum (2,6-диметил-3,5,7-октатриен)	Амп. 5,0—0,025% (водно-спиртово-коллоидный раствор). Гл. клп.
---	---

Rp.: Sol. Aloocimeni 0,025% 5,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1—2 капли в конъюнктивальный мешок 2—10 раз в день (перед употреблением к 1 мл исходного раствора добавить 40 мл дистиллированной воды)

Диазолин
Diazolinum (Б), ФХ

0,3 (0,6). П. в. р. Кпс. Тб. 0,05
и 0,1

Rp.: Diazolini 0,1
D. t. d. N. 10 in caps. gelat.
S. По 1 капсуле 2—3 раза в день после еды

Димедрол
Dimedrolum (Б), ФХ

Вн 0,1 (0,25); В/м 0,05 (0,15).
Тб. 0,03, 0,05 и 0,1.
Амп. 1,0—1%

Rp.: Dimedroli 0,05
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Dimedroli 0,05
Ephedrini hydrochloridi 0,1
Ol. Menthae gtts. III
Ol. Persicorum 10,0
M. D. S. Капли в нос

Rp.: Sol. Dimedroli 1% 1,0
D. t. d. N. 6. in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Rp.: Dimedroli 0,02
Ac. borici 0,2
Aq. destill. 10,0
M. D. S. Глазные капли

Дипразин
Diprazinum (Б), ФХ

Вн 0,075 (0,5); В/м 0,05
(0,25). П. в. р. Тб. 0,025.
Амп. 2,0—2,5%

Rp.: Sol. Diprazini 2,5% 2,0
D. t. d. N. 6. in amp.
S. По 1—2 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Rp.: Diprazini 0,025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Этизин
Aethyzinum (Б)

0,025—0,05. П. в. р. Тб. 0,025.
Пр. Амп. 5,0—0,5%

Rp.: Aethyzini 0,025
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Эфедрол
Ephedrolum (Б)

1 тб. Тб. (оф.) — состав: эфедрина гидрохлорид и димедрол —
аа 0,025

Rp.: Tab. Ephedroli N. 20
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Зарубежные препараты

Пипольфен (Венгрия)
Pipolphenum (Б)

0,025—0,05. П. в. р. Држ. 0,025.
Амп. 2,0—2,5%. Спп. 0,025

(соответствует отечественному
препарату дипразину)

Rp.: Dragée Pipolpheni 0,025
D. t. d. N. 20
S. По 1—2 драже 3 раза в день

Rp.: Suppos. Pipolpheni á 0,025
D. t. d. N. 10
S. По 1 свече 2—3 раза в день в прямую кишку

Rp.: Sol. Pipolpheni 2,5% 2,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 2 мл внутримышечно 2 раза в день

Супрастин (Венгрия)
Suprastinum (Б)

0,025. П. в. р. Тб. 0,025. Амп.
1,0—2%

[N-диметиламиноэтил-N-(парахлор-
бензил)-амидопирина гидро-
хлорид]

Rp.: Suprastini 0,025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Suprastini 2% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—2 мл внутримышечно 1 раз в день

Глава VII

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ПРОЦЕССЫ ТКАНЕВОГО ОБМЕНА

ВИТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ВИТАМИН В₁

Кокарбоксилазы гидрохлорид
Cocarboxylasi hydrochloridum
(дифосфорный эфир тиамина)

0,025—0,2. Пр. 0,05 в амп. с прилагаемым растворителем

Rp.: Cocarboxylasi hydrochloridi 0,05

D. t. d. N. 50 in amp.

S. Содержимое одной ампулы растворить в прилагаемом растворителе; внутримышечно по 2 мл 1—2 раза в день

Тиамин бромид
Thiaini bromidum, ФХ

0,005—0,01. П. в. р. Амп. 1,0—3 и 6%. Тб. 0,001 и 0,002. Комбинированные препараты — стр. 179

Rp.: Thiaini bromidi 0,01

Glucosi 0,3

M. f. pulv. D. t. d. N. 20

S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Rp.: Thiaini bromidi 0,002

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 2—3 таблетки 3 раза в день

Rp.: Sol. Thiaini bromidi 6% 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1 мл подкожно (внутримышечно) 1 раз в день

Тиамина хлорид Thiainini chloridum, ФХ	0,002—0,01. П. в. р. Амп. 1,0— 2,5 и 5%. Пр. Тб. 0,002, 0,005 и 0,01
---	--

- Rp.: Sol. Thiainini chloridi 5% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл подкожно (внутримышечно) 1 раз в день
- Rp.: Thiainini chloridi 0,005
Sacchari 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день

ВИТАМИН В₂

Дрожжи очищенные пивные су- хие (торулин) Faex medicinale (Torulinum)	1,0—2,0. Тб. 0,5
---	------------------

- Rp.: Faecis medicinalis 0,5
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 2—3 таблетки 3—4 раза в день

Рибофлавин (витамин В ₂) Riboflavinum (Vitaminum В ₂), ФХ	0,005—0,01. П. в. тр. Пр. Р-ры Држ. 0,001, 0,002, 0,005 и 0,01. Сложные тб., стр. 179
---	---

- Rp.: Riboflavini 0,003
Glucosi 0,5
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день
- Rp.: Dragée Riboflavini 0,005
D. t. d. N. 30
S. По 1 драже 3—4 раза в день
- Rp.: Riboflavini 0,001
Aq. destill. 10,0
M. D. S. Глазные капли

Рибофлавин мононуклеотид Riboflavini mononucleotidum	0,01. П. в. р. Амп. 1,0—1%
---	----------------------------

- Rp.: Sol. Riboflavini mononucleotidi 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день

ВИТАМИН В₆

Пиридоксина гидрохлорид	0,025—0,05. П. в. р. Пр. Тб.
Pyridoxini hydrochloridum, ФХ	0,005 и 0,01. Амп. 1,0—1%, 2,5% и 5%. Комбинированные препараты — стр. 180

Rp.: Pyridoxini hydrochloridi 0,05

Glucosi 0,3

M. f. pulv. D. t. d. N. 20

S. По 1 порошку 2 раза в день

Rp.: Sol. Pyridoxini hydrochloridi 2,5% 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день

ВИТАМИН В₁₂

Антианемин	2—4 мл. Ж. (оф.) — из печени
Antianaeminum	крупного рогатого скота. Амп. 2 мл (в 1 мл содержится 0,6 мкг витамина В ₁₂)

Rp.: Antianaemini 2 ml

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 2—4 мл внутримышечно 1 раз в день

Камполон	2—4 мл. Ж. (оф.) — из печени
Campololum	крупного рогатого скота, дель- финов, китов. Амп. 2 мл (в 1 мл содержится до 1,3 мкг вита- мина В ₁₂)

Rp.: Campoloni 2 ml

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 2 мл внутримышечно 1 раз в день

Цианокобаламин (витамин В ₁₂)	0,0001—0,0002. П. в. р. Амп.
Cyanocobalaminum (Vitaminum В ₁₂), ФХ	1,0—0,003, 0,01, 0,02, 0,05 и 0,1%.

Rp.: Sol. Cyanocobalaminum 0,01% 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в 2—3 дня

ВИТАМИН В₁₅

Кальция пангамат (витамин В ₁₅)	0,05—0,1. П. в. р. Тб. 0,05
Calcii pangamas (Vitaminum В ₁₅)	

Rp.: Calcii pangamatis 0,05

D. t. d. N. 100

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

КАЛЬЦИЯ ПАНТОТЕНАТ

Кальция пантотенат
Calcii pantothenas

0,05—0,1. П. в. р. Тб. 0,01.
Амп. 2,0 — 20%. Р-ры. Комби-
нированные препараты — стр.
180

Rp.: Calcii pantothenatis 0,05
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 1—2 таблетки 1—2 раза в день
Rp.: Sol. Calcii pantothenatis 5% 100,0
D. S. Для примочек и полосканий

ВИТАМИН РР

Коамид
Coamidum

0,01. П. в. р. Амп. 1,0 — 1%
(комплексное соединение ко-
бальта и амида никотиновой
кислоты)

Rp.: Sol. Coamidi 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл подкожно 1 раз в день

Никотинамид
Nicotinamidum, ФХ

0,005—0,1. П. в. р. Држ. 0,015.
Тб. 0,005 и 0,025. Амп. 1,0—
1% и 2,5% и 2,0 и 2,5 — 5%.
Комбинированные препара-
ты, — стр. 180

Rp.: Nicotinamidi 0,005
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день
Rp.: Sol. Nicotinamidi 2,5% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день

Никотиновая кислота¹
Acidum nicotinicum (Б), ФХ

Вн 0,1 (0,5)¹; В/в 0,1 (0,3).
П. в. р. Тб. и држ. 0,005,
0,01 и 0,05. Амп. 1,0 и 2,0 —
1, 2 и 5%. Сложные тб. —
стр. 179

Rp.: Acidi nicotiniци 0,01
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

¹ При приеме внутрь разовая доза может быть постепенно увеличена (при отсутствии побочных явлений) до 0,5, а суточная — до 3,0—5,0

Rp.: Sol. Acidi nicotini 5% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл подкожно

Никотиновая кислота с календу-
лой — таблетки КН
Tabuletta KN (Б)

$\frac{1}{2}$ —1 тб. Тб. (оф.) — состав:
порошок цветочных корзинок
календулы — 0,25 и никоти-
новая кислота — 0,1

Rp.: Tabulettae KN N. 30
D. S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 2 раза в день до еды

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

Фолиевая кислота
Acidum folicum, ФХ

0,005—0,01. П. в. нр. Пр. Тб.
0,001. Сложные тб. и држ. —
стр. 181

Rp.: Acidi folici 0,01
Sacchari 0,2
N. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 1—3 раза в день

Rp.: Ac. folici 0,001
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

ХОЛИН-ХЛОРИД

Холин-хлорид¹
Cholini chloridum

В/в капельным способом — до
2,0. Вн — 1,0. П. в. р. Ампл.
10,0 — 20%. Фл. 100,0 — 20%.
Пр.

Rp.: Sol. Cholini chloridi 20% 100,0
D. S. По 1 чайной ложке 3—5 раз в день

Rp.: Sol. Cholini chloridi 20% 10,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Развести содержимое одной ампулы в 100 мл 5% раство-
ра глюкозы (для одного внутривенного капельного вли-
вания)

¹ См. также фехолин.

ВИТАМИН С

Аскорбинат магния с глюкозой — раствор Magnii ascorbas cum Glucoso — solutio	Р-р (оф.) в амп. по 10,0 — глюкозы — 40% и аскорбината магния — 5%
---	--

Rp.: Sol. Magnii ascorbatis 5% cum Glucoso 40% pro injectionibus 10,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 10 мл внутривенно 1 раз в день

Аскорбинат натрия — раствор 5 и 10% для инъекций Solutio Natrii ascorbatis 5% et 10% pro injectionibus	0,05—0,5. П. в. р. Амп. 1,0, 2,0 и 5,0 — 5% и 10%
---	---

Rp.: Sol Natrii ascorbatis pro injectionibus 5% 5,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 5 мл внутривенно в 10 мл 20% раствора глюкозы

Аскорбиновая кислота Acidum ascorbinicum, ФХ	0,05—0,15. П. в. р. Пр. (оф.). Тб. 0,02, 0,05. Амп. 1,0 — 5, 10 и 25%; 2,0 — 5 и 10%; 5,0 — 5 и 10%. Комбинированные препараты — стр. 179
---	---

Rp.: Sol. Acidi ascorbinici 10% 2,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—2 мл внутривенно в 10 мл 20% раствора глюкозы

Rp.: Ac. ascorbinici 0,05
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Rp.: Acidi ascorbinici 0,2
Glucosi 0,5
M. f. pulv. D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp.: Acidi ascorbinici
Glucosi aa 0,5
M. f. pulv. D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 3 раза в день

ВИТАМИН Р

Витамин Р Vitaminum P	0,05—0,1. Тб. 0,01, 0,025 и 0,05 Комбинированные препараты — стр. 182
--------------------------	--

Rp.: Vitamini P
Acidi ascorbinici aa 0,1
Glucosi 0,5
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Rp.: Vitamini P
Acidi ascorbinici \overline{aa} 0,05
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день

Rp.: Vitamini P. 0,05
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки 3—5 раз в день

Кверцетин 0,02. П. в. пр. Тб. 0,02
Quercetinum
(3,5,7,3',4'-пентагидроксифла-
вон)

Rp.: Quercetini 0,02
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Рутин 0,06—0,15. П. в. тр. Пр. Тб. 0,02
Rutinum, ФХ и комбинированные препара-
ты — стр. 179

Rp.: Rutini 0,02
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Таблетки из плодов рябины чер- 0,05 — 0,075. П. в. пр. Тб. 0,05
ноплodной
Tablettae ex fructibus Aroniae

Rp.: Tab. ex fruct. Aroniae 0,05
D. t. d. N. 50
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день перед едой (разжевы-
вать и запивать небольшим количеством воды)

ВИТАМИН А

Аевит 1 мл. Ж. (сф.) масляный раствор,
Aevitum содержащий в 1 мл: аксеро-
фтола ацетат — 0,035 и α -то-
коферола ацетат — 0,1. Ампл.
1 мл

Rp.: Aeviti 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день

Витамин А — драже 50 000 ЕД (100 000 ЕД). Држ.
Vitaminum A — dragée (сф.) — содержат 3300 ЕД

Rp.: Dragée Vitamini A N. 50
D. S. По 1 драже 3—4 раза в день

Витамин А — жидкий концентрат
Solutio Vitamini A oleosa,
(Б), ФХ

2—10 кпл. Фл. 10,0. Активность
1,0 — 100 000 ЕД

Rp.: Sol. Vitamini A oleosae 10,0
D. S. По 2—3 капли 2 раза в день

Екоропталмол
Jecorophthalmolum

1—3 мл. Ж. (оф.) — состав: смесь
равных объемов рыбьего жи-
ра и персикового масла. Амп.
1 мл

Rp.: Jecorophthalmoli 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—3 мл внутримышечно 1 раз в день

Ретинола ацетат (аксерофтола
ацетат) — масляный раствор
Solutio Retinoli acetatis oleosa
(Acherophtholi acetat (Б)

25 000 — 100 000 ЕД. Амп.
1 мл с содержанием — 25 000,
50 000 и 100 000 ЕД. Фл. 10,0
(в 1,0—100 000 ЕД). Тб. 0,01
(33 000 ЕД). Комбинирован-
ные препараты — стр. 180

Rp.: Sol. Retinoli acetatis oleosae á 50 000 ЕД 1 ml
D. t. d. N. 5 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в 2—3 дня

Rp.: Sol. Retinoli acetatis oleosae 10,0
D. S. По 3—5 капель на кусочек хлеба с солью 1—2 раза
в день

Rp.: Tab. Retinoli acetatis 0,01
D. t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Ретинола пальмитат — масля-
ный раствор
Solutio Retinoli palmitatis oleosa
(Б)

25 000—100 000 ЕД. Фл. 10,0—
1,0 масляного раствора содер-
жит 100 000 ЕД

Rp.: Sol. Retinoli palmitatis oleosae 10,0
D. S. По 3—5 капель на кусочек хлеба с солью 1—2 раза
в день

Рыбий жир
Oleum jecoris Aselli, ФХ

10,0—15,0. Активность 1 мл —
350 ЕД витамина А и 30 ЕД
витамина D₂

Rp.: Ol. jecoris Aselli 250,0
D. S. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Цитраль¹
Citalum

0,01—0,02. Ж. в. нр. с. р. Р-ры

Rp.: Sol. Citrali spirituosae 1% 15,0
D. S. По 20—40 капель 3 раза в день

Rp.: Sol. Citrali spirituosae aquosi 0,01% 5,0
D. S. Глазные капли

Цихоль
Cicholum

1—2 мл. Ж. (оф.) — содержит
0,2% цитраля в комплексе
с холеиновокислым натрием

Rp.: Cicholi 5 ml
D. S. Глазные капли

Rp.: Cicholi 2 ml
D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 1—2 мл подкожно с прибавлением 0,5 мл 0,5% раство-
ра новокаина

ВИТАМИН D₃

Видеин
Videinum (Б)

Высшая суточная доза
100 000 ЕД. П. в. нр. (ком-
плекс казеина с эргокальци-
феролом). Држ. и тб. по 500,
1000, 5000 и 10 000 ЕД эрго-
кальциферола

Rp.: Dragée Videini á 10 000 ЕД
D. t. d. N. 30
S. По 2 драже 1 раз в день

Rp.: Dragée Videini á 500 ЕД N. 30
D. S. По 1 драже 1 раз в день, постепенно увеличивая дозу
до 4 драже в день

Эргокальциферол (витамин D₂)
Ergocalciferolum (Vitaminum D₂)
(Б)

3 000—25 000 ЕД. Р-р в масле —
фл. 10,0 (активность 1 мл —
50 000 ЕД). Р-р в спирте —
фл. 35,0 (1 мл — 200 000 ЕД).
Држ. 500 ЕД

Rp.: Sol. Ergocalciferoli oleosae (á 50 000 ЕД) 10,0
D. S. По 20—30 капель 1 раз в день

¹ Как противоглистное применяется в дозах 0,1—0,2.

² См. также гендевит, рыбий жир.

Rp.: Sol. Ergocalciferoli spirituosae (á 200 000 ЕД) 35,0
D. S. По 3—5 капель 1 раз в день

Rp.: Dragée Ergocalciferoli á 500 ЕД
D. t. d. N. 30
S. По 1 драже 1—2 раза в день

ВИТАМИН Е¹

Витамин Е — драже
Dragée Vitamini E

Држ. (оф.). — содержат: 0,025—
0,05—0,1 и 0,2 α-токоферолов
и комбинированные препара-
ты — стр. 181

Rp.: Dragée Vitamini E á 0,05
D. t. d. N. 30
S. По 1 драже 1—2 раза в день

Витамин Е — масляный раст-
вор
Solutio Vitamini E oleosa

3—5 мл. Ж. (оф.). Фл. 100,0 —
1 мл содержит 0,003 витамина
Е. Амп. 1 мл — 3, 10, 20 и 30%

Rp.: Sol. Vitamini E oleosae 100,0
D. S. По 1 чайной ложке 1 раз в день

Витамин Е — спирто-сахарный
раствор
Solutio Vitamini E spirituosasaccharum

3—5 мл. Ж. (оф.). Фл. 100,0 —
1,0 содержит 0,0005 витами-
на Е

Rp.: Sol. Vitamini E spirituosasacchari 100,0
D. S. По 1 чайной ложке 1 раз в день

Облепиховое масло
Oleum Hippophaeae

Содержит смесь глицеридов олеиновой, линолевой и пальмитиновой кислот, витамин Е (110—160 мг%), каротин (40—100 мг%), каротиноиды (180—250 мг%)

Rp.: Olei Hippophaeae 100,0
D. S. Для перевязок как ранозаживляющее; при лучевых повреждениях кожи; для лечения эрозий матки; внутрь по 10—15 г при язвенной болезни

¹ См. также аевит, ундевит.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВИТАМИНОВ, ИМЕЮЩИЕСЯ В АПТЕКЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ

Rp.: Thiamini bromidi
Riboflavini $\bar{a}\bar{a}$ 0,005
Ac. ascorbinici 0,1
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 2—5 раз
в день

Rp.: Thiamini bromidi 0,005
Ac. ascorbinici 0,1
Ac. nicotinici 0,03
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 2—5 раз
в день

Rp.: Thiamini bromidi 0,001
Ac. ascorbinici 0,05
Ac. nicotinici 0,01
Glucosi 0,5
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 2—5 раз
в день

Rp.: Thiamini bromidi
Riboflavini $\bar{a}\bar{a}$ 0,005
Ac. nicotinici 0,03
Ac. ascorbinici 0,1
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 2—5 раз
в день

Rp.: Thiamini bromidi
Riboflavini $\bar{a}\bar{a}$ 0,002₈
Ac. nicotinici 0,07
Ac. ascorbinici 0,015
Pyridoxini hydrochloridi
0,002
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 3—5 раз
в день

Rp.: Thiamini bromidi
Riboflavini $\bar{a}\bar{a}$ 0,002
Ac. nicotinici 0,015
Ac. ascorbinici 0,07
Rutini 0,035
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 2—5 раз
в день

Rp.: Thiamini bromidi
Riboflavini $\bar{a}\bar{a}$ 0,002
Ac. folici 0,01
Ac. nicotinici 0,015
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 2—5 раз
в день

Rp.: Acidi ascorbinici 0,05
Rutini 0,2
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1—2 таблетки 2—3 раз
за в день

Rp.: Acidi ascorbinici 0,2
Vitamins B₁ 0,01
Glucosi 0,5
M. f. pulv. D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 3 раза
в день

Rp.: Acidi ascorbinici 0,2
Vitamins B₁
Vitamins B₂ $\bar{a}\bar{a}$ 0,01
Glucosi 0,5
M. f. pulv. D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 3 раза
в день

Rp.: Acidi ascorbinici 0,3
Vitamins B₁
Vitamins B₂
Acidi nicotinici $\bar{a}\bar{a}$ 0,01
Glucosi 0,5
M. f. pulv. D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 3 раза
в день

Rp.: Acidi ascorbinici 0,3
Thiamini bromidi
Riboflavini $\bar{a}\bar{a}$ 0,01
Acidi nicotinici 0,005
Glucosi 0,5
M. f. pulv. D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 3 раза
в день

Rp.: Acidi ascorbinici 0,2
Vitamins P 0,075
Glucosi 0,5
M. f. pulv. D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 3 раза
в день

Rp.: Retinoli acetatis 2500 ЕД
Thiaini bromidi 0,00129
Riboflavini 0,001
Ac. ascorbinici 0,035
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза
в день

Pyridoxini hydrochloridi
Riboflavini aa 0,005
Ac. nicotinici 0,05
Calcii pantothenatis 0,01
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза
в день

Rp.: Retinoli acetatis 2500 ЕД
Riboflavini
Thiaini bromidi aa 0,001
Ac. ascorbinici 0,035
Nicotinamidi 0,005
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза
в день

Rp.: Retinoli acetatis 2500 ЕД
Thiaini bromidi 0,0026
Riboflavini
Pyridoxini hydrochloridi aa
0,002
Ac. ascorbinici 0,07
Ac. nicotinici 0,015
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза
в день

Аскорбиновая кислота с тиамин-
бромидом — раствор
Solutio acidi ascorbinici 10% cum
Thiaino bromido 5%

Амп. 1,0. Состав: аскорбиновая
кислота — 10%, тиамин-бро-
мид — 5%.

Rp.: Sol. Ac. ascorbinici 10% cum Thiaino bromido 5% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Аскорбиновая и никотиновая
кислоты в таблетках
Tabulettae Vitamini C, PP

Тб. (оф.). Состав: аскорбиновая
кислота — 0,005, никотиновая
кислота — 0,02

Rp.: Tab. Vitamini C, PP N. 10
D. S. По 1 таблетке 3 раза в день

Аскорутин
Ascorutinum

1—2 тб. Тб. (оф.) — состав:
аскорбиновая кислота и ру-
тин — aa 0,05

Rp.: Tab. Ascorutini N. 50
D. S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Витаминный чай № 1
Species polivitaminicae N. 1

Состав: плоды шиповника и чер-
ной смородины — aa

Rp.: Species polivitaminicae N. 1 100,0
D. S. 2 чайные ложки сбора заварить двумя стаканами ки-
пятку; по 1/2 стакана 3—4 раза в день

Витаминный чай № 2
Species polivitaminicae N. 2

Состав: плоды шиповника и яго-
ды рябины — аа

Rp.: Species polivitaminicae N. 2 100,0

D. S. 2 чайные ложки сбора заварить двумя стаканами кипятку; по $\frac{1}{2}$ стакана 3—4 раза в день

«Гендевит» драже
«Hendevitum» dragée

1—2 држ. Држ. (оф.) — состав:
ретинол (витамин А) — 0,001,
тиамин-бромид — 0,00194, ри-
бофлавин — 0,0015, пиридок-
сина гидрохлорид — 0,002, ни-
котинамид — 0,01, аскорбино-
вая кислота — 0,075, эрго-
кальциферол — 250 ЕД, циано-
кобаламин — 10 мкг, α -то-
коферола ацетат — 0,005, пан-
тотенат кальция — 0,003, фо-
лиевая кислота — 0,0005

Rp.: Dragée «Hendeviti» N. 50

D. S. По 1 драже 1—2 раза в день (при беременности и корм-
лении)

Декамевит 1 и 2
Decamevitum 1 et 2

Тб. (оф.) — 1 желтого цвета и
2 — оранжевого.

Тб. 1 — состав: ретинол —
0,002, токоферола ацетат —
0,01, тиамин-хлорид — 0,02,
тиамин-бромид — 0,0258, ри-
бофлавин — 0,01, фолиевая ки-
слота — 0,005, пиридоксина
гидрохлорид — 0,02, рутин —
0,02, метионин — 0,2.

Тб. 2 — состав: цианокобала-
мин — 0,0001, аскорбиновая
кислота — 0,2, никотин-амид —
0,05

Rp.: Tab. Decameviti 1 et 2 á N. 40

D. S. По 2 таблетки (1 желтая и 1 оранжевая) 1—2 раза
в день. Курс лечения — 20 дней. Промежутки между
курсами — 2—3 месяца

Каротолин
Carotolinum

Наружно. Ж. (оф.) — масляный
раствор из плодов шиповника
(содержит каротиноиды, ви-
тамин Е и линолевую кисло-
ту). Фл. 100,0 и 200,0

Rp.: Carotolini 100,0

D. S. Смочить марлевые салфетки и накладывать на пора-
женные участки кожи 1—2 раза в день, прикрывая
сверху вощаной бумагой

Певироз
Pevirosum

1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: су-
хой концентрат плодов шипов-
ника — 0,05 и витамина Р —
0,0025

Rp.: Tab. Pevirosi N. 30

D. S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Поливитамины А, В₁, В₂, С
Dragée Vitamini A, B₁, B₂, C

Држ. (оф.). Состав: витамин А —
1650 ЕД, аскорбиновая кис-
лота — 0,025, тиамин-бромид
и рибофлавин — аа 0,001

Rp.: Dragée Vitamini A, B₁, B₂, C N. 25

D. S. По 1 драже 3—5 раз в день

Поливитамины С, В₁, РР
Tabulettae Vitamini C, B₁, PP

Тб. (оф.). Состав: аскорбиновая
кислота — 0,05, тиамин-бро-
мид — 0,002, никотиновая ки-
слота — 0,02

Rp.: Tab. Vitamini C, B₁, PP N. 10

D. S. По 1 таблетке 3 раза в день перед едой

«Ундевит» драже
«Undevitum» dragée

1—2 држ. Држ. (оф.) — состав:
витамин А — 0,001, тиамин-
хлорид — 0,002 или тиамин-
бромид — 0,00258, рибофла-
вин — 0,002, пиридоксина гид-
рохлорид — 0,003, цианокоба-
ламин — 0,000002, никотина-
мид — 0,02, витамин Р и ви-
тамин Е — аа 0,01, фолиевая
кислота — 0,0005, кальция
пантотенат — 0,003, аскорби-
новая кислота — 0,075

Rp.: Dragée «Undeviti» N. 50

D. S. По 1—2 драже 3 раза в день

Урутин
Urutinum

1 мл. Ж. (оф.) — состав: ру-
тин — 0,025, уротропин —
0,05 в 1 мл. Амп. 1 и 2 мл

Rp.: Urutini 1 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1 мл 1 раз в день внутримышечно или подкожно

Фехолин
Fecholinum

5,0—15,0. ГЖ (оф.) — состав:
холин — около 1,8%, витамин Е — не менее 90 мг%, витамин F, ряд витаминов группы В, углеводы, белки и др. Фл. 200,0, 300,0 и 500,0

Rp.: Fecholini 300,0

D. S. По 1 чайной ложке 3 раза в день на молоке в течение 8—10 дней

Шиповник — жидкий концентрат
Extractum Rosae fluidum

Ж. (ф.) — содержит 0,4% аскорбиновой кислоты. Фл. 250,0

Rp.: Extr. Rosae fluidi 250,0

D. S. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Шиповник — плод
Fructus Rosae, ФХ

Сб. Пр. Тб. с содержанием аскорбиновой кислоты по 0,02 и 0,2

Rp.: Fructus Rosae 100,0

D. S. 1 столовую ложку сбора заварить в стакане кипятку; выпить в течение дня в 2—3 приема перед едой

Rp.: Pulv. fructus Rosae 100,0

D. S. 1 столовую ложку порошка заварить в 2 стаканах кипятку; по $\frac{1}{2}$ стакана 2—3 раза в день перед едой

Rp.: Tab. Rosae cum acido ascorbinico 0,2

D. t. d. N. 20

S. Растворить 1 таблетку в стакане кипятку; выпить в течение дня в 3 приема

Rp.: Tab. Rosae cum acido ascorbinico 0,02

D. t. d. N. 30

S. По 1—3 таблетки 3—4 раза в день

Шиповник — сироп из плодов
с витамином С

ГЖ. (оф.) — содержит в 1 мл 0,005 аскорбиновой кислоты

Шиповник — сироп из плодов
с витамином С и ягодным
экстрактом

ГЖ. (оф.) — содержит в 1 мл 0,004 аскорбиновой кислоты

Зарубежные препараты

Кокарбоксилаза (Польша) Cocarboxylasum (пирофосфорный эфир тиамина)	0,025—0,2. П. в. р. Пр. в ампул. 0,05 и 0,1 и ампул. с растворителем (2 мл 0,5% раствора новокаина)
---	---

Rp.: Cocarboxylasi 0,05
D. t. d. N. 50 in amp.
S. Содержимое одной ампулы растворить в 2 мл прилагаемого растворителя; внутримышечно по 2 мл 1—2 раза в день

Эревит (Чехословакия) Erevitum	Кпл. (оф.) — 1 мл содержит 0,05 или 0,25 препарата. Ампул. (оф.) — содержат в 1 мл 0,03, 0,05 и 0,2 препарата. Држ. по 0,01. Мз. 0,5% (препарат, содержащий смесь токоферолов)
---	--

Rp.: Sol. Ereviti 5% 10,0
D. S. По 10—15 капель 1—2 раза в день

Rp.: Sol. Ereviti 5% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРЕПАРАТЫ ГИПОФИЗА¹

Адиопозин Adiposinum (Б)	0,05. Пр. во флак. 50 ЕД (препарат, получаемый из передней доли гипофиза убойного скота)
---	--

Rp.: Adiposini 0,05
D. t. d. N. 5
S. Содержимое одного флакона растворить в 2 мл 0,5% раствора новокаина. Вводить внутримышечно 1 раз в день

Адиурекрин Adiurecrinum (Pituitrinum siccum) (Б)	0,03—0,05 (0,15). П. нр. Пр. в нос
--	---

Rp.: Adiurecrini 0,05
D. t. d. N. 12 in charta cerata
S. По 1 порошку 2—3 раза в день на слизистую носа

¹ См. также тиротропин, эрипоэтин.

Адренокортикотропный гормон
для инъекций
Hormonium adrenocorticotropi-
num pro injectionibus (Б), ФХ

10—20 ЕД (40—80 ЕД). П. в. р.
Фл. 10, 20 и 40 ЕД

Rp.: Hormoni adrenocorticotropini pro injectionibus 10 ЕД

D. t. d. N. 6

S. По 1 мл внутримышечно 1—4 раза в сутки (содержимое 1 флакона растворить перед употреблением в 1 мл стерильной дистиллированной воды или в стерильном изотоническом растворе хлорида натрия)

Гифоточин (питуитрин М)
Hyphotocinum (Pituitrinum М) (Б)

5 ЕД. Ж. (оф.). Ампл. 1 мл (с содержанием 5 ЕД в 1 мл)

Rp.: Hyphotocini 1 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. Внутримышечно по 0,2—0,4 через каждые 30 мин до общей дозы 1 мл

Гонадотропин сывороточный
Gonadotropinum sericum

П. в. р. Ампл. 500 и 1000 ЕД
с приложением растворителя.
Тб. 50 ЕД

Rp.: Gonadotropini serici 500 ЕД

D. t. d. N. 4 in amp.

S. По 500 ЕД внутримышечно через день; перед употреблением растворить в прилагаемом растворителе

Rp.: Gonadotropini serici 50 ЕД

D. t. d. N. 50 in tab.

S. По 1 таблетке под язык 2 раза в день в течение 2—3 месяцев

Гонадотропин хорионический
для инъекций
Gonadotropinum chorionicum
pro injectionibus, ФХ

500—2000 ЕД. Ампл. 500, 1000
и 2000 ЕД с приложением растворителя

Rp.: Gonadotropini chorionici pro injectionibus 1000 ЕД

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1000 ЕД внутримышечно 2—3 раза в неделю (перед употреблением растворить гонадотропин в 1 ампуле растворителя)

Интермедин
Intermedinum

П. в. р. Меланофорный гормон
средней доли гипофиза круп-
ного рогатого скота. Гл. кил.
Пр. во фл. 0,05 с приложением
растворителя в амп. по 1 мл

Rp.: Intermedini 0,05

D. t. d. N. 5 in amp.

S. Глазные капли: из ампулы набрать шприцем 1 мл раст-
ворителя, ввести его во флакон с порошком интермедина;
по 3 капли в каждый глаз с промежутками по 5 мин после
каждой капли

Маммофизин
Mammophysinum

Ж. (оф.) — состав: смесь эк-
стракта задней доли гипофиза
и экстракта молочной железы
лактлирующих коров. Амп.
1 мл

Rp.: Mammophysini 1 ml

D. t. d. N. 6 in amp.

S. 1) по 1—1,5 мл подкожно или внутримышечно при маточ-
ных кровоечениях; 2) по 0,3—0,4 мл каждые 30 мин
до наступления эффекта (не более 6 инъекций) при сла-
бости родовой деятельности

Питуитрин для инъекций
Pituitrinum pro injectionibus
(Б)

10 ЕД (20 ЕД). Ж. (оф.) — эк-
стракт задней доли гипофиза
крупного рогатого скота. Амп.
1 мл — активность — 5 и
10 ЕД

Rp.: Pituitrini pro injectionibus 1 ml (5 ЕД)

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 1 мл подкожно 1 раз в день

Пролактин
Prolactinum

1 мл. Ж. (оф.). Содержит лакто-
генный гормон передней доли
гипофиза крупного рогатого
скота. Фл. 5 мл (1 мл — 5 ЕД)

Rp.: Prolactini 5 ml

D. S. По 1 мл 1—2 раза в день внутримышечно

Зарубежные препараты

Префизон (**) Prephysonum (Б)	Амп. (оф.) — префизон в 1 мл — 25 ЕД и префизон форте в 1 мл — 75 ЕД. Тб. (оф.) (стандартизированный экстракт передней доли гипофиза)
----------------------------------	---

- Rp.: Prephysoni 1 ml in amp. N. 10
 Prephysoni-forte 1 ml in amp. N. 10
 D. S. По 1—2 ампулы префизона или по 1 ампуле префизона форте подкожно или внутримышечно 1 раз в два дня; после 3-й инъекции — ежедневно
- Rp.: Tab. Prephysoni N. 50
 D. S. По 1 таблетке 3 раза в день одновременно с инъекциями

Хориогонин (Венгрия) Choriogoninum	Пр. в амп. — 500 ЕД и 1500 ЕД с приложением растворителя
---------------------------------------	--

- Rp.: Choriogonini 1500 ЕД
 D. t. d. N. 10 in amp.
 S. Содержимое 1 ампулы растворить в прилагаемом растворителе; внутримышечно 2—3 раза в неделю

ПРЕПАРАТЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ И ТОРМОЗЯЩИЕ ФУНКЦИЮ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Препараты, стимулирующие функцию щитовидной железы

Тиреоидин Thyreoidinum (Б), ФХ	0,3 (1,0). П. в. пр. Пр. Тб. 0,1 и 0,2
-----------------------------------	--

- Rp.: Thyreoidini 0,2
 D. t. d. N. 20 in tab.
 S. По 1 таблетке 2—3 раза в день
- Rp.: Thyreoidini 0,05
 Sacchari 0,25
 M. f. pulv. D. t. d. N. 20
 S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Тиротропин Thyrotropinum	10 ЕД. П. (оф.) — очищенный экстракт передней доли гипофиза крупного рогатого скота. Пр. во фл. по 10 ЕД с приложением растворителя
-----------------------------	---

- Rp.: Thyrotropini 10 ЕД
 D. t. d. N. 7
 S. Содержимое 1 флакона растворить в прилагаемом растворителе; вводить подкожно или внутримышечно 1 раз в день в течение 5—7 дней

Зарубежные препараты

Трийодтиронина (ГДР)	гидрохлорид	0,02—0,2. Тб. 0,00001; 0,00002 и 0,00005
Triiodthyronini hydrochloridum (3,3',5-трийод-L-тиронин)		

Rp.: Tab. Triiodthyronini hydrochloridi 0,00002

D. t. d. N. 50

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день, постепенно увеличивая дозу до эффективной

Препараты, тормозящие функцию
щитовидной железы¹

Бетазин	0,075 (0,2). П. в. тр. Тб. 0,05
Betasinum (Б), ФХ	

Rp.: Betasini 0,05

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 2 раза в день после еды

Дийодтирозин	0,075 (0,2). П. в. тр. Тб. 0,05
Diiodthyrosinum (Б), ФХ	

Rp.: Diiodthyrosini 0,05

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день после еды

Калия перхлорат	0,25. П. в. тр. Пр. Тб. 0,25
Kalii perchloras (Б)	

Rp.: Kalii perchloratis 0,25

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день по схеме

Камфодал — драже	Држ. (оф.) — состав: йод кри-
Dragée Camphodalum (Б)	сталлический — 0,0005, йодид

калия — 0,005, фенобарби-
тал — 0,01, бром-камфора —
0,1, порошок корня и корне-
вища валерьяны — 0,1, эк-
стракт валерьяны густой —
0,05

Rp.: Dragée Camphodali N. 30

D. S. По 1 драже 2 раза в день после еды

¹ См. также препараты йода.

Мерказолил Mercazolilum (Б), ФХ (1-метил-2-меркаптоимидазол)	0,01 (0,04). П. в. р. Пр. Тб. 0,01
--	---------------------------------------

Rp.: Mercazolili 0,01
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2 раза в день после еды

Микройод Microiodum	1 држ. Држ. (оф.) — состав: йод — 0,0005, калия йодид — 0,005, порошок корня валерья- ны — 0,05. Наполнитель — до 0,25
------------------------	--

Rp.: Dragée Microiodi N. 40
D. S. По 1 драже 3 раза в день

Микройод с фенобарбиталом Microiodum cum Phenobarbitalo	1 држ. Држ. (оф.) — состав: йод — 0,0005, калия йодид — 0,005, фенобарбитал — 0,01, порошок корня валерьяны — 0,05, наполнитель — до 0,25.
--	--

Rp.: Dragée Microiodi cum Phenobarbitalo N. 40
D. S. По 1 драже 3 раза в день

Метилтиоурацил Methylthiouracilum (Б), ФХ	0,25 (0,75). П. в. нр. Пр. Тб. 0,25
--	--

Rp.: Methylthiouracili 0,05
Sacchari 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 1—3 раза в день после еды

Rp.: Methylthiouracili 0,25
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 1—3 раза в день после еды

ПРЕПАРАТЫ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ

Паратиреоидин для инъекций Parathyreoidinum pro injectioni- bus (Б)	П/к, В/м 5 мл (15 мл). Ж. (оф.) Амп. 1 мл. Фл. 5 и 10 мл. Содержат водный раствор гор- мональных веществ околощи- товидных желез крупного ро- гатого скота. Активность 1мл 20 ЕД
---	--

Rp.: Parathyreoidini pro injectionibus 1 ml
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

ПРЕПАРАТЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Бутамид 1,5 (4,0). П. в. нр. Тб. 0,25 и 0,5
Butamidum (Б), ФХ
[N-(4-метилбензолсульфанил)-
N-п-бутилмочевина]

Рр.: Butamidi 0,25
D. t. d. N. 20 in tab.
S. Индивидуально, в зависимости от количества сахара
в крови и моче; обычно по 3—6 таблеток в день, посте-
пенно уменьшая дозу до 1—3 таблеток в день после еды

Инсулин для инъекций 5—40 ЕД. Ж. (оф.). Фл. 5 и
Insulinum pro injectionibus 10 мл. Активность 1 мл — 40
(Б), ФХ и 80 ЕД

Рр.: Insulini pro injectionibus (à 40 ЕД) 5 мл
D. S. По 0,5—1 мл подкожно 1—2 раза в день

Липокаин 0,1—0,2. П. в. р. Тб. 0,1 (10 ЕД)
Lipocainum (липотропное вещество под-
желудочной железы крупного
рогатого скота)

Рр.: Lipocaini 0,1
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день с творогом или овся-
ной кашей

Суспензия инсулин-протамина 5—40 ЕД. Фл. 5 мл.
для инъекций
Suspensio Insulini-protaminum
pro injectionibus (Б)

Рр.: Susp. Insulini-protamini pro
injectionibus 5 мл
D. S. По 0,25—1 мл подкожно 1—2 раза в день

Суспензия протамин-цинк-инсу- 5—40 ЕД. Ж. (оф.). Фл. 5 и
лина для инъекций 10 мл (в 1 мл — 40 ЕД)
Suspensio Protamin-zinc-insulini
pro injectionibus (Б), ФХ

Рр.: Suspensionis Protamini-zinc-insulini pro injectionibus 5 мл
(40 ЕД)
D. t. d. N. 2
S. По 0,25 мл подкожно 2 раза в день

Суспензия цинк-инсулина для
инъекций
Suspensio Zinc-insulini pro injectionibus (Б), ФХ

5—40 ЕД. Суспензия (оф.) —
в 1 мл 40 ЕД. Фл. 5 и 10 мл

Rp.: Susp. Zinc-insulini pro injectionibus 5 ml
D. S. По 0,5—1 мл подкожно 1 раз в день

Суспензия цинк-инсулина амор-
фного для инъекций
Suspensio Zinc-insulini amorphi
pro injectionibus (Б), ФХ

5—40 ЕД. Суспензия (оф.) —
в 1 мл 40 или 80 ЕД. Фл. —
5 мл

Rp.: Susp. Zinc-insulini amorphi pro injectionibus 5 ml
D. t. d. N. 2
S. По 0,5—1 мл подкожно 1—2 раза в день

Суспензия цинк-инсулина кри-
сталлического для инъекций
Suspensio Zinc-insulini crystallisa-
ti pro injectionibus (Б), ФХ

5—40 — ЕД. Суспензия (оф.) в
1 мл 40 ЕД. Фл. — 5 мл

Rp.: Susp. Zinc-insulini crystallisati pro injectionibus 5 ml
D. S. По 0,25—0,5 мл подкожно 1—2 раза в сутки

Хлорпропамид
Chlorpropamidum (Б), ФХ
[N-(4-хлорбензолсульфанил)-
-N-пропилмочевина]

0,3 (1,0). П. в. нр. Тб. 0,1 и 0,25

Rp.: Chlorpropamidi 0,1
D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 1 раз в день, в дальнейшем — в зависимости
от результатов

Цикламид
Cyclamidum (Б)
[N-(4-метилбензолсульфанил)-N'-
циклогексил-мочевина]

0,5—1,0. П. в. нр. Тб. 0,25 и
0,5

Rp.: Cyclamidi 0,5
D. t. d. N. 30 in tab.

S. По 1 таблетке 4—5 раз в день в течение двух дней, затем
постепенно уменьшать дозу до 1—2 таблеток в день

Зарубежные препараты

Адебит (Венгрия) Adebitum (Б)	0,5—1,0. Тб. 0,05
--	--------------------------

Rp.: Tab. Adebiti 0,05

D. t. d. N. 40

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день, постепенно повышая дозу (в случае необходимости) на 1 таблетку каждые 2—4 дня

Букарбан (Венгрия) Biscarbani (Б) (соответствует отечественному препарату бутамиду)	0,5—1,0. Тб. 0,5
---	-------------------------

Rp.: Tab. Biscarbani 0,5

D. t. d. N. 30

S. Лечение начинать с ударной дозы по нижеследующей схеме: 1-й день — 5 тб. 4-й день — 3 тб.

2 » — 4 » 5 » — 2 »

3 » — 3 » 6 » — 1 »

В дальнейшем доза определяется индивидуально в зависимости от уровня сахара в крови.

Орабет (ГДР) Orabetum (Б) (соответствует отечественному препарату бутамиду)	Тб. (оф.)
---	------------------

Rp.: Tab. Orabeti N. 30

D. S. Назначается строго индивидуально, в зависимости от количества сахара в крови и в моче

ПРЕПАРАТЫ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Дезоксикортикостерона ацетат Desoxycorticosteroni acetat (Б), ФХ	0,01 (0,025). П. в. нр. Амп. 1 мл — 0,5% (в масле) Тб. 0,0025 и 0,005
---	--

Rp.: Sol. Desoxycorticosteroni acetatis oleosae 0,5% 1 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1 мл внутримышечно через день

Дезоксикортикостерона триметилацетат Desoxycorticosteroni trimethylacetat (Б)	П. в. нр. Амп. 1,0—2,5% суспензии
--	--

Rp.: Suspens. Desoxycorticosteroni trimethylacetatis 2,5% 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в 2 недели

Кортин
Cortinum

1—2 мл. Ж. (оф.). Ампл. 1 мл (ак-
тивность — 10 ЕД)

Rp.: Cortini 1 ml.
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл подкожно 1—2 раза в день

Преднизон
Prednisonum (Б), ФХ

0,015 (0,1). Тб. 0,005 и 0,001

Rp.: Tab. Prednisoni 0,005
D. t. d. N. 30
S. По 5—6 таблеток в день в 3—4 приема, постепенно сни-
жая дозу до 1 таблетки в день

Зарубежные препараты

Гидрокортизон (Венгрия,
Польша)
Hydrocortisonum (Б)

0,03—0,06. П. в. тр. Суспензия
в ампл. 5 мл — 2,5%. Мз.
1—2,5%. Гл. мз. 0,5%

Rp.: Suspens. Hydrocortisoni 2,5% 5 ml
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1—4 мл внутримышечно 2—3 раза в день
Rp.: Ung. Hydrocortisoni 0,5% 5,0
D. S. Глазная мазь

Гидрокортизона ацетат
(Венгрия)
Hydrocortisoni acetat (Б)

0,2—0,3 мл. Фл. 5 мл взвеси
(в 1 мл содержится 0,025 пре-
парата)

Rp.: Hydrocortisoni acetatis 5 ml
D. S. По 0,2—0,3 мл внутримышечно и в полость суставов

Гидрокортизоновая мазь
(Венгрия)
Unguentum Hydrocortisonum

Наружно. Мз. (оф.) — состав:
гидрокортизона ацетат —
0,0125, хлорамфеникол —
0,005, мазевая основа — 2,5.
Тубы 2,5

Rp.: Ung. Hydrocortisoni 2,5
D. S. Вводить в конъюнктивальный мешок

Гидрокортизона гемисукци-
нат (**)
Hydrocortisoni hemisuccinas (Б)
(17-оксикортикостерон гемисук-
цинат)

0,025—0,05. Ампл., содержащие
0,025 и 0,05 препарата с при-
ложением растворителя

Rp.: Hydrocortisoni hemisuccinatis 0,025
D. t. d. N. 10 in amp.
S. Внутривенно по 1—2 ампулы, предварительно развести
в прилагаемом растворителе

Дексаметазон (Югославия) Dexamethazonum (Б) (16 α -метил-9 α -фтор-преднизолон)	0,001. Тб. 0,0005 и 0,001. Ампл. 1,0—0,4%
---	--

Rp.: Dexamethazoni 0,001
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды

Кортизона ацетат (Венгрия) Cortisonum acetat (Б), ФХ	0,15 (0,3). П. в. нр. Тб. 0,025 и 0,05. Суспензия фл. 5,0 и 10,0—2,5%
---	---

Rp.: Cortisoni acetatis 0,025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 4 таблетки 2 раза в день, постепенно снижая дозу до 2 таблеток в день
Rp.: Suspens. Cortisoni acetatis 2,5% 5,0
D. S. По 2—3 мл внутримышечно 1 раз в день

Полькортолон (Польша) Polcortelonum (Б) (9 α -фтор-16 α -гидрооксипреднизолон)	0,002—0,01. Тб. 0,001 и 0,004
--	-------------------------------

Rp.: Polcorteloni 0,001
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Преднизолон (Венгрия, — Польша) Prednisolonum (Б) ФХ	0,015 (0,1). П. в. нр. Тб. 0,001, 0,0025 и 0,005
--	---

Rp.: Prednisoloni 0,0025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день

Преднизолоновая мазь (Венгрия, Польша) Unguentum Prednisolonum	Мз. (оф.)
---	-----------

Rp.: Ung. Prednisoloni 20,0
D. S. Намазывать тонким слоем на пораженные участки кожи и слизистых

Пресосил (Венгрия) Presocylum (Б)	1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: преднизолон — 0,00075, хлорохина фосфат — 0,04, ацетилсалициловая кислота — 0,2
--------------------------------------	--

Rp.: Tab. Presocyli N. 30
D. S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Синалар (Югославия)
Synalagum (Б)
(6 α ,9 α -дифтор-16 α -гидроокси-
преднизолон-16,17-ацетонид)

Мз. и Эм. — 0,025%.
Тубы 5,0, 10,0 и 30,0

Rp.: Ung. Synalari 0,025% 15,0

D. S. Смазывать пораженные участки кожи и слизистых

Синалар-Н (Югославия)
Synalagum-N (Б)

Мз. и Эм. (оф.) — содержат
0,025% синалара и 0,5% не-
омицина сульфата

Rp.: Emuls. Synalari-N 25,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи и сли-
зистых

Фторокорт (Венгрия)
Phthorocortum

Наружно. Мз. (оф.) — содержит
триамцинолон

Rp.: Phthorocorti 15,0

D. S. Намазывать без втирания на пораженные участки
кожи и слизистых (кроме глаз)

ПРЕПАРАТЫ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И ИХ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЗАМЕНИТЕЛИ

Димэстрол
Dimoestrolum (Б)

0,012. П.в. нр. м. р. Амп. 2 мл —
0,6%

Rp.: Sol. Dimoestrolis oleosae 0,6% 2 ml

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 2 мл внутримышечно 1 раз в неделю

Диэтилстильбэстрол
Diaethylstilboestrolum (Б), ФХ

0,001 (0,003). П. в. тр. м. р.
Тб. 0,001. Амп. 1 мл — 0,1 и
3% (3% р-р применяют только
для лечения больных со зло-
качественными новообразова-
ниями)

Rp.: Diaethylstilboestrolis 0,001

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 1 раз в день

Rp.: Sol. Diaethylstilboestrolis oleosae 0,1% 1 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день

Диэтилстильбэстрола пропионат Diaethylstilboestrolī propionas (Б), ФХ	0,005—1 раз в 3—4 дня. П. в. нр. м. р. Амп. 1 мл — 0,1 и 0,5%
--	--

Rp.: Sol. Diaethylstilboestrolī propionatis oleosae 0,5% 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в 3—4 дня

Метилэстрадиол Methyloestradiolum (Б) [17α-метилэстратриен-1,3,5-(10)- диол-3,17β]	0,00004. Тб. 0,00002 и 0,00005
---	---------------------------------------

Rp.: Tab. Methyloestradioli 0,00002
D. t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день под язык

Оксипрогестерона капронат Oxuprogesteroni capronas (Б) [17-капронат прегнин-4-ол-17α- 3,20-диона)	0,065—0,25 в неделю. П. в. нр. м. р. Амп. 1 мл — 6,5, 12,5 и 25%
--	---

Rp.: Sol. Oxuprogesteroni capronatis oleosae 12,5% 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в неделю

Октэстрол Octoestrolum (Б), ФХ	0,001. П. в. нр. Тб. 0,001
---	-----------------------------------

Rp.: Octoestrolī 0,001
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Прогестерон Progesteronum (Б), ФХ	0,025 (0,025). П. в. нр. м. р. Амп. 1 мл — 1 и 2,5%
--	--

Rp.: Sol. Progesteroni oleosae 2,5% 1 ml
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день

Сигетин Sygethinum (Б) [дикалиевая соль 3,4-ди-(пара- дисульфобензил)-гексана]	0,02—0,1. П. в. р. Пр. Р-ры. Тб. 0,05 и 0,1. Амп. 2,0—1%
---	---

Rp.: Sol. Sygethini 1% 2,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 2 мл внутримышечно

Rp.: Sygethini 0,05
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Синэстрол
Synoestrolum (Б), ФХ

Вн 0,002 (0,004). В/м 0,002
(0,003). В/м при злокачествен-
ных новообразованиях — 0,06
(0,1). П. в. нр. м. р. Тб. 0,001.
Амп. 1 мл — 0,1 и 2%

Rp.: Sol. Synoestrolis oleosae 0,1% 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день

Rp.: Synoestrolis 0,001
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 1 раз в день

Rp.: Sol. Synoestrolis oleosae 2% 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—2 мл внутримышечно 1 раз в день (при раке пред-
стательной железы)

Фолликулин (эстрон)
Folliculinum (Oestronum)

0,0001—0,001. П. в. нр. м. с. р.
Амп. 1 мл — 0,05 и 0,1%.
Фл. 30,0—0,01% (1 мг —
10 000 ЕД)

Rp.: Sol. Folliculini oleosae 0,1% 1 ml
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день

Rp.: Sol. Folliculini spirituosae 0,01% 30,0
D. S. Для втирания в кожу при обыкновенных и розовых
угрях

Эстрадиола монобензоат
Oestradioli monobenzoas (Б)

0,001—0,0015. П. в. нр. м. р.
Амп. 1 мл — 0,1% в масле

Rp.: Sol. Oestradioli monobenzoatis oleosae 0,1% 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—1½ мл внутримышечно 1 раз в 3—5 дней

Эстрадиола дипропионат
Oestradioli dipropionas (Б)

0,001. П. в. нр. м. р. Амп.
1 мл — 0,1% (активность
1 мл — 10 000 ЕД)

Rp.: Sol. Oestradioli dipropionatis oleosae 0,1% 1 ml
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в неделю

Этинилэстрадиол
Aethinyloestradiolum (Б), ФХ
(17α-этинил Δ^{1,3,5}-эстрадиен-
3,17β-диол)

Средние терапевтические дозы —
разовая 0,00001, суточная —
0,0002. П. в. нр. Тб. 0,00001
и 0,00005

Rp.: Aethinyloestradioli 0,00001
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Зарубежные препараты

Климактерин (Венгрия)
Climacterinum (Б)

1—2 држ. Држ. (оф.) — состав:
эстрадиола бензоат — 25 ЕД,
порошок из яичников — 0,03,
нитроглицерин — 0,0002, тео-
бромин и кофеин аа — 0,025,
фенолфталеин — 0,006, каль-
ция фосфат — 0,004

Rp.: Dragée Climacterini N. 50

D. S. По 1—2 драже 3 раза в день, не разжевывая

Микрофоллин (Венгрия)
Microfollinum (Б)

0,00001—0,00005. Тб. мите —
0,00001 и тб. форте — 0,00005

(соответствует отечественному
препарату этинилэстрадиолу)

Rp.: Tab. Microfollini mite N. 10

D. S. По 1 таблетке 1 раз в день

ПРЕПАРАТЫ МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И ИХ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЗАМЕНИТЕЛИ

Андростендиола дипропионат
Androstendioli dipropionas (Б)
[5-андростендиол-(3,17)-дипро-
пионат]

0,05—0,1. П. в. нр. Амп. 1 мл
5% раствора в масле

Rp.: Sol. Androstendioli dipropionatis 5% 1 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1—2 мл внутримышечно 1 раз в день или через день

Метилтестостерон
Methyltestosteronum (Б), ФХ

0,05 (0,1). П. в. м. нр. Тб.
0,005 и 0,01

Rp.: Methyltestosteroni 0,005

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке под язык 2—3 раза в день

Тестобромлецит
Testobromlecithum (Б)

1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: ме-
тилтестостерон — 0,005, бро-
мизовал — 0,1 и лецитин —
0,05

Rp.: Tab. Testobromlecithi N. 20

D. S. По 1—2 таблетки под язык до полного рассасывания
3 раза в день

Тестостерона пропионат Testosteroni propionas (Б), ФХ	0,05 (0,1). П. в. нр. м. р. Амп. 1 мл — 1 и 5%
--	---

Rp.: Sol. Testosteroni propionatis oleosae 1% 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 2 раза в неделю

Тестостерона фенилпропионат Testosteroni phenylpropionas (Б)	0,025. П. в. нр. м. р. Амп. 1 мл — 2,5% в масле
---	--

Rp.: Sol. Testosteroni phenylpropionatis oleosae 2,5% 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в неделю

Тестонат Testoenatum (Б)	0,1—0,2. П. в. нр. м. р. Комбинированный препарат, содержащий: тестостерона энантат — 80% и тестостерона пропионат — 20%. Амп. 1 мл 10 и 20% масляного раствора
-----------------------------	---

Rp.: Sol. Testoenati oleosae 10% 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—2 мл внутримышечно 1 раз в две недели

Зарубежные препараты

Сустанон-250 (Югославия) Sustanonum-250 (Б)	В/м — 1 мл. Амп. (оф.) — состав: в 1 мл масляного раствора содержится: тестостерона пропионат — 0,03, тестостерона фенилпропионат и тестостерона изокапроат аа — 0,06, тестостерона деканоат — 0,1
--	--

Rp.: Sustanoni-250 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. Внутримышечно по 1 мл

ПРЕПАРАТЫ СЕЛЕЗЕНКИ

Спленин Spleninum	1 мл. Ж. (оф.) — гормонального типа препарат из селезенки крупного рогатого скота. Амп. 1 мл
----------------------	--

Rp.: Splenini 1 ml
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ

Метандростенолон Methandrostenolonum (Б), ФХ (17 α -метил- Δ^4 -дегидротестостерон)	0,01 (0,05). П. в. нр. Тб. 0,001 и 0,005
---	--

Rp.: Methandrostenoloni 0,005
 D. t. N. 20 in tab.
 S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Метиландростендиол Methylandrostendiolum (Б), ФХ	0,025 (0,1). П. в. нр. Тб. 0,01 и 0,025
---	---

Rp.: Methylandrostendioli 0,025
 D. t. d. N. 10 in tab.
 S. По 1—2 таблетки в день под язык

Зарубежные препараты

Неробол (Венгрия) Nerobolum (Б) (соответствует отечественному препарату метандростенолону)	Тб. 0,005
---	------------------

Rp.: Tab. Neroboli 0,005
 D. t. d. N. 20
 S. По 1—2 таблетки 2 раза в день

Неробилил (Венгрия) Nerobililum (Б) (норандростенолон-фенилпропионат)	0,025—0,05. Амп. 1,0—2,5%
---	----------------------------------

Rp.: Sol. Nerobilili 2,5% 1,0
 D. t. d. N. 10 in amp.
 S. По 1—2 мл внутримышечно 1 раз в неделю

Ретаболил (Венгрия) Retabolilum (Б) (19-нор-4-андростен-17 β -ол-3он-17-деканат)	В/м 0,5—1 мл. Амп. 1 мл 5% раствора в масле
--	---

Rp.: Sol. Retabolili oleosae in amp. 5% 1 ml
 D. t. d. N. 10
 S. Внутримышечно по 0,5—1 мл 1—2 раза в день

ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Абомин
Abominum

0,2—0,6. П. в. р. (препарат, получаемый из сычугов телят и ягнят молочного возраста).
Тб. 0,2 — активность
50 000 ЕД

Rp.: Abomini 0,2

D. t. d. N. 50 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день во время еды (в тяжелых случаях до 3 таблеток на прием)

Ацидин-пепсин
Acidin-pepsinum

Тб. 0,25 и 0,5 (оф.) — содержат:
1 часть пепсина и 4 части хлоргидрата бетаина

Rp.: Acidin-pepsini 0,5

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день во время еды (таблетку предварительно растворить в небольшом количестве воды)

Гастрин
Gastrinum

0,4—0,8. Препарат из слизистой оболочки желудка свиней.
Тб. 0,4

Rp.: Gastrini 0,4

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день

Дезоксирибонуклеаза
Desoxyribonucleasa

П. в. р. Фл. 15 ЕА, 300 ЕА и 3000 ЕД (фермент, содержащийся в поджелудочной железе и слизистой оболочке кишечника)

Rp.: Desoxyribonucleasae 15 ЕД

D. t. d. N. 5

S. Содержимое одного флакона растворить в 5 мл 0,003% раствора сульфата магния; 1) по 3—4 капли в каждую ноздрю; 2) по 1—2 капли в конъюнктивальный мешок; 3) 3 мл для ингаляции в виде аэрозоля 2—3 раза в день

Желудочный сок натуральный
Succus gastricus naturalis

15,0. Фл. 100,0 и 150,0

Rp.: Succu gastrici naturalis 150,0

D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день во время еды

Инкрепан
Increpanum

0,5—0,75. Пр. Кпс. Тб. 0,25 (сухой экстракт из поджелудочной железы крупного рогатого скота)

Rp.: Increpani 0,5
D. t. d. N. 20 in caps. gelat.
S. По 1 капсуле 2—3 раза в день

Лидаза
Lydasum

0,1. П. в. р. Препарат из семян крупного рогатого скота. Содержит гиалуронидазу. Пр. в амп. 0,1

Rp.: Lydasi 0,1
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Содержимое 1 ампулы растворить в 1 мл 0,5% новокаина на одну подкожную инъекцию

Панкреатин
Pancreatinum

0,5—1,0. П. в. нр. Препарат из поджелудочных желез убойного скота. Тб. 0,5. Пр. Фл. 50,0

Rp.: Pancreatini 50,0
D. S. По $\frac{1}{4}$ чайной ложки 3 раза в день перед едой

Rp.: Pancreatini 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день перед едой

Пепсин
Pepsinum

0,2—0,5. П. в. нр. Р-ры. Мкс.

Rp.: Pepsini 2,0
Acidi hydrochlorici diluti 5,0
Aq. destill. 150,0
M. D. S. По 1 столовой ложке перед едой

Ронидаза
Ronidasum

П. в. нр. Препарат из семян крупного рогатого скота. Содержит гиалуронидазу. Пр. Фл. 5,0

Rp.: Ronidasi 5,0
D. S. Присыпка для ран

Трипсин кристаллический
Trypsinum crystallisatum, ФХ

0,005. П. в. р. Пр. во фл. 0,005

Rp.: Trypsini crystallisati 0,005

D. t. d. N. 6

S. Содержимое одного флакона растворить в 1—2 мл стерильного изотонического раствора хлорида натрия; для внутримышечного введения 1—2 раза в день

Фибринолизин
Fibrinolysinum

Суммарная доза в течение дня
15 000—30 000 ЕД. П. в. р.
Фл. 10 000, 20 000 и 30 000 ЕД
(фермент, образующийся при
активации содержащегося в
крови профибринолизина)

Rp.: Fibrinolysini 20 000 ЕД

D. t. d. N. 3

S. Для капельного внутривенного вливания; перед употреблением содержимое одного флакона растворить в 400 мл воды для инъекций (из расчета 50 ЕД на 1 мл) и добавить 10 000 ЕД гепарина

Химопсин
Chymopsinum

0,025—0,05. П. в. р. Пр. в фл. —
0,025, 0,05 и 0,1

Rp.: Chymopsini 0,025

D. t. d. N. 6

S. Содержимое одного флакона растворить в 10—50 мл 0,25% раствора новокаина; для смачивания повязок при лечении инфицированных ран (накладывать на 2 ч 2 раза в день)

α -Химотрипсин кристаллический
 α -Chymotrypsinum crystallisatum

0,005. П. в. р. Пр. в амп. 0,005

Rp.: α -Chymotrypsini crystallisati 0,005

D. t. d. N. 6

S. Содержимое одного флакона растворить в 1—2 мл воды для инъекций; для внутримышечного введения 1—2 раза в день

Хонсурид
Chonsuridum

0,05—0,1. П. в. р. Пр. — фл.
0,05 и 0,1 (препарат из гнали-
новых хрящей убойного скота)

Rp.: Chonsuridi 0,05

D. t. d. N. 6

S. Содержимое одного флакона растворить в 5 мл 0,5% раствора новокаина, тщательно взболтать, смочить двухслойную марлевую повязку и наложить на рану (смену повязок производить 1 раз в 2—3 дня)

Зарубежные препараты

Бетацид (Венгрия) Betacidum	1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: пепсин — 0,1, ацидол — 0,4
--------------------------------	--

Rp.: Tab. Betacidi N. 30

D. S. По 1—2 таблетки во время еды (таблетки предварительно растворить в $\frac{1}{2}$ стакана воды)

Мексаза (Югославия) Mexasum (Б)	1—2 држ. Држ. (оф.) — состав: бромелин — 0,05, панкреатин — 0,15, дегидрохолевая кислота — 0,025, йодхлоргидроксикинолин — 0,1, 4-7-феднатролин-5-6-хинон — 0,01
------------------------------------	--

Rp.: Dragée Mexasi N. 40

D. S. По 1—2 драже 3 раза в день после еды (длительное применение не рекомендуется)

ПРЕПАРАТЫ С АНТИФЕРМЕНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Аминокапроновая кислота Acidum aminocaproicum	3,0—5,0. П. в. р. Фл. 100,0 — 5%. Пр.
--	---------------------------------------

Rp.: Sol. Acidi aminocaproici 5% 100,0

D. S. На 1 внутривенное вливание капельным способом

Зарубежные препараты

Трасилол (контрикал) ** Trasylolum (Contricalum) (Б)	25 000—50 000 ЕД. Амп. (оф.) — 5 мл содержат 25 000 ЕД
---	--

Rp.: Trasyloli 5 ml

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 5—10 мл внутривенно (капельным способом) в изотоническом растворе глюкозы 1 раз в день

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИЙ¹

(ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЖЕЛЕЗО)

Бло — таблетки Tabullette Blandi	3—4 тб. Тб. (оф.). Содержат сернокислое закисное железо по 0,028
-------------------------------------	--

Rp.: Tab. Blandi N. 50

D. S. По 3—4 таблетки 3 раза в день во время еды

¹ См. также витамин В₁₂, фолиевая кислота, эрипоэтин, сироп алоэ с железом.

Бло с мышьяком — таблетки Tabulettae Blandi cum Acido arsenicoso	1 тб. Тб. (оф.). Состав: серно- кислое закисное железо — 0,028, мышьяковистый ангид- рид — 0,001
--	---

Rp.: Tab. Blandi cum Acido arsenicoso N. 50
D. S. По 1 таблетке 3 раза в день во время еды

Гематоген детский в плитках Haematogenum	(Оф.). Содержит 5% сухой крови. Плитка — 50,0
---	--

Гематоген детский с витами- ном С в плитках Haematogenum cum Acido as- corbinico	(Оф.). Состав: сухая кровь — 5%, аскорбиновая кислота — 0,16%, сахар, патока, мед, сгущенное молоко. Плитка — 50,0
---	--

Гематоген жидкий Haematogenum fluidum	15,0. Фл. 250,0
--	-----------------

Rp.: Haematogeni fluidi 250,0
D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Гематоген сухой Haematogenum siccum	0,5—1,0
--	---------

Rp.: Haematogeni sicci 1,0
D. t. d. N. 20 in charta cerata
S. По 1 порошку 3 раза в день во время еды

Гемостимулин Haemostimulinum	0,6. Пр. Тб. 0,3 и 0,6. Состав: гематоген сухой — 25%, же- леза лактат — 50%, меди суль- фат — 1%, глюкоза — 20%
---------------------------------	---

Rp.: Haemostimulini 0,6
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день во время еды

Железа закисного сульфат Ferri sulfas oxydulatum	1,0. П. в. р. Пр. Кпс. Тб. 0,25
---	---------------------------------

Rp.: Ferri sulfatis oxydulati 0,5
D. t. d. N. 20 in caps. gelat.
S. По 1—2 капсулы 3—4 раза в день после еды

Железа лактат Ferri lactas	1,0. П. в. тр. Пр. Пл. Кпс. Тб. 0,25
-------------------------------	---

Rp.: Ferri lactatis 1,0
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день после еды

Rp.: Ferri lactatis 0,25 D. t. d. N. 40 in tab. S. По 3—4 таблетки 3 раза в день после еды	
Железо восстановленное Ferrum reductum, ФХ	1,0. П. в. нр. Кпс. Пл. Тб. 0,2
Rp.: Ferri reducti 1,0 D. t. d. N. 20 in caps. gelat. S. По 1 капсуле 3 раза в день после еды	
Rp.: Ferri reducti 24,0 Pulv. et extr. rad. Taraxaci q. s. M. f. pilulae N. 60 D. S. По 2 пилюли 3 раза в день после еды	
Железо углекислое закисное с сахаром Ferri carbonas oxydulatum saccharatum	0,3—0,5. П. в. нр. Пр. Кпс.
Rp.: Ferri carbonatis oxydulati saccharati 0,5 D. t. d. N. 20 S. По 1 порошку 3 раза в день после еды	
Железо яблочнокислое — на- стойка Tinctura Ferri pomati	5,0—15,0. Ж. (оф.) — состав: яблочнокислое железо — 10%, спиртовая вода плодов кори- андра — 90%
Rp.: T-rae Ferri pomati 150,0 D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день после еды	
Каферид Caferridum (Б)	1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: окись железа и порошок цвет- ков календулы — аа 0,1
Rp.: Tab. Caferridi N. 30 D. S. По 2 таблетки 3 раза в день после еды	
Ферковен для инъекций Fercovenum pro injectionibus	2—5 мл. Ж. (оф.) — 1 мл содер- жит: 0,02 железа и 0,00009 кобальта. Амп. 5 мл
Rp.: Fercoveni pro injectionibus 5 ml D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1—2 мл внутривенно 1 раз в день	
Феррогематоген Ferrohaematogenum	2—3 тб. Тб. (оф.) — состав: су- хой гематоген — 83%, железо восстановленное — 12%
Rp.: Tab. Ferrohaematogeni N. 50 D. S. По 2—3 таблетки 3 раза в день во время еды	

Феррокаль
Ferrocalum

2—6 тб. Тб. (оф.) — состав: железа закисного сульфат — 0,2, кальций фруктозодифосфат — 0,1, лецитин-церебро — 0,02

Rp.: Tab. Ferrocali N. 40

D. S. По 2—6 таблеток 3 раза в день после еды (проглотить, не разжевывая)

Ферроцерон
Ferroceronum

0,3. П. в. р. Тб. 0,3

(натриевая соль карбоксибензоил-ферроцена)

Rp.: Tab. Ferroceroni 0,3

D. t. d. N. 50

S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды

Зарубежные препараты

Феррум лек (Югославия)
Ferrum Lec

Индивидуально. Ампл. 2 мл для в/м введения, в которых содержится по 0,1 полиизомальтозы железа и ампл. 5 мл для в/в введения с содержанием 0,1 сахара железа

Rp.: Ferri Lec 2 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 2 мл внутримышечно 1 раз в день, постепенно увеличивая дозу в зависимости от эффекта

Rp.: Ferri Lec 5 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 5 мл внутривенно 1 раз в день; в зависимости от эффекта дозу можно увеличить

СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЛЕЙКОПОЭЗ

Лейкоген
Leucogenum (Б)

0,02. П. в. тр. Тб. 0,02. Пр.

Rp.: Leucogeni 0,02

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Метилурацил
Methyluracilum (Б)

1,0. П. в. тр. Тб. 0,5. Мз. 3 и 10%

Rp.: Methyluracili 0,5

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 2 таблетки 3—4 раза в день

Rp.: Ung. Methyluracili 5% 20,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Натрия нуклеинат 0,1—0,5. П. в. р. Пр. Р-ры
Natrii nucleinas

Rp.: Natrii nucleinatis 0,1
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3—4 раза в день

Rp.: Sol. Natrii nucleinatis 2% 20,0
Sterilisetur!
D. S. По 5 мл 1—2 раза в день внутримышечно

Пентоксил 0,2—0,3. П. в. тр. Тб. 0,2. Пр.
Pentoxylum (Б)

Rp.: Pentoxyli 0,2
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день

Эрипоэтин 15,0. Ж. (оф.) — препарат, по-
лученный из передней доли
гипофиза крупного рогатого
скота и свиней
Erypoethinum

Rp.: Erypoethini 250,0
D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ (АНТИБЛАСТОМНЫЕ СРЕДСТВА)

АНТИМЕТАБОЛИТЫ

Меркаптопурин 0,2 (0,3). П. в. тр. Тб. 0,05
Mercaptopurinum (А), ФХ

Rp.: Mercaptopurini 0,05
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Фторафур 1,2—2,0. П. в. р. Ам. 10,0—4%
Phthorafurum (А)

Rp.: Sol. Phthorafuri 4% 10,0
D. t. d. N. 15 in amp.
S. По 30 мл (3 ампулы) внутривенно 1 раз в день

Фторурацил
Phthoruracilum (A)

15 мг/кг, но не более 1 г в сутки.
П. в. тр. Ам. 5,0—5%

Rp.: Sol. Phthoruracili 5% 5,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S.: 1) для капельного внутривенного вливания по 2—3 ампулы в 500 мл 5% раствора глюкозы через день; 2) для одномоментного внутривенного вливания ежедневно по 1—2 ампулы в 20 мл 5% раствора глюкозы

АНТИМИТОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Радиоактивные изотопы

Радиоактивный йод (I^{131})
Solutio Natrii o-iodhippuratis
Iodo-131 notati pro injectioni-
bus, ФХ

Индивидуально, на курс лечения
6—10 мС. Получают по осо-
бому заказу

Радиоактивный фосфор (P^{32})
Solutio Natrii phosphatis
Phosphoro-32 notati pro injectio-
nibus, ФХ

Назначается по 1,5—2 мС внутрь
в 20—100 мл 10—20% раство-
ра глюкозы. Получают по осо-
бому заказу

Синтетические антимитотические средства

БензоТЭФ
Benzotephum (A)
(N-бензоил-N, N', N'', N'', диэти-
лен-триамид фосфорной кис-
лоты)

0,024—3 раза в неделю В/в. Пр
в ам. 0,024

Rp.: Benzotephi 0,024

D. t. d. N. 3 in amp.

S. По 1 ампуле 3 раза в неделю внутривенно (непосредственно перед употреблением растворить в 2 мл воды для инъекций; при плохой переносимости увеличить интервалы между введениями на 1—2 дня)

Дипин
Dipinum (A)
(1,4-ди [N, N'-(диэтилен)-фосфа-
мид] пиперазин)

0,005—0,01. На курс лечения
до 0,2. П. в. р. Тб. 0,02 и 0,04
(стерильные)

Rp.: Tab. Dipini 0,02

D. t. d. N. 5 in amp.

S. Содержимое 1 ампулы растворить в 4 мл воды для инъекций; внутривенно по 1 мл (в зависимости от картины крови доза может быть увеличена до 3 мл в день)

Допан
Dopanium (A)
[4-метил-5-ди (2-хлорэтил) ами-
ноурацил]

0,008—0,014. П. в. нр. Тб. 0,002.
Пр.

Rp.: Dopani 0,01
Sacchari 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 3
S. По 1 порошку каждые 5—6 дней на ночь, запивать
киселем

Rp.: Dopani 0,002
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 2 таблетки каждые 5—6 дней на ночь, запивать
киселем

Имифос
Imiphosum (A)
(диэтиленимид 2-метил-тиазоли-
до-3-фосфорной кислоты)

0,05. П. в. р. Пр. во фл. — 0,05

Rp. Imiphosi 0,05
D. t. d. N. 5
S. Содержимое 1 флакона растворить в 10—20 мл изото-
нического раствора хлорида натрия; для 1 внутривенной
инъекции через день (вводить медленно!)

Миселосан
Myelosanum (A), ФХ

0,006 (0,01). П. в. нр. Тб. 0,002

Rp.: Myelosani 0,002
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день, постепенно увеличивая
дозу до 5 таблеток в день

Новэмбитол
Novembitolum (A)
[орто-ксилил-ди-(2-хлорэтил)-
амин гидрохлорид]

0,045. П. в. р. Пр. во фл. —
0,045

Rp.: Novembitoli 0,045
D. t. d. N. 5
S. Содержимое 1 флакона растворить в 20 мл воды для инъек-
ций; для 1 внутривенной инъекции (медленно!) через
день

Новэмбихин
Novembichinum (A), ФХ

Высшая доза В/в 0,01 (10 мг) —
1 раз в 2 дня. Пр. 0,01 в 10-
миллилитровых запаянных ам-
пулах

Rp.: Novembichini 0,01

D. t. d. N. 6 in amp.

S. Растворить содержимое 1 ампулы в 10 мл стерильного
рингеровского раствора. Набрать в шприц (емкостью
20 мл) столько мл полученного раствора, сколько мг
препарата требуется на введение, добрать в шприц
рингеровского раствора до 20 мл. Вводить внутривенно
1 раз в 2—3 дня

Сарколизин
Sarcolysinum (A), ФХ

Высшая доза 0,05 один раз в 7
дней. П. в. р. Тб. 0,01. Пр. во
фл. 0,02 и 0,04

[D, 1-α-амино-β-п-ди-(β-хлор-
этил) аминофенил-пропионо-
вой кислоты гидрохлорид]

Rp.: Sarcolysini 0,02

D. t. d. N. 3 in amp.

S. Растворить содержимое 1 флакона в 10—20 мл воды для
инъекций; вводить в плевральную полость и внутри-
брюшинно 1 раз в неделю

Rp.: Sarcolysini 0,01

D. t. d. N. 6 in tab.

S. По 2 таблетки 1 раз в неделю

Спиразидин

0,01—0,03. П. в. р. Пр. во фл.
0,03

Spirazidinum (A)

(N, N³-β-β-дихлорэтил-N, N²-
диспиротрипиперазиния ди-
хлорид)

Rp.: Spirazidini 0,03

D. t. d. N. 5

S. Содержимое 1 флакона растворить в 15 мл воды для
инъекций; для 1 внутривенной инъекции (медленно!)
через день

Тиофосфамид (тиоТЭФ)

0,01—0,02 три раза в неделю. П.
в. р. Тб. 0,01 и 0,02 в стериль-
ных флаконах

Thiophosphamidum (Thiotepum),
(A), ФХ

Rp.: Tab. Thiophosphamidi 0,01

D. t. d. N. 6

S. Содержимое 1 флакона растворить в 4 мл воды для
инъекций: вводить внутримышечно, подкожно или внут-
ривенно через день (дозировка строго индивидуальна
в зависимости от эффективности лечения — на курсе
лечения 150—300 мг)

Третамин
Tretaminum (A)
(2, 4, 6-триэтилен-амино-1, 3, 5-
триазин)

0,001—0,002. П. в. р. Пр. во
фл. 0,001 и 0,002

Rp.: Tretamini 0,002
D. t. d. N. 3
S. Содержимое 1 флакона растворить в 5 мл воды для инъек-
ций; для 1 внутримышечной инъекции 1 раз в 10 дней

Уретан
Urethanum

1,0—2,0. П. в. р. Пр.
Р-ры. Кпс.

Rp.: Urethani 0,5
D. t. d. N. 30 in caps. gelat.
S. По 2 капсулы 2—4 раза в день

Rp.: Urethani 12,0
Sirupi simplicis 30,0
Aq. destill. ad 180,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp.: Sol. Urethani 25% 20,0
Sterilisetur!
D. S. По 4 мл внутримышечно 3—4 раза в день

Rp.: Urethani 1,0
D. t. d. N. 6 in caps. gelat.
S. По 1 капсуле на ночь (снотворное)

Фторбензотепф
Phthorbenzothephum (A)

0,04. П. в. р. Пр. во фл. — 0,04

Rp.: Phthorbenzothephi 0,04
D. t. d. N. 10
S. Содержимое 1 флакона растворить в 1 мл 96° спирта
и затем добавить 19 мл стерильного изотонического рас-
твора хлорида натрия; для внутривенного введения 1 раз
через день

Хлорбутин (лейкеран)
Chlorbutinum (Leuceranum) (A),
ФХ

0,015 (0,015). П. в. р. Тб. 0,002
и 0,005

Rp.: Chlorbutini 0,005
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Циклофосфан
Cyclophosphanum (A), ФХ
[N, N-ди (2-хлорэтил)-N'-О-пропиленовый эфир диамида фосфорной кислоты гидрат]

0,3 (0,6). П. в. р. Тб. 0,05. Пр.
во фл. 0,1 и 0,2

Rp.: Cyclophosphani 0,2

D. t. d. N. 10

S. По 0,2 внутримышечно или внутривенно (непосредственно перед инъекцией развести содержимое флакона 10 мл воды для инъекций)

Rp.: Cyclophosphani 0,05

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1—2 таблетки 2 раза в день

Этимидин
Aethimidinum (A)

0,006. П. в. тр. Пр. в. амп. 0,006

Rp.: Aethimidini 0,006

D. t. d. N. 10 in amp.

S. Для внутривенного введения по 1 ампуле 3 раза в неделю. Для растворения в ампулу непосредственно перед употреблением вливают 20 мл стерильного изотонического раствора хлорида натрия

Алкалоиды, тормозящие митоз

Колхамин (омаин)
Colchaminum (Omainum) (A)

0,002—0,003. Тб. 0,002. Мз. —
0,5%

Rp.: Ung. Colchamini 0,5% 25,0

D. S. Смазывать поверхность опухоли и окружающую ткань (не более 1—1,5 г мази ежедневно)

Rp.: Colchamini 0,002

D. t. d. N. 10 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Гормональные препараты¹

Медротестерона пропионат
Medrotesteroni propionas (B)

0,05—0,1. П. в. нр. м. р
Амп. 1 мл — 5 и 10%

Rp.: Sol. Medrotesteroni propionatis 5% I ml

D. t. d. N. 30 in amp.

S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день

¹ См. также тестостерона пропионат.

Фосфэстрол
Phosphoestrolum (Б)
(дифосфорный эфир диэтил-
стильбэстрола)

0,125—0,25. П. в. р. Тб. 0,1.
Амп. 5,0—6% раствора тет-
ранатриевой соли фосфэс-
трола

Rp.: Phosphoestrolī 0,1
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Phosphoestrolī tetranitratis 10% 5,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 2,5 мл внутривенно 1 раз в день; при хорошей пере-
носимости — 5 мл 1 раз в день

Хлортианизен
Chlortrianisenum (Б), ФХ
(1,1,2-трианизил-2-хлорэтилен)

0,012 (0,048). П. в. тр. Тб. 0,012

Rp.: Chlortrianisenī 0,012
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Антибиотики, обладающие
антибластомным действием

Брунеомицин
Bruneomycinum (А)

Суточные дозы: Вн. 0,0004—
0,0006, В/в 0,0002—0,0004.
Фл. 0,0005. Кпс. 0,00005 и
0,0002

Rp.: Caps. Bruneomycinī 0,0002
D. t. d. N. 20
S. По 1 капсуле 2—3 раза в день

Rp.: Bruneomycinī 0,0005
D. t. d. N. 4
S. Содержимое 1 флакона растворить в 5—10 мл воды для
инъекций; для внутривенных вливаний через каждые
48 ч

Оливомицин
Olivomycinum (Б)

0,002—0,005. П. в. р. Пр. во
фл. 0,005 и 0,01

Rp.: Olivomycinī 0,005
D. t. d. N. 6
S. Содержимое 1 флакона растворить в 5 мл воды для инъек-
ций; для 1 внутривенного введения 1 раз в день по 2—
3 мл; при хорошей переносимости — до 5 мл

Рубомицина гидрохлорид
Rubomycini hydrochloridum (Б)

0,0005—0,0008 на 1 кг веса.
Пр. фл. — 0,02 и 0,04

Rp.: Rubomycini hydrochloridi 0,04

D. t. d. N. 10

S. Содержимое 1 флакона растворить в 10 мл воды для инъекций; для внутривенного введения 1 раз в день по 8—10 мл

Хризомаллин
Chrysomallinum (А)

0,0005—0,001. П. в. тр. Пр. во
фл. — 0,0005 и 0,001

Rp.: Chrysomallini 0,0005

D. t. d. N. 5

S. Содержимое 1 флакона растворить в 0,5 мл этилового спирта, добавить 8—10 мл изотонического раствора натрия хлорида, профильтровать; для 1 внутривенного введения (медленно!) 1 раз в 3 дня

Зарубежные препараты

Винбластин (Венгрия)
Vinblastinum (А)

0,025—0,1 мг/кг. Амп. 0,005
сухого вещества; прилагается
растворитель (алкалоид, выде-
ленный из барвинка розового)

Rp.: Vinblastini 0,005

D. t. d. N. 25 in amp.

S. Растворить содержимое 1 ампулы в прилагаемом раство-
рителе. Вводить внутривенно 1 раз в неделю; первый раз
1/2 ампулы, постепенно дозу можно увеличить до 1 ам-
пулы

Винкристин (Венгрия)
Vincristinum (Б)

0,00005—0,00015 мг/кг. Пр. в
амп. — 0,001: прилагается
растворитель (алкалоид, вы-
деленный из барвинка розо-
вого)

Rp.: Vincristini 0,001

D. t. d. N. 10 in amp.

S. Растворить содержимое 1 ампулы в прилагаемом раство-
рителе; вводить внутривенно 1 раз в неделю (ребенку
весом 20 кг) в постепенно возрастающих дозах

Дегранол (Венгрия) Degranolum (A) [1,6-бис (β-хлорэтил-амино)- 1,6-дезоксид-маннит дихлор- гидрат]	0,05—0,1 через день. П. в. р. Пр. в ампл. — 0,05
---	---

Rp.: Degranoli 0,05
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Содержимое 1 ампулы растворить в 5 мл воды для инъек-
ций; для 1 внутривенной инъекции через день

Метотрексат (**) Methotrexatum (B) (4-амино-N ¹⁰ -метилптероил- глутаминовая кислота)	0,0025. Тб. 0,0025. Пр. в Ампл. 0,005
--	---------------------------------------

Rp.: Methotrexati 0,0025
D. t. d. N. 100 in caps.
S. По 1 капсуле 1—3 раза в день

Rp.: Methotrexati 0,005
D. t. d. N. 5 in amp.
S. Содержимое 1 ампулы растворить в прилагаемом раство-
рителе; для внутримышечного введения 1—2 раза в день

Миелобромол (Венгрия) Myelobromolum (B) (1,6-дибром-1,6-дидезокси-Д- маннит)	0,25. Тб. 0,25
--	----------------

Rp.: Myelobromoli 0,25
D. t. d. N. 100 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ
У БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

Круцин Crucinum	3000—6000 ЕД. П. в. р. Пр. в двухмиллилитровых ампл. по 3000 ЕД
---------------------------	---

Rp.: Crucini 3000 ЕД
D. t. d. N. 10 in amp.
S. Содержимое 1 ампулы растворить в 2 мл воды для инъек-
ций (внутримышечно 2—3 раза в день)

Неоцид
Neocidum (Б)

5,0—10,0. Ж. (оф.). Фл. 100,0

Рр.: Neocidi 100,0

D. S. По 1 чайной ложке 3 раза в день перед едой в течение 7 дней; далее по 2 чайные ложки 3 раза в день в течение 14 дней; после 7-дневного перерыва повторить курс лечения по той же схеме

Пеucedанин
Peucedaninum (Б)

0,01. Тб. 0,01. Мз. 0,5% (препараты из некоторых видов горечника)

Рр.: Peucedanini 0,01

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день (применять только совместно с тиофосфамидом)

Рр.: Ung. Peucedanini 0,5% 10,0

D. S. Для перевязок при изъязвленном раке молочной железы

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ ¹

Батилон
Batilolum (Б)

0,02. П. в. нр. Тб. 0,02

Рр.: Tab. Batiloli 0,02

D. t. d. N. 20

S. По 1 таблетке 2 раза в день с профилактической целью; по 1 таблетке 3—4 раза в день при лечении лучевой болезни

Мексамин
Mexaminum (Б)

0,05—1,0. П. в. р. Тб. 0,05

(5-метокситриптамина гидро-
хлорид)

Рр.: Mexamini 0,05

D. t. d. N. 10 in tab.

S. По 1—2 таблетки за 30—40 мин до облучения

¹ См. также алоэ-эмульсия, каферид, облепиховое масло.

Меркамина аскорбинат Mercamini ascorbas (Б)	0,02. П. в. р. Амп. 2,0—10%
--	-----------------------------

Rp.: Sol. Mercamini ascorbatis 10% 2,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 2 мл внутривенно за 10—20 мин до облучения

Меркамина гидрохлорид Mercamini hydrochloridum (Б) (β-меркаптоэтиламина гидро- хлорид)	0,1—0,2. П. в. р. Амп. 2,0—10%
---	--------------------------------

Rp.: Sol. Mercamini hydrochloridi 10% 2,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. 1) 1—2 мл внутривенно за 30 мин до облучения (вводить медленно!); 2) по 1—2 мл внутривенно каждые 5—7 дней (при развившихся явлениях лучевой болезни)

Тезан — эмульсия Emulsum Thesani	Эм. (оф.) — состав: тезан — 0,2%, эмульгатор и касторовое масло — аа 10%, вода — 79,8%
-------------------------------------	---

Rp.: Emulsi Thesani 30,0
D. S. Для профилактики и лечения повреждений кожи при лучевой терапии, язвах, ожогах, пролежнях

Цистамина дигидрохлорид Cystamini dihydrochloridum (Б) [дигидрохлорид бис-(β-амино- этил) дисульфида]	0,6—0,8. П. в. р. Тб. 0,2 и 0,4
--	---------------------------------

Rp.: Cystamini dihydrochloridi 0,2
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 3 таблетки через день при облучении

ГИПОХОЛЕСТЕРИНЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Бета-ситостерин Beta-sitosterinum	3,0. П. в. нр. Пр. (стерин, полу- чаемый из отходов бумажной промышленности)
--------------------------------------	--

Rp.: Beta-sitosterini 3,0
D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 3 раза в день во время еды

Диоскорея кавказская <i>Dioscorea caucasica</i> (Б)	0,02—0,2. Тб. 0,02 (содержит сумму водорастворимых сапонинов корневища диоскореи кавказской)
--	--

Rp.: Tab. Dioscoreae caucasicae 0,02
D. t. d. N. 30
S. По 1—5 таблеток 2 раза в день после еды

Диоспонин <i>Diosponinum</i> (Б)	0,05—0,1. П. в. р. Тб. 0,1 (очищенный экстракт из корней и корневища диоскореи кавказской)
-------------------------------------	--

Rp.: Diosponini 0,1
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 2 раза в день в течение 10 дней; перерыв — 3—4 дня и повторение курса (общий курс — 3—4 месяца)

Линетол <i>Linaetholum</i>	20 мл. ГЖ (оф.) — смесь этиловых эфиров жирных кислот льняного масла — ненасыщенных 89—91% и насыщенных 9—11%. Фл. 100,0, 150,0, 200,0
-------------------------------	--

Rp.: Linaetholi 200,0
D. S. По 1 столовой ложке 1 раз в день натощак утром в течение месяца

Липоевая кислота <i>Acidum lipoicum</i>	0,025. П. в. нр. Пр. Тб. 0,025
--	--------------------------------

Rp.: Acidi Lipoici 0,025
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 1 таблетке 2—4 раза в день после еды. Курс лечения: при атеросклерозе — 20 дней; при хронических гепатитах и циррозе печени — 25—30 дней; при диабетическом полиневрите — 30 дней

Цетамифен <i>Cetamiphenum</i> (аминоэтаноловая соль фенол-этилуксусной кислоты)	0,5. П. в. р. Тб. 0,25
---	------------------------

Rp.: Cetamipheni 0,25
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 2 таблетки 2—4 раза в день в течение 1—2 месяцев

Зарубежные препараты

Мисклерон (Венгрия) Miscleronum [Этил- α -(пара-хлорфенокси)- изобутират]	0,25—0,75. Кпс. 0,25
---	-----------------------------

Rp.: Miscleroni in caps. á 0,25 N. 50
 D. S. По 2—3 капсулы 3 раза в день после еды

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ

АНТИКОАГУЛЯНТЫ

Гепарин Heparinum	5 000—20 000 ЕД. Ж. (оф.). Фл. 5,0. (активность 1 мл — 5000, 10 000 и 20 000 ЕД)
------------------------------------	---

Rp.: Heparini 5,0 (á 10 000 ЕД)
 D. S. По 1 мл внутримышечно 2 раза в день

Дикумарин Dicumarinum (A), ФХ	0,1 (0,3). П. в. нр. Пр. Тб. 0,005 и 0,01
--	--

Rp.: Dicumarini 0,05
 Sacchari 0,2
 M. f. pulv. D. t. d. N. 20
 S. По 1 порошку 3—4 раза в день

Неодикумарин Neodicumarinum (A), ФХ	0,3 (0,9). П. в. нр. Тб. 0,1 и 0,2. Пр.
--	--

Rp.: Neodicumarini 0,1
 D. t. d. N. 30 in tab.
 S. По 2 таблетки 3 раза в день, постепенно уменьшая дозу
 до 1—2 таблеток в день

Омефин Omerphinum (A) (2-оксиметил-2-фенилиндан-1,3- дион)	0,05. П. в. нр. Тб. 0,05
---	---------------------------------

Rp.: Omerphini 0,05
 D. t. d. N. 20 in tab.
 S. По 1 таблетке 3—4 раза в день, постепенно снижая
 дозу до 1—2 таблеток в день

Пелентанетты — таблетки пелентана с покрывочным слоем Tabulettae Pelentanettae (A)	1—2 таб. Тб. (оф.) — состав: 0,075 пелентана в одной таблетке
---	---

Rp.: Tab. Pelentanettae N. 100
D. S. Для поддерживающей терапии при лечении пелентаном — по 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Фенилин Phenylum (A), ФХ	0,05 (0,2). П. в. тр. Тб. 0,02 и 0,03. Пр.
---	--

Rp.: Phenylini 0,03
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день, постепенно снижая дозу до 1—2 таблеток в день

Фепромарон Phepromaronum (A) [3-(α -фенил- β -пропионилэтил) - 4-оксикумарин]	0,03—0,05. П. в. нр. Тб. 0,005 и 0,01
---	---

Rp.: Tab. Phepromaroni 0,01
D. t. d. N. 30
S. По 1 таблетке 3—5 раз в день, постепенно снижая дозу до 1 таблетки в день

Зарубежные препараты

Гепариновая мазь (Венгрия) Unguentum heparini	Мз. (оф.) — состав: гепарин — 2500 ЕД, никотиновой кислоты гидрохлорид — 0,0625, мазевая основа до 25,0. Тубы 25,0
--	---

Rp.: Ung. heparini 25,0
D. S. Смазывать пораженные участки кожи по 0,5—1 г 2 раза в день

Пелентан (Чехословакия) Pelentanum (A) (соответствует отечественному препарату неодикумарину)	Доза строго индивидуальна. Тб. (оф.)
---	---

Rp.: Tab. Pelentani N. 30
D. S. Индивидуально:

Примерная схема

1-й день	1 табл. — 3 раза в день
2-й »	1 » — 3 » » »
3-й »	1 » — 2 » » »
4-й »	1 » — 2 » » »
5-й »	$1\frac{1}{2}$ » — 2 » » »

6-й и дальше по $1\frac{1}{2}$ таблетки 1—2 раза в день в зависимости от уровня протромбина

Синкумар (Венгрия)
Syncumarum (A)
(3-[α (-4-нитрофенил)- β -ацетил-
этил]-4-оксикумарин)

0,001—0,008. Тб. 0,002 и 0,004

Rp.: Syncumari 0,004

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день, ежедневно уменьшая дозу до $\frac{1}{4}$ —1 таблетки в день (в зависимости от исходного индекса протромбина)

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ¹

Арника горная — цветки
Flores Arnicae montanae

Настойка 5—10 кпл. Инф.
1 : 20. Сб.

Rp.: Inf. flor. Arnicae montanae 10,0—200,0

D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день после еды

Rp.: T-rae Arnicae 25,0

D. S. По 5—10 капель 3 раза в день после еды

Rp.: T-rae Arnicae 50,0

D. S. По 2 чайные ложки на стакан кипяченой воды для примочек

Викасол
Vikasolum (Б). ФХ

В/м 0,015 (0,03). Вн. 0,03
(0,06) П. в. р. Тб. 0,015. Амп.
1,0 — 1% и 5,0—0,3%

Rp.: Sol. Vikasoli 0,3% 5,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 2—3 мл внутримышечно 1 раз в день

Rp.: Vikasoli 0,01

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Желатин медицинский
Gelatina medicinale, ФХ

Амп. 10,0 25,0 и 50,0—10%

Rp.: Sol. Gelatinae medicin. 10% 50,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. 1) по 10—50 мл подкожно; 2) по 6—10 мл внутривенно (перед введением подогреть до температуры тела)

¹ См. также барбарис амурский, водяной перец, изоверин, калина, крапива, пастушья сумка, кальция хлорид, кальция глюконат, аминокaproновая кислота.

Желатиноль
Gelatinolum

250—2000 *мл.* Ж. (оф.) —
коллоидный 8% раствор час-
тично-расщепленной пищевой
желатины. Фл. 250 *мл*

Rp.: Gelatinoli 250 *ml*

D. t. d. N. 5

S. По 250 *мл* внутривенно; в зависимости от состояния боль-
ного дозу можно увеличить до 2 л однократно

Лагохилен
Lagochilenum

В/в и В/м 25—50 *мл.* Ж. (оф.) —
неогаленовый препарат из
лагохилуса опьяняющего.
Амп. 10 и 25 *мл*

Rp.: Lagochileni 25 *ml*

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 25 *мл* внутримышечно 2—3 раза в сутки

Лагохилус опьяняющий — цвет-
ки и лист
Flores et folium Lagochilus
inebrians

Настойка 5,0. Инф. 1 : 10. Тб.
0,2 и 0,4

Rp.: Inf. flor. et fol. Lagochilus 20,0—200,0

D. S. По 1—2 столовые ложки 3—6 раз в день

Rp.: T-rae Lagochilus 100,0

D. S. По 1 чайной ложке 3 раза в день

Натрия хлорид
Natrii chloridum, ФХ

1,0—2,0. П. в. р. Амп. 10,0—
10%. Тб. 0,85

Rp.: Sol. Natrii chloridi 10% 10,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 10—20 *мл* внутривенно

Тромбин сухой
Trombinum siccum

П. (сухая плазма). Пр. в амп. —
0,001 (только для местного
применения — остановка ка-
пиллярных кровотечений)

Rp.: Trombini sicci 0,001

D. t. d. N. 6 in amp.

S. Растворить содержимое 1 ампулы в 15 *мл* стерильного
изотонического раствора натрия хлорида; для смачива-
ния тампонов при кровотечениях

Тысячелистник — трава
Herba Millefolii

Инф. 1 : 10. Жидкий экстракт
20—40 кпл.

Rp.: Inf. herbae Millefolii 20,0—200,0
D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp.: Extr. Millefolii fluidi 30,0
D. S. По 20—40 капель 3 раза в день перед едой

Фибриноген
Fibrinogenum

1,0—8,0. Фл. 250,0—(0,9—1,0
препарата) и 500,0—(1,8—2,0
препарата)

Rp.: Fibrinogeni 500,0
D. t. d. N. 2
S. Для остановки паренхиматозных кровотечений по 500—
1000 мл внутривенно капельным способом

Зарубежные препараты

Гемофобин (ГДР)
Haemophobinum

П/к 1—2 мл. Вн 15,0. Ж.
(оф.). Фл. 150,0 и 20,0. Амп.
1 мл (основным действующим
веществом является пектин)

Rp.: Haemophobini 150,0
D. S. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Rp.: Haemophobini 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—2 мл подкожно 1—3 раза в день

Rp.: Haemophobini 20,0
D. S. Для смачивания тампонов при паренхиматозных
кровотечениях

Протамин сульфат (Югославия)
Protamini sulfas

5—10 мл. Амп. 5,0—1%

Rp.: Sol. Protamini sulfatis 1% 5,0
D. t. d. N. 5 in amp.
S. Внутривенно по 5 мл. В зависимости от тяжести за-
болевания инъекцию можно повторить через несколько
минут один или два раза

СОЛИ КАЛЬЦИЯ¹

Кальция глюконат
Calcii gluconas, ФХ

Для инъекций 0,5—1,0. Вн
2,0—5,0. П. в. р. Тб. 0,5. Амп.
10,0—10%. Пр.

Rp.: Calcii gluconatis 50,0

D. S. По 1 чайной ложке 2—3 раза в день перед едой

Rp.: Sol. Calcii gluconatis 10% 10,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 5—10 мл внутримышечно (внутривенно) один раз
в день

Кальция лактат
Calcii lactas, ФХ

0,5—1,0. П. в. р. Пр. Р-ры

Rp.: Calcii lactatis 1,0

D. t. d. N. 20

S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Rp.: Calcii lactatis 10,0

Aq. destill. ad 150,0

M. D. S. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Кальция хлорид
Calcii chloridum, ФХ

1,0—1,5. П. в. р. Амп. 5,0 и
10,0—10%

Rp.: Sol. Calcii chloridi 10% 10,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 10 мл внутривенно

Rp.: Calcii chloridi 10,0

Aq. destill. ad 150,0

M. D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Оссокальциноль
Ossocalcinolum

0,2—0,25. Суспензия (оф.) —
15% стерильная суспензия
костного порошка в перси-
ковом масле. Амп. 2,5 мл

Rp.: Ossocalcinoli 2,5 ml

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 0,2 мл внутримышечно 1 раз в день, постепенно повы-
шая дозу до 2 мл

¹ См. также кальция глицерофосфат, кальция карбонат осажден-
ный.

ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ФОСФОР

Аденозинтрифосфат-натриевая соль (АТФ) <i>Natrii adenosintriphosphas</i>	0,01. Ампл. 1,0—1%
---	--------------------

Rp.: Sol. *Natrii adenosintriphosphatis* 1% 1,0
 D. t. d. N. 6 in amp.
 S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Аденозинтрифосфорная кислота-динатриевая соль <i>Dinatrii adenosintriphosphas</i>	0,01—0,02. П. в. р. Ампл. 1,0—1%
--	----------------------------------

Rp.: Sol. *Dinatrii adenosintriphosphatis* 1% 1,0
 D. t. d. N. 10 in amp.
 S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Аденозинтрифосфорная кислота — монокальциевая соль в глицерине <i>Calcii adenosintriphosphas in Glycerino</i>	0,03. П. в. р. Ампл. 1,0—3%
--	-----------------------------

Rp.: Sol. *Calcii adenosintriphosphatis in Glycerino* 10% 0,3
 D. t. d. N. 5 in amp.
 S. По 0,3 мл внутримышечно 1 раз в день (перед употреблением ампулу согреть и разбавить 1 мл воды для инъекций)

Гефифитин <i>Hefaephytinum</i>	2—3 тб. Тб. (оф.) — состав: фитин — 0,125, сухие дрож- жи — 0,375
-----------------------------------	---

Rp.: Tab. *Hefaephytini* N. 50
 D. S. По 2—3 таблетки 3 раза в день

Глицерофосфат <i>Glycerophosphatum</i>	0,5—1,0. Гранулы
---	------------------

Rp.: *Glycerophosphati* 100,0
 D. S. По $\frac{1}{4}$ чайной ложки 3 раза в день

Глицерофосфен <i>Glycerophosphenum</i>	0,25—0,5. П. в. р. Тб. 0,2
---	----------------------------

Rp.: Tab. *Glycerophospheni* N. 20
 D. S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Кальция глицерофосфат 0,25—0,5. П. в. р. Тб. 0,25 и 0,5
Calcii glycerophosphas

Rp.: Calcii glycerophosphatis 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Липоцеребрин 0,5—1,0. Тб. 0,5 (препарат липо-
Lipocerebrinum идов мозга крупного убойного
скота)

Rp.: Lipocerebrini 0,5
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день

Фитин 0,25—0,5. П. в. нр. Тб. 0,25. Пл.
Phytinum, ФХ

Rp.: Phytini 0,25
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Rp.: Phytini 7,5
Pulv. et extr. rad. Taraxaci q. s.
M. f. pilulae N. 30
D. S. По 1—2 пилюли 3 раза в день

Фитоферролактол 1—2 тб. Тб. (оф.) — состав:
Phytoferrolactolum фитин и лактат железа — аа
0,2

Rp.: Tab. Phytoferrolactoli N. 30
D. S. По 1 таблетке 3 раза в день

Фосфрен 1—2 држ. Држ. (оф.) — состав:
Phosphrenum фосфат кальция — 0,07, лак-
тат железа и лецитин — аа
0,05, кровь сухая — 0,01

Rp.: Dragée Phosphreni N. 25
D. S. По 1—2 драже 3 раза в день

Церебро-лецитин 3—6 држ. Држ. 0,05
Cerebro-lecithinum

Rp.: Dragée Cerebro-lecithini 0,05
D. t. d. N. 40
S. По 3—6 драже 3 раза в день

Зарубежные препараты

Фосфобион (Румыния) 0,01—0,02. Ж. (оф.). Амп. 1 мл
Phosphobionum
(соответствует отечественному
препарату аденозинтрифосфа-
ту натрия)

Rp.: Phosphobioni in amp. á 1 ml
D. t. d. N. 30
S. По 1—2 мл внутримышечно 1 раз в день

ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЙОД

Антиструмин 1—2 тб. Тб. (оф.) содержат
Antistrumium йодистый калий — 0,001

Rp.: Tab. Antistrumini N. 20
D. S. По 1 таблетке 1 раз в неделю (для предупреждения
развития эндемического зоба); по 1—2 таблетки
2—3 раза в неделю (при диффузных формах зоба)

Йод 0,02 (0,06). П. в. тр. с. р.
Iodum (Б), ФХ (хорошо растворим в водных
растворах йодидов). Р-ры. Пл.
Амп. 1,0—5%

Rp.: Iodi 0,05
Kalii iodidi 0,1
Aq. destill. 50,0
M. D. S. По 5—10 капель 2—3 раза в день с молоком после
еды

Rp.: Iodi 0,015
Phenobarbitali
Kalii iodidi aa 0,15
Bromcamphorae 3,0
Pulv. et extr. rad. Taraxaci q. s.
M. f. pilulae N. 30
D. S. По 1 пилюле 2 раза в день после еды

Rp.: Sol. Iodi spirituosae 5% 10,0
D. S. Для смазывания ссадин, порезов

Калия йодид 0,3—1,0. П. в. р. Р-ры. Тб. 0,001
Kalii iodidum, ФХ

Rp.: Kalii iodidi 16,0
Aq. destill. 180,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Натрия йодид
Natrii iodidum, ФХ

0,3—1,0. П. в. р. Р-ры. Амп.
10,0—10%

Rp.: Natrii iodidi 6,0
Aq. destill. 180,0

М. D. S. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Раствор йода спиртовой
Solutio Iodi spirituosae (Б), ФХ

5% — 20 кпл. (60 кпл.), 10% —
10 кпл. (30 кпл.). Спиртовой
раствор 5 и 10%

Rp.: Sol. Iodi spirituosae 5% 15,0

D. S. По 1—5 капель 3 раза в день после еды с молоком

Раствор Люголя
Solutio Lugoli

4—10 кпл. Ж. (оф.). Состав:
йод — 1 часть, йодистый калий — 2 части, дистиллированная вода — 17 частей

Rp.: Sol. Lugoli 10,0

D. S. 1) по 4—6 капель 2—3 раза в день с молоком; 2) наружно, для смазывания слизистой глотки и гортани

Раствор Люголя с глицерином
Solutio Lugoli cum Glycerino

(Оф.). Состав: йод — 1 часть,
йодистый калий — 2 части,
глицерин — 94 части, вода — 3 части

Rp.: Sol. Lugoli cum Glycerino 20,0

D. S. Для смазывания задней стенки глотки

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ МЫШЬЯКА¹

Дуплекс
Duplex (А)

0,2—1,0. Ж. (оф.). Амп. 1 мл
содержит: стрихнина нитрат —
0,001 и арсенат натрия — 0,01

Rp.: Duplicis 1 ml

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 0,2 мл подкожно 1 раз в день, постепенно повышая дозу до 1 мл

¹ См. также бло с мышьяком, осарцид.

Мышьяковистые таблетки (азиатские таблетки)
Tabulettae Acidi arsenicosi obducta (A)

Тб. (оф.). Состав: мышьяковистый ангидрид — 0,001, черный перец — 0,025

Rp.: Tab. Acidi arsenicosi obductae N. 50
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Мышьяковистый ангидрид
Acidum arsenicosum anhydricum (A), ФХ

0,005 (0,015). П. в. тр. Пл.

Rp.: Acidi arsenicosi anhydrici 0,06
Pulv. et. extr. rad. Liquiritiae q. s.
M. f. pilulae N. 60
D. S. По 1 пилюле 2—3 раза в день после еды

Натрия арсенат
Natrii arsenas (A), ФХ

0,01(0,02). П. в. р. Амп.
1,0—1%

Rp.: Sol. Natrii arsenatis 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 0,2 мл подкожно 1 раз в день, постепенно повышая дозу до 1 мл

Натрия какодилат
Natrium kakodylas (A)

0,06 (0,2). П. в. р. Амп. 1,0—10%

Rp.: Sol. Natrii kakodylatis 10% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,25 мл подкожно 1 раз в день, постепенно повышая дозу до 1 мл в день

Раствор калия арсенита (фаулеров раствор)
Solutio Kalii arsenitis (A), ФХ

10 кпл. (30 кпл.). Ж. (оф.)
Содержит 1% мышьяковистокислого калия

Rp.: Sol. Kalii arsenitis 4,0
Aq. Menthae 20,0
M. D. S. Начать с 10 капель в день, повышая постепенно дозу до 15 капель на прием 3 раза в день

Rp.: Sol. Kalii arsenitis 5,0
T-rae Ferri pomati 20,0
M. D. S. По 10 капель 3 раза в день

ГЛЮКОЗА

Глюкоза
Glucosum, ФХ

5,0—8,0. П. в. р. Тб. 0,5 и 1,0
Амп. 10,0, 20,0, 25,0 и 50,0—
10, 25 и 40%

Rp.: Sol. Glucosi 5% 200,0
Sterilisetur!

D. S. Для одного подкожного вливания

Rp.: Sol. Glucosi 5% 500,0

D. S. Для одной клизмы (капельным способом)

Rp.: Sol. Glucosi 40% 20,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 20 мл внутривенно 1 раз в день (вводить медленно!)

АМИНОКИСЛОТЫ И ГИДРОЛИЗАТЫ БЕЛКОВ

Аминокровин
Aminocrovinum

До 2 л. Ж. (оф.). Амп. 250, 300
и 500 мл (продукт гидролиза
белков крови)

Rp.: Aminocrovini 500 ml

D. t. d. N. 4 in amp.

S. Внутривенно, подкожно или внутримышечно капельным
способом, до 2 л на 1 вливание (20—60 капель в минуту)

Аминопептид
Aminopeptidum

1—2 л. Ж. (оф.) — продукт гид-
ролиза белков крови крупного
рогатого скота. Амп. 250 мл

Rp.: Aminopeptidi 250 ml

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 1—2 л внутривенно, подкожно, внутримышечно или
ректально капельным способом (10—60 капель в минуту)

Вицеин
Viceinum

Ж. (оф.) — состав: цистеин —
0,2, глютаминовая кислота и
гликокол — аа 0,1, раствор
натриевой соли аденозинтри-
фосфорной кислоты — 0,5 мл
1%, тиамин-бромид — 0,02,
никотиновая кислота — 0,03,
калия йодид — 1, 5, кальция
хлорид и магния хлорид —
аа 0,3, изотонический раствор
натрия хлорида — до 100,0

Rp.: Viceini 10,0

D. S. Глазные капли

Гидролизат казеина
Hydrolysatum caseini

250—500 мл. Ж. (оф.) — содержит все незаменимые аминокислоты. Фл. 250 и 500 мл

Rp.: Hydrolysati caseini 250 ml

D. t. d. N. 3

S. По 200—500 мл внутримышечно или внутривенно 1 раз в день

Гидролизат ЦОЛИПК
Hydrolysatum ЦОЛИПК

1—2 л. Ж. (оф.) — продукт гидролиза казеина. Амп. 250,0

Rp.: Hydrolysati ЦОЛИПК 250,0

D. t. d. N. 4 in amp.

S. На 1 введение внутримышечно, подкожно или внутривенно капельным способом (20—60 капель в минуту)

Гидролизин Л-103
Hydrolysinum L-103

1—2 л. Ж. (оф.) — продукт гидролиза белков крови крупного рогатого скота. Амп. 250,0, 300,0 и 500,0

Rp.: Hydrolysinum L-103 250,0

D. t. d. N. 8 in amp.

S. Внутримышечно, подкожно или внутривенно капельным способом до 2 л на 1 введение (20—60 капель в минуту)

Гистидина гидрохлорид
Histidini hydrochloridum

0,2. П. в. р. Амп. 5,0—4%

Rp.: Sol. Histidini hydrochloridi 4% 5,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 5 мл внутримышечно 1 раз в день

Лейцин
Leucinum

5—20 мл. Ж. (оф.) — раствор смеси аминокислот. Амп. 10 и 20 мл. Фл. 200,0

Rp.: Leucini 200,0

D. S. По 1—2 столовые ложки 3 раза в день

Rp.: Leucini 10 ml

D. t. d. N. 20 in amp.

S. По 10—20 мл через день внутривенно (на первую инъекцию не более 5 мл)

Метионин
Methioninum, ФХ

0,5—1,5. П. в. р. Пр. Тб. 0,25 и 0,5

Rp.: Methionini 0,25

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день

Регенератор Regeneratorium	1—2 мл. Ж. (оф.) — содержит раствор белкового вещества 0,00025 в 1,0 18° этилового спирта. Амп. 1 и 5 мл
-------------------------------	---

Rp.: Regeneratori 1 ml
D. t. d. N. 20 in amp.
S. По 1—2 мл подкожно 1 раз в день

Тирозина сульфит Thyrosini sulfuris (Б)	0,4—0,6. П. в. р. Р-ры. Амп. 10,0 и 20,0—2% в 40% раство- ре глюкозы
--	--

Rp.: Thyrosini sulfuritis 5,0
Aq. destill. 200,0
M. D. S. По 1—2 столовые ложки 3 раза в день
Rp.: Sol. Thyrosini sulfuritis 2% 10,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 10—20 мл внутривенно через день (на 1 введение
не более 5—10 мл)

Цистеин Cysteinum (α-амино-β-меркаптопропионовая кислота)	П. в. р. Пр. во фл. 10,0. Р-ры 2 и 5%
--	--

Rp.: Cysteinum 10,0
D. S. Для ионофореза при катаракте — приготовить 5%
раствор на дистиллированной воде; для глазных
ванночек — 2%

Зарубежные препараты

Церебролизин (**) Cerebrolysinum (Б)	1—2 мл. Ж. (оф.) — гидролизат мозгового вещества. Амп. 1,0
---	---

Rp.: Cerebrolysinum 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1—2 мл внутримышечно 1 раз в 3—4 дня

БИОГЕННЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ¹

Алоэ — жидкий экстракт Extractum Aloë fluidum	Ж. (оф.). Фл. 100,0 и 200,0
--	-----------------------------

Rp.: Extr. Aloë fluidi 200,0
D. S. По 1 чайной ложке 3 раза в день

¹ См. также аллисат, аллилчеп.

Алоэ — жидкий экстракт для инъекций 1 мл Ж. (оф.). Амп. 1 мл
Extractum Aloës fluidum pro injectionibus

Rp.: Extr. Aloës fluidi pro injectionibus 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл подкожно 1 раз в день

Алоэ — эмульсия Эм. (оф.) — состав: сок из листьев алоэ — 78 частей, касторовое масло и эмульгатор — аа 11 частей, эвкалиптовое масло — 0,1 части
Emulsum Aloës

Rp.: Emuls. Aloës 200,0
D. S. 1) для смазывания кожи при повреждениях, возникающих вследствие лучевой терапии; 2) при различных воспалительных процессах кожи и при ожогах

Апилак 0,01. Тб. 0,01. Спп. 0,01 (сухое вещество маточного молочка — секрета аллотрофических желез рабочих пчел)
Apilacum

Rp.: Apilaci 0,01
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день под язык в течение 10—15 дней
Rp.: Suppos. Apilaci 0,01
D. t. d. N. 30
S. По 1 свече 3 раза в день в прямую кишку

Венапиолин 1 и 2 (пчелиный яд Амф. (оф.) — КФ-1 содержит в 1 мл масла 2—3 ЕД; КФ-2 содержит 8—12 ЕД ослабленного пчелиного яда)
КФ-1 и КФ-2)
Venapiolinum 1 et 2 (Б)

Rp.: Venapiolini-1 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,5 мл 1 раз в день под кожу в течение 5 дней, затем через 1—2—3 дня, постепенно увеличивая дозу до 1,5 мл (больше 0,75 мл не вводить в одно место!)

Взвесь плаценты П/к. 2 мл. Амп. (оф.) по 2 мл
Suspensio placentae

Rp.: Susp. placentae 2 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. Содержимое 1 ампулы развести в 3—5 мл 0,5% раствора новокаина: для одной подкожной инъекции

Випраксин Vipraxinum (A)	0,2—0,4 мл. Ж. Активность 1 мл — 1 ЕД. Амп. 1 мл (водный раствор сухого яда гадюки обыкновенной)
-----------------------------	---

Rp.: Vipraxini 1 ml
D. t. d. N. 3 in amp.
S. По 0,2—0,3 мл внутривенно в области больного органа
1 раз в 3—4 дня

Випросал — мазь Unguentum Viprosalum	Наружно. Мз. (оф.) — содержит яд гюрзы. Туба 50,0
---	--

Rp.: Ung. Viprosali 50,0
D. S. Для втирания по 2—4 г

Гумизоль Gumisolum	1—2 мл. Ж (оф.) — препарат из морской лечебной грязи. Амп. 1 и 2 мл.
-----------------------	--

Rp.: Gumisoli 1 ml
D. t. d. N. 20 in amp.
S. По 1—2 мл 1 раз в день

Желчь медицинская консервиро- ванная Chole conservata medicata	Ж. Фл. 50,0, 100,0 и 250,0 (пре- парат, содержащий натураль- ную желчь убойного скота)
--	--

Rp.: Cholis conservatae medicatae 250,0
D. t. d. N. 10
S. Для компрессов на пораженные суставы. Перед употреб-
лением взбалтывать

Каланхоэ — мазь Unguentum Kalanchoës	Наружно. Мз. (оф.) — состав: сок каланхоэ — 40 мл, лано- лина безводного — 60,0, фу- разолидона и новокаина — аа 0,25
---	---

Rp.: Ung. Kalanchoës 100,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Каланхоэ — сок Succus Kalanchoës	Наружно. Ж. (оф.) — препарат из свежих листьев и зеленых частей стеблей каланхоэ пер- истого. Амп. 3; 5; 10; 20 мл Фл. 10; 20; 100 мл
-------------------------------------	---

Rp.: Succ. Kalanchoës 100 ml
D. S. Для орошения ран и смачивания повязок (повязки
менять ежедневно)

Калия оротат Kalii orotas	0,25—0,5. П. в. нр. Тб. 0,25 и 0,5
------------------------------	------------------------------------

[калиевая соль оротовой (урацилкарбоновая-6) кислоты]

Rp.: Tab. Kalii orotatis 0,25
D. t. d. N. 50
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день за час до еды

Луронит Luronitum	П. в. р. Пр. во фл. 0,01 (препарат стекловидного тела крупного рогатого скота, содержащий гиалурионовую кислоту)
----------------------	--

Rp.: Luroniti 0,01
D. t. d. N. 10
S. Содержимое 1 флакона растворить в 10 мл 0,5% раствора новокаина; образующийся вязкий раствор наносить на марлевую повязку для лечения ран; повязку менять каждые 2 дня

Пелоидин Peloidinum	В/м 5—10 мл. Вн 20,0—40,0. Ж. (оф.) — жидкий экстракт из иловой лечебной грязи. Амп. 5 и 10 мл. Фл. 200,0
------------------------	---

Rp.: Peloidini 200,0
D. S. По 2 столовые ложки 2 раза в день за 2 ч до еды (перед употреблением подогреть)

Rp.: Peloidini 5 ml
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 5—10 мл внутримышечно 2 раза в день (перед употреблением подогреть до t° тела)

Пеллододистиллят Peloidodestillatum	1 мл. Ж. (оф.) — полученная из лиманной грязи. Амп. 1 мл
--	--

Rp.: Peloidodestillati 1 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день

Пирогенал Pyrogenalum (Б)	0,00001—0,0001. П. в. р. Амп. 1,0—0,001, 0,0025, 0,005 и 0,01% (100, 250, 500 и 1000 МПД)
------------------------------	---

Rp.: Sol. Pyrogenali 0,01% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 0,3—1 мл внутримышечно 1 раз в три дня

Сироп алоэ с железом
Sirupus Aloës cum Ferro

Ж. (оф.) — состав: раствор хлорида закисного железа — 10–20%, соляная кислота разведенная — 1,5%, виннокаменная и лимонная кислоты — аа 0,2%, сироп из алоэ — до 100%. Фл. 100,0

Rp.: *Sirupi Aloës cum Ferro* 100,0

D. S. По $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке в $\frac{1}{4}$ стакана воды 3 раза в день

Стекловидное тело
Corpus vitreum

2 мл. Ж. (оф.). Амп. 2,0

Rp.: *Corpus vitrei* 2 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 2 мл подкожно 1 раз в день

Токсапин (меллисин)
Toxapinum (Mellisinum)

Амп. (оф.) — содержат 0,006 пчелиного яда в 1,1 мл оливкового масла

Rp.: *Toxapini* 1,1 ml

D. t. d. N. 5 in amp.

S. По 0,2—0,3 мл подкожно или внутримышечно через день, постепенно увеличивая дозу до 1 мл через день (не более 0,2—0,3 в одно место)

Торфот
Torfotum

1 мл. Ж. (оф.) — отгон торфа.
Амп. 1 мл

Rp.: *Torfoti* in amp. á 1 ml

D. t. d. N. 10

S. По 1 мл подкожно 1 раз в день

ФиБС
FiBS

1 мл. Ж. (оф.) — из отгона лиманной грязи, содержащая коричневую кислоту и кумарины. Амп. 1 мл

Rp.: *FiBS* 1 ml

D. t. d. N. 30 in amp.

S. По 1 мл подкожно 1 раз в день в течение 30—35 дней

Зарубежные препараты

Апизартрон (ГДР)
Apisarthronum

Дозы см. рецепт. П. в. р. Стандартизованный пчелиный яд. Пр. в амп. по 0,0001 и 0,001

Rp.: Apisarthroni 0,0001

D. t. d. N. 10 in amp.

S. Содержимое 1 ампулы растворить дистиллированной водой из ампулы, которая прилагается к препарату. Внутрькожно одновременно две инъекции по 0,1 мл (далее по схеме)

Апизартрон — мазь (ГДР)
Unguentum Apisarthronum

Мз. (оф.) — содержит пчелиный яд в постоянной концентрации (1,0 мази содержит 1 ед. пчелиного яда). Фл. 30,0 и 50,0

Rp.: Ung. Apisarthroni 50,0

D. S. 1—2 чайные ложки мази нанести на кожу ровным слоем (1 мм). Как только больной почувствует жжение, мазь следует втирать (начинать рекомендуется с небольших количеств, величиной с горошину, для определения чувствительности к яду)

Випералгин (Чехословакия)
Viperalginum (A)
(содержит токсин гадюки песчаной)

0,0001. П. в. р. Амп. (оф.) — содержат по 0,0001 сухого яда. Прилагаются ампулы с изотоническим раствором хлорида натрия по 1,0

Rp.: Viperalgini 0,0001

D. t. d. N. 15 in amp.

S. Растворить содержимое 1 ампулы в 1 мл изотонического раствора хлорида натрия. Вводить подкожно, внутрикожно или внутримышечно по 0,1 мл 1 раз в день. Дозу постепенно увеличивать на 0,1 мл до появления заметной местной гиперергической реакции. Максимальную дозу повторить несколько раз (1 раз в сутки) и затем постепенно снижать до 0,1 мл

Випратокс в ампулах (ГДР)
Vipratoxum in ampulis (A)

0,2—1 мл. Амп. по 1 мл (оф.) — содержат яд гадюки обыкновенной

Rp.: Vipratoxi 1 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. Внутрькожно, подкожно или внутримышечно, начиная с 0,2 мл, постепенно увеличивая дозу до 1 мл. Инъекции повторять не ранее чем через 72 ч, дозу свыше 0,4 мл вводить в нескольких местах; курс лечения — 10 инъекций

Випратокс — мазь (ГДР)
Unguentum Vipratoxum (Б)

3,0—6,0. Мз. (оф.) Состав: токсинны ядовитых змей — 0,0001, метилсалицилат — 6,0 камфора — 3,0, мазевая основа — ad 100,0. Фл. 50,0

Rp.: Ung. Vipratoxi 50,0
D. S. По 3—6 г на одно втирание (при радикулитах)

Вирапин (Чехословакия)
Virapinum (Б)

Мз. (оф.). Состав: пчелиный яд — 0,003, мазевая основа — 20,0

Rp.: Virapini 20,0
D. S. По 2—4 г на одно втирание

КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ

КИСЛОТЫ¹

Виннокаменная кислота
Acidum tartaricum

0,3—0,5. П. в. р. Пр.

Rp.: Acidi tartarici
Magnesii carbonatis
Sacchari aa 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку на $\frac{1}{2}$ стакана воды (для приготовления шипучих напитков)

Лимонная кислота
Acidum citricum

П. в. р. Применяется для приготовления кислых шипучих напитков (см. виннокаменную кислоту)

Rp.: Acidi citrici 10,0
D. S. По вкусу, для приготовления кислых напитков

Соляная кислота разведенная
Acidum hydrochloricum dilutum,
ФХ

2 мл или 40 кпл. (6 мл или 120 кпл.). Кпл. Мкс.

Rp.: Acidi hydrochlorici diluti 15,0
D. S. По 10—15 капель в рюмке воды 2—3 раза в день во время еды

¹ См. также желудочный сок, ацидин-пепсин, бетацид.

Rp.: Acidi hydrochlorici diluti 6,0
Pepsini 2,0
Aq. destill. 200,0
M. D. S. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день во время
еды

ЩЕЛОЧИ ¹

Кальция карбонат осажденный 0,2—1,0. П. в. нр. Пр.
Calcii carbonas praecipitatum

Rp.: Calcii carbonatis praecipitati 0,2
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Магния карбонат основной 1,0—3,0. П. в. нр. Тб. 0,5. Пр.
Magnesii subcarbonas, ФХ

Rp.: Magnesii subcarbonatis 0,5
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Magnesii subcarbonatis
Natrii hydrocarbonatis aa 0,5
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Magnesii subcarbonatis
Natrii hydrocarbonatis aa 0,5
Extr. Belladonnae 0,015
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Магния окись 0,1—1,0. П. в. нр. Пр. Тб. 0,5
Magnesii oxydum (Magnesia usta),
ФХ

Rp.: Magnesii oxydi 20,0
D. S. По $\frac{1}{4}$ чайной ложки 2 раза в день

Rp.: Magnesii oxydi 20,0
Aq. destill. 120,0
M. D. S. По 1 столовой ложке через каждые 10 мин при
отравлении кислотами (перед употреблением
взбалтывать)

Rp.: Magnesii oxydi 0,5
Extr. Belladonnae 0,015
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день

¹ См. также викалин.

Натрия гидрокарбонат
Natrii hydrocarbonas, ФХ

0,25—0,5. П. в. р. Тб. 0,3 и
0,5. Пр. Р-ры

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 10,0
D. S. На кончике ножа

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 0,3
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Sol. Natrii hydrocarbonatis 5% 100, 0
Sterilisetur!
D. S. По 50—100 мл внутривенно при ацидозе

Rp.: Natrii hydrocarbonatis
Magnesii carbonatis aa 0,25
M. f. pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Натрия фосфат
Natrium phosphas

0,5—1,0. П. в. р. Пр.

Rp.: Natrii phosphatis
Natrii hydrocarbonatis aa 20,0
M. D. S. На кончике ножа за час до еды

Rp.: Calcii phosphatis
Calcii carbonatis
Bismuthi subnitratis aa 0,5
Extr. Belladonnae 0,015
M. f. pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 3 раза в день

СРЕДСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВЫДЕЛЕНИЮ СОЛЕЙ ИЗ ОРГАНИЗМА

Марена красильная — сухой эк-
стракт
Extractum Rubiae tinctori siccum

0,25—0,75. Тб. 0,25

Rp.: Extr. Rubiae tinctori sicci 0,25
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день (перед употребле-
нием растворить в $\frac{1}{2}$ стакана теплой воды)

Олиметин
Olimetinum

0,5—1,0. ГЖ. (оф.) — комплексный препарат, содержащий в 1,0: масла мяты перечной — 0,017, масла терпентинного очищенного — 0,0341, масла аирного — 0,025, масла оливкового — 0,9205, серы очищенной — 0,0034. Кпс. 0,5

Рр.: Olimetini 0,5

D. t. d. N. 20 in caps. gelat.

S. По 1—2 капсулы 3—4 раза в день после еды

Пинабин
Pinabinum (Б)

5—20 клл. Ж. (оф.) — 50% раствор тяжелой фракции эфирных масел из хвои сосны или ели на персиковом масле. Фл. 25,0

Рр.: Pinabini 25,0

D. S. По 5 капель на кусочке сахара 3—4 раза в день за 15—20 мин до еды

Уродан
Urodanum

3,0—5,0. П. (оф.) — состав: пиперазина фосфат — 2,5 части, гексаметиленetetрамин — 8 частей, натрия бензоат — 2,5 части, лития бензоат — 2 части, натрия фосфат — 10 частей, гидрокарбонат натрия и виннокаменная кислота — aa 37,5 части. Фл. 100,0

Рр.: Urodani 100,0

D. S. По 1 чайной ложке в $\frac{1}{2}$ стакана воды 3—4 раза в день

Цинхофен (атофан)
Cinchophenum (Atophanum) (Б)

0,5 (2,0). П. в. нр. Тб. 0,5. Пр.

Рр.: Cinchopheni 0,5

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день (запивать 2% раствором соды)

Этамид
Aethamidum
(N, N-диэтилсульфамидобензой-
ная кислота)

0,7. П. в. нр. Тб. 0,35

Рр.: Aethamidi 0,35
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 2 таблетки 4 раза в день

Зарубежные препараты

Цистенал (Чехословакия)
Cystenalum (Б)

8—20 кпл. ГЖ. (оф.) — состав:
экстракт марены красильной,
эфирные масла, магния сали-
цилат, спирт, оливковое масло.
Фл. 10,0

Рр.: Cystenali 10,0
D. S. По 3—4 капли на сахаре и до 20 капель в случае
приступа колик

ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Аммифурин
Ammifurinum (Б)

0,02. П. в. нр. Тб. 0,02. Р-р
2% в смеси спирта и ацетона
(препарат из семян амми боль-
шой)

Рр.: Ammifurini 0,02
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в первую половину дня за
4—3—2 и 1 ч до облучения ультрафиолетовыми лучами

Бероксан
Beroxanum (Б)

0,02. П. в. тр. Р-ры. Тб. 0,02.
Фл. 0,5% — 50,0 (смесь двух
фурокумаринов — ксантокси-
на и бергаптена, выделенных
из плодов пастернака посе-
вого)

Рр.: Beroxani 0,02
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в первую половину дня за
4—3—2 и 1 ч до облучения ультрафиолетовыми лучами

Рр.: Sol. Beroxani 0,5% 50,0
D. S. Для смазывания пораженных мест 1 раз в сутки
перед сном с последующим облучением ультрафио-
летовыми лучами (на следующий день)

Псорален
Psoralenum (Б)

0,005—0,02. П. в. тр. с. р. Тб.
0,005, 0,01 и 0,02. Спиртовой
р-р — 0,1%

Rp.: Tab. Psoraleni 0,005

D. t. d. N. 20

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день за 30 мин до еды

ДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ¹

Пептон
Peptonum

0,05—0,25. П. в. р. Р-ры. Про-
дукт гидролиза белка

Rp.: Sol. Peptoni 5% 10,0

Sterilisetur!

D. S. По 1—5 мл внутримышечно 1 раз в день

Плазмол
Plasmolum

1 мл. Ж. (оф.). Препарат, полу-
ченный из человеческой крови.
Амп. 1 мл

Rp.: Plasmoli 1 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1 мл подкожно ежедневно или через день

Зарубежные препараты

Индоцид (Югославия)
Indocidum

0,25. Кпс. 0,25

[1-р (-хлорбензонил)-5-метокси-2-
метилиндол-3-уксусная кислота]

Rp.: Indocidi 0,25

D. t. d. N. 30 in caps.

S. По 1 капсуле 3—4 раза в день

¹ См. также противогистаминные препараты, соли кальция, пре-
параты коры надпочечников.

Глава VIII

ПРОТИВОЯДИЯ ¹

Гемодез Haemodesum	100—300 мл. Ж. Фл. 100, 200 и 400 мл
-----------------------	---

Rp.: Haemodesi 200 ml
 D. t. d. N. 5
 S. Для капельного внутривенного вливания по 200—300 мл
 1—2 раза (с интервалом не менее 12 ч)

Калия хлорид Kalii chloridum, ФХ	1,0—1,5. П. в. Пр. Р-ры
-------------------------------------	-------------------------

Rp.: Kalii chloridi 1,0
 D. t. d. N. 10
 S. По 1 порошку 5 раз в день; принимать в $\frac{1}{2}$ стакана воды
 или сиропа (при отравлении сердечными гликозидами)

Налорфина гидрохлорид Nalorphini hydrochloridum (A) (аллилнорморфина гидрохлорид)	0,005—0,01. Амп. 1,0—0,5% и 1,5—0,05% (для новорожден- ных)
---	---

Rp.: Sol. Nalorphini hydrochloridi 0,5% 1,0
 D. t. d. N. 6 in amp.
 S. По 1—2 мл подкожно при передозировке анальгетиков
 типа морфина

Натрия тиосульфат Natrii thiosulfas, ФХ	В/в 0,6—3,0. П. в. р. Амп. 5,0 10,0 и 50,0—30%
--	---

Rp.: Sol. Natrii thiosulfatis 30% 5,0
 D. t. d. N. 6 in amp.
 S. По 5 мл внутривенно (вводить медленно!)

¹ См. также нитриты.

Rp.: Sol. Natrii thiosulfatis 10% 100,0
D. S. По 1—2 столовые ложки через каждые 5—10 мин

Rp.: Sol. Natrii thiosulfatis 30% 50,0
D. t. d. N. 3 in amp.
S. По 50 мл внутривенно

Пентацин
Pentacinum

(кальций-тринатриевая соль ди-
этилентриаминпентауксусной
кислоты)

В/в 0,25—1,5. Вн. 2,0(4,0) П. в. р.
Амп. 5,0—5% Тб. 0,5

Rp.: Sol. Pentacini 5% 5,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 5 мл внутривенно 1 раз в два дня (в тяжелых случаях
разовая доза может быть увеличена до 30 мл)

Rp.: Tab. Pentacini 0,5
D. t. d. N. 60
S. По 4 таблетки 2 раза в день с промежутками 1—2 дня

Противоядие при отравлении
тяжелыми металлами
Antidotum metallorum

Ж. (оф.), состав: сульфат маг-
ния — 3,75, натрия гидрокар-
бонат — 12,5, натр едкий —
1,0, сероводород — 0,4%, во-
да — до 1 л (100 мл противоя-
дия обезвреживают 4 г суле-
мы). Фл. 100,0 и 200,0

Rp.: Antidoti metallori 200,0
D. S. По 50—150 мл на прием: перед введением антидота
выпить стакан воды

Раствор глюкозы 25% и метиле-
нового синего 1% для инъекций
Solutio Glucosi 25% et Methyleni
coerulei 1% pro injectionibus,
ФХ

Амп. (оф.) — 20 и 50 мл

Rp.: Sol. Glucosi 25% et Methyleni coerulei 1% pro injectioni-
bus — 20 ml
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 20—40 мл внутривенно

Тетацин-кальций (кальций-динатриевая соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты)
Tetacium-calcium (Calcium dinatrium EDTA)

2,0. П. в. р. Амп. 10,0—10%.
Тб. 0,5

Rp.: Sol. Tetacini-calcii 10% 10,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. Содержимое 2 ампул развести в 500 мл 5% раствора глюкозы; вводить внутривенно 1—2 раза в день капельным способом

Rp.: Tetacini-calcii 0,5

D. t. d. N. 10 in tab.

S. По 1 таблетке 4 раза в день (через день)

Унитиол
Unithiolum (Б)

0,2—0,3. П. в. р. Амп. 5,0—5%
Тб. 0,25—0,5

Rp.: Sol. Unithioli 5% 5,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 5 мл внутримышечно 3—4 раза в первые сутки, далее по схеме (при отравлении тяжелыми металлами и мышьяком)

Rp.: Tab. Unithioli 0,5

D. t. d. N. 20

S. По 1 таблетке 2 раза в день

Зарубежные препараты

Дефероксамин ()**
Deferoxaminum (Б)

0,5, Амп., содержащие 0,5 су-
хого препарата

Rp.: Deferoxamini 0,5

D. t. d. N. 5 in amp.

S. Растворить содержимое 1 ампулы в 5 мл воды для инъекций; для внутримышечных инъекций 1—2 раза в день

Глава IX

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА

Баранца отвар
Decoctum Lycopodii Selaginosi
(Б)

Дек. (оф.) — 5% отвар надзем-
ных частей баранца, или плау-
на

Rp.: Dec. Lycopodii Selaginosi 100,0
D. S. На 1 прием; через 3—15 мин после отвара выпить
3—5 мл любимого алкогольного напитка

Тетурам (антабус)
Teturamum (Antabus) (Б)
(тетраэтилтиурамдисульфид)

В дециграммах (по схеме). П. в.
нр. Тб. 0,1—0,15—0,25

Rp.: Teturami 0,25
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По схеме:

	В 8 ч утра	В 6 ч вечера
1-й день	0,5	0,5
2-й »	0,25	0,25
3-й »	0,25	0,25
4-й »	0,25	—
5-й, 6-й день и далее в течение длитель- ного времени в 8 ч утра 0,15		

Циамид
Cyamidum (Б)

Тб. (оф.), состав: цианамид каль-
ция — 0,05 и лимонная кис-
лота — 0,1

Rp.: Tab. Cyamidi N. 50
D. S. По схеме: 1-й и 2-й день — по 1/2 таблетки
1 раз в день; с 3-го дня в течение 1—2 месяцев —
по 1—2 таблетки в день с еженедельными пробами
приема **алкоголя**.

Глава X

**ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
И ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА**

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

АНТИБИОТИКИ ¹

Алмециллин	400 000 ЕД (1 200 000 ЕД). В. в.
Almecillinum (Б)	р. Пр. во фл. 100 000, 200 000,
(калиевая соль аллилмеркапто-	300 000, 400 000, 500 000 и
метилпенициллиновой кислоты)	1 000 000 ЕД

Rp.: Almecillini 200 000 ЕД

D. t. d. N. 6

S. Внутримышечно по 200 000 ЕД; растворить в 1 мл 0,25% раствора новокаина

Бензилпенициллина	калиевая	50 000—300 000 ЕД (200 000 —
соль		1 500 000 ЕД). П. в. р. Фл. 100,
Benzylpenicillinum-kalium (Б),		200, 300, 500 тыс. и 1 млн. ЕД
ФХ		

Rp.: Benzylpenicillini-kalii 200 000 ЕД

D. t. d. N. 10

S. По 1 флакону внутримышечно 3—4 раза в день; перед введением растворить в 1 мл 0,25% раствора новокаина

¹ См. также канамицина моносульфат, флоримицина сульфат.

Бензилпенициллина натриевая соль	Средние терапевтические дозы —
Benzylpenicillinum-natrium (Б), ФХ	50 000—300 000 ЕД (200 000—1 500 000 ЕД). П. в. р. Фл. 100, 200, 300, 500 тыс. и 1 млн. ЕД

Rp.: Benzylpenicillini-natrii 200 000 ЕД

D. t. d. N. 10

S. По 1 флакону внутримышечно в 1 мл 0,25% раствора новокаина 4 раза в день

Бензилпенициллина новокаиновая соль	Средние терапевтические дозы —
Benzylpenicillinum-novocainum (Б), ФХ	300 000 ЕД (600 000 ЕД). П. в. р. Фл. 300, 600 тыс. и 1 200 000 ЕД

Rp.: Benzylpenicillini-novocaini 300 000 ЕД

D. t. d. N. 6

S. Содержимое 1 флакона растворить в 1—2 мл воды для инъекций; для одной внутримышечной инъекции

Бициллин-1 ¹	300 000 ЕД 1 раз в неделю. П. в.
Bicillinum-1 (Б)	тр. Фл. 300, 600 тыс., 1 200 000 и 2 400 000 ЕД (N, N ₁ -дибензилэтилендиаминовая соль бензилпенициллина)

Rp.: Bicillini-1 300 000 ЕД

D. t. d. N. 6

S. Внутримышечно по 300 тыс. ЕД 1 раз в неделю; разводить содержимое флакона в 2 мл воды для инъекций (образуется суспензия)

Бициллин-3 ¹	В/м 300 000 ЕД — 1 раз в 3 суток. В/м — 600 000 ЕД — 1 раз в 6 суток. В/м 900 000—1 200 000 ЕД — при лечении сифилиса по соответствующей инструкции. В. в. нр. Пр. (оф.) — состав: смесь равных частей калиевой (или) натриевой соли бензилпенициллина, новокаиновой соли бензилпенициллина и бициллина-1
Bicillinum-3 (Б)	

Rp.: Bicillini-3 300 000 ЕД N. 3

D. S. Развести содержимое 1 флакона в 1 мл воды для инъекций (образуется суспензия); на 1 внутримышечную инъекцию 1 раз в 4 дня

¹ Внутривенное введение препарата воспрещается.

Бициллин-5¹
Bicillinum-5 (Б)

Пр. (оф.), состав: N, N'-ди-
бензилэтилендиаминовая соль
бензилпенициллина —
1 200 000 ЕД, новокаиновая
соль бензилпенициллина —
300 000 ЕД. Фл. 1 500 000 ЕД

Rp.: Bicillini-5 N. 2

D. S. Содержимое 1 флакона растворить в 1 мл воды для
инъекций (образуется суспензия); на 1 внутримышеч-
ную инъекцию — один раз в неделю

Витахлорциклин
Vitachlorcyclinum (Б)

1—2 тб. Тб. (оф.) — состав:
хлортетрациклина гидрохло-
рид — 0,1, тиамин-бромид (или
тиамин-хлорид) — 0,005, ри-
бофлавин — 0,002, аскорбино-
вая кислота — 0,05

Rp.: Tab. Vitachlorcyclini N. 20

D. S. По 1—2 таблетки 4—6 раз в сутки

Витациклин
Vitacyclinum (Б)

1—2 тб. Тб. (оф.) — состав: тет-
рациклин — 0,1, тиамин-хло-
рид (или тиамин-бромид) —
0,005, рибофлавин — 0,002,
аскорбиновая кислота — 0,05

Rp.: Tab. Vitacyclini N. 20

D. S. По 1—2 таблетки 4—6 раз в сутки

Витоксициклин
Vitoxycyclinum (Б)

1—2 тб. Тб. (оф.), состав: окси-
тетрациклин — 0, 1, тиамин-
хлорид (или тиамин-бромид) —
0,005, рибофлавин — 0,002,
аскорбиновая кислота — 0,05

Rp.: Tab. Vitoxycyclini N. 20

D. S. По 1—2 таблетки 4—6 раз в сутки

Гелиомициновая мазь
Unguentum Heliomycinum

Мз. 1, 3 и 5%

Rp.: Ung. Heliomycinum 3% 10,0

D. S. Глазная мазь; закладывать за веки 1 раз в сутки

¹ Внутривенное введение препарата воспрещается.

Гликоциклин Glicocyclinum [смесь N-(глицино)-метилтетра- циклина и аминоксусной кис- лоты]	0,3—0,5. Фл. 0,25 и 0,5 (0,1 соответствует 100 000 ЕД)
--	---

Rp.: Glicocyclini 0,25
D. t. d. N. 6
S. Содержимое 1 флакона развести в 2 мл воды для инъек-
ций. Вводить внутривенно 1—2 раза в день

Грамицидин С Gramicidinum S, ФХ	Наружно. П. в. нр. с. р. Ам- 2,0, 5,0 и 10,0—2%
------------------------------------	--

Rp.: Sol. Gramicidini S 2% 2,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Содержимое 1 ампулы растворить в 200 мл стерильной
дистиллированной воды; для лечения ран, свищей

Грамицидиновая паста Pasta Gramicidini	Пст. (оф.), состав: 2% спиртовой раствор грамицидина — 9,89%, 40% раствор молочной кисло- ты — 0,51%, эмульгатор — 15%, вода дистиллирован- ная — 74,6%. Тубы 30 и 50 г
---	--

Rp.: Pastae Gramicidini 50,0
D. S. 1) нанести пасту ровным слоем на марлевую сал-
фетку и приложить на раневую поверхность; 2) для
влагалищных тампонов (разовая доза — 5—6 г)

Гризеофульвин Griseofulvinum (Б), ФХ	0,15—0,25. П. в. нр. Тб. 0,25 и 0,125. Суспензия (оф.) — 100,0 и 200,0
---	--

Rp.: Griseofulvini 0,125
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день во время еды
Rp.: Susp. Griseofulvini 100,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи, воло-
систой части головы и ногтей

Дибимициновая глазная мазь Unguentum Dibiomycinum ophthalmicum	Мз. (оф.) — состав: дибими- цин — 10 000 ЕД, ланолин безводный — 0,4, вазелин бе- лый — до 1,0. Тубы 5,0, 10,0, 25,0 и 50,0
--	---

Rp.: Ung. Dibiomycini ophthalmici 5,0
D. S. Глазная мазь; закладывать за веки 1 раз в сутки

Дигидрострептомицина аскорби-
нат
Dihydrostreptomycini ascorbas
(Б)

В/м 0,25—1,0. Пр. во фл. — 0,25

Rp.: Dihydrostreptomycini ascorbatis 0,25

D. t. d. N. 6

S. Внутримышечно по 0,25 2—3 раза в день в 2—3 мл
воды для инъекций или в 2—3 мл 0,5% раствора ново-
каина

Дигидрострептомицина пантоте-
нат
Dihydrostreptomycini pantothenas
(Б)

250 000—500 000 ЕД. П. в. р.
Фл. 100 000, 250 000 и
500 000 ЕД

Rp.: Dihydrostreptomycini pantothenatis 250 000 ЕД

D. t. d. N. 10

S. Внутримышечно по 250 000 ЕД 2—3 раза в день в 2—3 мл
0,5% стерильного раствора новокаина или воды для
инъекций

Дигидрострептомицина сульфат
Dihydrostreptomycini sulfas (Б)

0,5—1,0 в сутки. Активность
1,0 — 1 000 000 ЕД. Фл. 0,5
и 1,0

Rp.: Dihydrostreptomycini sulfatis 1,0

D. t. d. N. 10

S. Растворить содержимое 1 флакона в 3 мл стерильного
0,5% раствора новокаина; на две внутримышечные
инъекции

Дитетрациклиновая мазь
Unguentum Ditetracyclinum

Наружно. Мз. (оф.) — состав:
дитетрациклин — 0,0075, ла-
нолин безводный — 2,0, ва-
зелин до 5,0. Тубы 5,0

Rp.: Ung. Ditetracyclini 5,0

D. S. Закладывать за веки 1 раз в день; в зависимости от
эффекта — 1 раз в 2—3 дня

Левомецетин
Laevomycetinum (Б), ФХ

1,0 (4,0). П. в. тр. Тб. 0,1, 0,25
и 0,5

Rp.: Laevomycetini 0,5

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 4—6 раз в день до еды

Левомецитина стеарат (эулево-мицетин) 1,0—2,0. П. в. нр. Тб. 0,25
Laevomycetini stearas
(Eulaevomycetinum) (Б), ФХ

Rp.: Laevomycetini stearatis 0,25
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 4 таблетки через каждые 6—8 ч

Леворин 500 000 ЕД. П. в. нр. Тб. и кпе.
Levorinum (Б) 500 000 ЕД. Мз. 5%

Rp.: Levorini 500 000 ЕД
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Ung. Levorini 5% 30,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Линкомицина гидрохлорид 0,5. Пр. во фл. 0,5
Lincomycini hydrochloridum (Б)

Rp.: Lincomycini hydrochloridi 0,5
D. t. d. N. 10
S. Содержимое 1 флакона растворить в 3—5 мл воды для инъекций; для внутримышечных инъекций 2—3 раза в сутки

Микроцид Ж. (оф.). Фл. 100,0 и 200,0
Microcidum

Rp.: Microcidi 200,0
D. S. Для примочек

Rp.: Microcidi
Ol. jecoris Aselli aa 100,0
M. f. emulsum (ex tempore)
D. S. Для лечения ран

Морфоциклин 0,15. П. в. р. Фл. 0,075 и 0,15
Morphocyclinum (Б) (в 1 мг содержится 1000 ЕД)

Rp.: Morphocyclini 0,15
D. t. d. N. 10
S. По 1 флакону внутривенно 2 раза в день; перед употреблением растворить в 20 мл 5% раствора глюкозы

Натрия уснинат
Natrii usninas (Б)

Наружно. П. Р-ры водно-спир-
товые. Пр. — per se и в смеси
с сульфаниламидами и анесте-
зином

Rp.: Sol. Natrii usninatis spirituosae-aquosi 0,5% 100,0
D. S. Для лечения инфицированных ран

Rp.: Natrii usninatis 4,0
Streptocidi 6,0
Norsulfasoli ad 20,0
M. f. pulv.
D. S. Присыпка для ран

Неомицина сульфат
Neomycini sulfas (Б), ФХ

0,1—0,25 (0,2—0,5). П. в. р. Тб.
0,1 и 0,25. Фл. 0,2, 0,4 и 0,8
(активность 0,1—100 000 ЕД)

— Rp.: Neomycini sulfatis 0,25
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Rp.: Neomycini sulfatis 0,2
D. t. d. N. 6
S. Содержимое 1 флакона растворить в 2 мл 0,5% раствора
новокаина; внутримышечно 2 раза в день — в 1-й день
0,1, во 2-й — 1,5, далее по 0,2 (на курс лечения не
более 2 000 000 ЕД)

Нистатин
Nystatinum (Б)

250 000—500 000 ЕД. П. в. нр.
Тб. и Држ. 100 000, 250 000
и 500 000 ЕД. Мз. (оф.), со-
став: нистатин — 4%, лано-
лин безводный — 40%, вазе-
лин — 56%, Спп. и Ш. по
250 000 и 500 000 ЕД

Rp.: Nystatini 250 000 ЕД
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Ung. Nystatini 25,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи и сли-
зистых

Нистатина натриевая соль
Nystatinum-natrium (Б)

Наружно. П. в. р. Фл. 150 000
ЕД

Rp.: Nystatini-natrii 150 000 ЕД
D. t. d. N. 10
S.: 1) содержимое 1 флакона растворить в 150 мл кипяче-
ной воды — для полоскания 2 раза в день; 2) растворы
такой же концентрации для смазывания вагинальных
тампонов, для спринцеваний и инстилляций

Новобиоцина натриевая соль
Novobiocinum-natrium (Б)

0,25—0,5. П. в. р. Тб. 0,125 и
0,25 (в 1,0 содержится 1 000 000
ЕД)

Rp.: Novobiocini-natrii 0,25

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 4—6 раз в день

Новоциллин
Novocillinum (Б)

300 000 ЕД. Суспензия новокаи-
новой соли пенициллина в пер-
сиковом масле (оф.). Амп.
1 мл — активность 300 000 ЕД

Rp.: Novocillini 1 ml

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в день (перед употребле-
нием ампулу подогреть и взболтать)

Оксациллина натриевая соль
Oxacillinum-natrium (Б), ФХ
(натриевая соль 5-метил-3-фе-
нил-4-изоксазолилпенициллина)

0,5—1,0. Тб. 0,25

Rp.: Oxacillini-natrii 0,25

D. t. d. N. 40 in tab.

S. По 2 капсулы 4 раза в день

Окситетрациклина гидрохлорид
Oxytetracyclini hydrochloridum
(Б), ФХ

0,5 (2,0). П. в. р. Тб. 0,1 и 0,2.
Тб. 0,1 с экмолином. Тб. 0,1
с дифосфатом кальция. Мз.
(оф.) — 1%. Пр. во фл. 0,1
(активность 0,1 — 100 000 ЕД)

Rp.: Oxytetracyclini hydrochloridi 0,1

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1—3 таблетки 3—4 раза в день

Rp.: Oxytetracyclini hydrochloridi

Calcii diphosphatis aa 0,1

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1—3 таблетки 3—4 раза в день

Rp.: Oxytetracyclini hydrochloridi 0,1

Ecmolini 0,2

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1—3 таблетки 3—4 раза в день

Rp.: Oxytetracyclini hydrochloridi 0,1

D. t. d. N. 3

S. Содержимое 1 флакона растворить в 5 мл 2% раствора
новокаина, тщательно взболтать; вводить внутримы-
шечно по 2—3 мл 2—3 раза в сутки

Окситетрациклина дигидрат Oxytetracyclini dihydras (Б), ФХ	0,5 (2,0). П. в тр. Тб. 0,1 и 0,2
---	-----------------------------------

Rp.: Oxytetracyclini dihydratis 0,2
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 1—3 таблетки 3—4 раза в день

Олеандомицина фосфат Oleandomycini phosphas (Б)	500 000 ЕД (2 000 000 ЕД). П. в. р. Тб. 125 000 и 250 000 ЕД
--	---

Rp.: Oleandomycini phosphatis 250 000 ЕД
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 1 таблетке 4—6 раз в день

Олететрин Oletetrinum (Б)	0,25 (2,0). Тб. 0,125 и 0,25 (комбинированный препарат, состоящий из 1 части олеандо- мицина фосфата и 2 частей тетрациклина)
--	---

Rp.: Oletetrini 0,25
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Пантомицин Pantomycinum (Б)	0,5—1,0. П. в. р. Фл. 0,5, 0,25 и 0,1 (в 1 мг содержится 1000 ЕД)
--	---

Rp.: Pantomycini 0,5
D. t. d. N. 10
S. По 0,5 внутримышечно 2 раза в день, перед употребле-
нием растворить в 2—3 мл 0,25% стерильного раствора
новокаина

Пеницилиновая мазь Unguentum Penicillini	Мз. (оф.) — содержит в 1 г осно- вы 500 ЕД кальциевой соли пенициллина
---	--

Rp.: Ung. Penicillini 10,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Полимиксина М сульфат Polymyxini M sulfas (Б)	5000 ЕД. П. в. р. Тб. 100 и 500 тыс. ЕД. Мз. (оф.) с содержа- нием в 1 г 20 000 ЕД
--	--

Rp.: Tab. Polymyxini M sulfatis 500 000 ЕД N. 20
D. S. По 1 таблетке 4—6 раз в сутки

Rp.: Ung. Polymyxini 25,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи и
слизистых

Ристомидина сульфат Ristomycini sulfas (Б)	500 000—750 000 ЕД. П. в. р. Фл. 25 000 и 500 000 ЕД
---	---

Rp.: Ristomycini sulfatis 500 000 ЕД
D. t. d. N. 10
S. Содержимое 1 флакона растворить в 250 мл воды для инъекций; для одного внутривенного вливания (капельным способом)

Синтомицин Syntomycinum (Б)	1,5 (6,0). П. в. тр. Эм. 1; 5 и 10%. Сп. Лзм. 1; 5 и 10%
--	---

Rp.: Emulsii Synthomycini 10% 5,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи и слизистых
Rp.: Lin. Synthomycini 5% 10,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи и слизистых

Стрептодимицин Streptodimycinum (Б)	500 000—1 000 000 ЕД в сутки. П. в. р. Фл. 500 000 и 1 000 000 ЕД (смесь равных количеств сульфатов стрептомицина и дигидрострептомицина)
--	--

Rp.: Streptodimycini 500 000 ЕД
D. t. d. N. 5
S. Содержимое 1 флакона развести в 2 мл 0,5% раствора новокаина; внутримышечно 1—2 раза в день

Стрептомициллин Streptomycillinum (Б)	900 000 ЕД. П. в. р. Фл. 900 000 ЕД. Состав: калиевая соль бензилпенициллина — 100 000 ЕД, новокаиновая соль бен- зилпенициллина — 300 000 ЕД, сульфаты стрептомицина и дигидрострептомицина — аа 250 000 ЕД
--	---

Rp.: Streptomycillini 900 000 ЕД
D. t. d. N. 6
S. Содержимое 1 флакона развести 2 мл 0,25% раствора новокаина, хорошо взболтать, полученную суспензию ввести в верхний наружный квадрант ягодицы

Стрептомицина сульфат Streptomycini sulfas (Б), ФХ	1,0 (2,0). П. в. р. Фл. 0,25, 0,5 и 1,0 (активность 0,1—100 000 ЕД)
---	--

Rp.: Streptomycini sulfatis 0,25
D. t. d. N. 10
S. Содержимое 1 флакона растворить в 3 мл 0,25% раствора новокаина; внутримышечно 2 раза в день

Стрептомицина хлоркальциевый комплекс <i>Streptomycini et Calcii chloridum</i> (Б)	1,0 (2,0). П. в. р. Фл. 0,25%, 0,5 и 1,0 (применяется главным образом для субарахноидального введения)
---	---

Rp.: Streptomycini-calcii chloridi 1,0

D. t. d. N. 3

S. Для эндолюмбального или субокципитального введения 1 раз в день — содержимое 1 флакона развести в 10 мл стерильного изотонического раствора хлорида натрия, набрать в шприц нужное количество (от 1 до 10 мл) и дополнительно набрать в шприц 2—5 мл изотонического раствора хлорида натрия

Тетрациклин <i>Tetracyclinum</i> (Б), ФХ Тетрациклина гидрохлорид <i>Tetracyclini hydrochloridum</i> (Б), ФХ	0,5 (2,0). Активность 0,1—100 тыс. ЕД. П. в. тр. Мз. Р-ры. Тб. 0,1 и 0,2
---	--

Rp.: Tetracyclini 0,1

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 4—6 раз в сутки

Rp.: Sol. Tetracyclini hydrochloridi 0,5% 5,0

D. S. Глазные капли

Rp.: Ung. Tetracyclini hydrochloridi 0,5% 5,0

D. S. Глазная мазь

Тетрациклин-основание с нистатином <i>Dragée Tetracyclini cum Nistatino</i> (Б)	(2 000 000). Држ. (оф.). Состав: по 100 000 ЕД каждого антибиотика
--	--

Rp.: Dragée Tetracyclini cum Nistatino á 100 000 ЕД

D. t. d. N. 100

S. По 1—2 драже до 6 раз в сутки

Феноксиметилпенициллин <i>Phenoxymethylpenicillinum</i> (Б), ФХ	0,1—0,2 (0,5—1,0). П. в. тр. Држ. и Тб. 0,1 и 0,25
--	--

Rp.: Phenoxymethylpenicillini 0,1

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1—2 таблетки 4—5 раз в день

Хлортетрациклина гидрохлорид (биомицин)	0,5 (2,0). П. в. гр. Тб. 0,1 и 0,15. Кпс. Мз. (активность 1,0—1 000 000 ЕД)
Chlortetracyclinum hydrochlori- dum (Biomycinum) (Б), ФХ	

- Rp.: Chlortetracyclini hydrochloridi 0,1
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 2 таблетки 5 раз в день
- Rp.: Chlortetracyclini hydrochloridi 0.25
D. t. d. N. 20 in caps. gelat.
S. По 1 капсуле 4—5 раз в день
- Rp.: Chlortetracyclini hydrochloridi 0,1
Vasellini 10,0
M. f. ung.
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи
- Rp.: Ung. Chlortetracyclini ophthalmici 0,5% 10,0
D. S. Глазная мазь

Экмолин Ecmolinum	Ж. (оф.). Фл. 10,0
----------------------	--------------------

- Rp.: Ecmolini 10,0
D. S. Капли в нос

Экмоновоциллин-1 Ecmovovocillinum-1	300 000—600 000 ЕД. Суспензия новокаиновой соли пеницил- лина (300 000 или 600 000 ЕД) в водном растворе экмолина (соответственно 2,5 и 5,0). Выпускается в двух разных флаконах — непосредственно перед употреблением смеши- ваются
--	--

- Rp.: Ecmovovocillini-1 á 300 000 ЕД
D. t. d. N. 6
S. По 300 000 ЕД внутримышечно 1 раз в день

Экмоновоциллин-2 Ecmovovocillinum-2	300 000—600 000 ЕД. Суспензия экмоновоциллина-1 с добав- лением калиевой или натрие- вой соли пенициллина по 100 000 ЕД на каждые 300 000 ЕД новокаиновой соли пени- циллина
--	--

- Rp.: Ecmovovocillini-2 á 600 000 ЕД
D. t. d. N. 4
S. 600 000 ЕД внутримышечно 1 раз в день (непосредст-
венно перед употреблением смешать с прилагаемым
растворителем)

Эритромицин
Erythromycinum (Б), ФХ

0,5 (2,0). П. в. тр. Тб. 0,1 и 0,2
Мз. (оф.) — 1%

Rp.: Erythromycini 0,1

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке во время еды через каждые 4—6 ч

Rp.: Ung. Erythromycini 10,0

D. S. Смазывать пораженные участки кожи; глазная мазь

Еусинтомицин
Eusynthomycinum (Б)

1,0—2,0. П. в. нр. Пр. Тб. 0,5.
Сироп

Rp.: Eusynthomycini 1,0

D. t. d. N. 20

S. По 1 порошку 4 раза в день

Rp.: Eusynthomycini 0,5

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 2 таблетки 4 раза в день

Эфициллин
Aephycillinum (Б)

250 000—500 000 ЕД. П. в. тр.
Фл. 100, 200, 300 и 500 тыс. ЕД

(гидролит β-диэтиламиноэти-
лового эфира бензилпеницил-
лина)

Rp.: Aephycillini 500 000 ЕД

D. t. d. N. 6

S. По 500 000 ЕД внутримышечно 1 раз в день; перед употреблением ввести во флакон 4 мл 0,5% раствора новокаина, хорошо взболтать (получается суспензия)

Зарубежные препараты

Геомицин (Югославия)
Geomycinum (Б)

0,25—0,5. Тб. 0,25. Пр. в амп.
0,25

(соответствует отечественному
препарату окситетрациклину)

Rp.: Geomycini 0,25

D. t. d. N. 50 in tab.

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Rp.: Geomycini in amp. á 0,25

D. t. d. N. 10

S. Содержимое 1 ампулы растворить в 5 мл 2% раствора новокаина; для внутримышечного введения 2 раза в сутки

Герамин ** Geramycinum (Б)	0,0004—0,0008 на 1 кг веса. Пр. в ампл. — 0,04 (прилагается растворитель)
-------------------------------	---

Rp.: Geramycini in amp. á 0,04

D. t. d. N. 10

S. Содержимое 1 ампулы растворить в прилагаемом растворителе или в 1 мл воды для инъекций; для внутримышечного введения 2 раза в сутки (для больного весом 60—70 кг)

Метициллина натриевая соль (Венгрия) Methicillinum-natrium (Б), ФХ	1,0. П. в. р. Пр. во фл. 0,5 и 1,0 (полусинтетический пенициллин)
--	--

Rp.: Methicillini-natrii 1,0

D. t. d. N. 10

S. Содержимое 1 флакона растворить в 1,5 мл воды для инъекций; для внутримышечных инъекций через каждые 6 ч

Оксикорт (Польша) Oxycortum	Мз. (оф.), состав: основание тетрациклина — 3% и гидро- кортизона ацетат — 1%
--------------------------------	---

Rp.: Oxycorti 10,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи и слизистых

Оксикорт-аэрозоль (Польша) Oxycortum-aaerозolum (Б)	Наружно (оф.) — флакон содержит: гидрокортизона — 0,1, окситетрациклина гидрохлорида — 0,3, vehiculum — до 75,0
--	---

Rp.: Oxycorti-aaerозoli N. 1

D. S. Непосредственно перед применением встряхнуть флакон; снять колпачок; держа флакон вертикально, нажать на вентиль и в течение 1—3 сек с расстояния 20—30 см от пораженной поверхности распылять препарат

Пентрексил (Югославия) Pentrexylum (Ampicillinum) (Б) [натриевая соль D(—)-α-амино- бензилпенициллина]	В/м и В/в — 0,25. П. в. р. Фл. 0,25 с приложением растворителя
---	---

Rp.: Pentrexyl 0,25

D. t. d. N. 10

S. Растворить содержимое 1 флакона в прилагаемом растворителе. Вводить внутримышечно или (медленно) внутривенно 3—4 раза в день

Пропер-мил (**) Proper-mylum (Б)	0,01. Пр. в ампл. емкостью 5,0 — по 0,01 (лиофилизированный препарат из комплекса грибов — сахаромикетов)
---	--

Rp.: Proper-myli 0,01
D. t. d. N. 20 in amp.
S. Растворить содержимое 1 ампулы в 5 мл 5% раствора глюкозы; для одного внутривенного введения

Рифадин (Югославия) Rifadinum (Б)	0,15—0,3. Кпс. 0,15 и 0,3
--	----------------------------------

Rp.: Rifadini 0,15
D. t. d. N. 100 in caps.
S. По 1—2 капсулы 3 раза в день (при лечении туберкулеза легких дневная доза — 3—4 капсулы — дается в один прием)

Рондомицин (Югославия) Randomycinum (Б) (6-метилен-5-гидроокситетрациклин)	0,15—0,3. Кпс. 0,15 и 0,3
--	----------------------------------

Rp.: Randomycinum 0,15
D. t. d. N. 16 in caps.
S. По 1—2 капсулы 2 раза в день

Тетраолеан (Болгария) Tetraoleanum (Б)	0,25—0,75. Тб. (оф.) по 0,25. Состав: тетрациклина гидрохлорид — 67% и олеандомицин — 33%
---	---

Rp.: Tab. Tetraoleani N. 50
D. S. По 1 таблетке каждые 4 ч или по 2 таблетки каждые 6 ч (в тяжелых случаях по 3 таблетки 4 раза в сутки)

Циклосерин (Югославия) Cycloserinum (Б)	0,25. П. в. р. Тб. 0,25
--	--------------------------------

Rp.: Cycloserini 0,25
D. t. d. N. 20 in tab.
S. В первый день 1 таблетку, во 2-й день по 1 таблетке 2 раза в день, в дальнейшем по 1 таблетке 3 раза в день

СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Дисульформин Disulforminum	1,0. П. в. нр. Тб. 0,5 и 1,0. Пр.
---	--

Rp.: Disulformini 1,0
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 6 раз в день

Rp.: Disulformini 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 2 таблетки 6 раз в день

Норсульфазол Norsulfazolum (Б), ФХ	2,0 (7,0). П. в. тр. Пр. Тб. 0,25 и 0,5
---------------------------------------	--

Rp.: Norsulfazoli 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 2 таблетки 6 раз в сутки (первый прием — 4 таблетки)

Норсульфазол-натрий Norsulfazolum-natrium (Б), ФХ	2,0 (7,0). П. в. р. Р-ры
--	--------------------------

Rp.: Sol. Norsulfazoli-natrii 5% 20,0
Sterilisetur!
D. S. По 10—20 мл внутривенно 1—2 раза в сутки

Норсульфазола серебряная соль Norsulfazolum-argentum colloi- dale	Ж. (оф.) — 15% коллоидно-дис- персный препарат
---	---

Rp.: Norsulfazoli-argenti colloidalis 50,0
D. S. Для лечения ран

Стрептоцид Streptocidum (Б), ФХ	2,0 (7,0). П. в. тр. Пр. Тб. 0,3 и 0,5. Мз. (оф.) — 10%. Эм. и Лзм. (оф.) — 5%
------------------------------------	--

Rp.: Streptocidi 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 2 таблетки каждые 4 ч (первый прием — 4 таблетки)

Rp.: Ung. Streptocidi 15,0
D. S. Для лечения ран

Rp.: Emuls. Streptocidi 30,0
D. S. Для лечения ран

Стрептоцид растворимый Streptocidum solubile (Б), ФХ	1,0—1,5. П. в. р. Р-ры
---	------------------------

Rp.: Streptocidi solubilis 5,0
Sol. Glucosi 1% 100,0
M. Sterilisetur!
D. S. По 20 мл внутривенно 1—2 раза в день

Rp.: Sol. Streptocidi solubilis 1,5% 100,0
Sterilisetur!
D. S. По 50—100 мл 1—2 раза в день внутримышечно

Rp.: Streptocidi solubilis 1,5
Sol. Natrii chloridi isotonicae 100,0
M. Sterilisetur!
D. S. Подкожно для 1 инъекции

Сульгин
Sulginum (Б), ФХ

2,0 (7,0). П. в. тр. Тб. 0,5. Пр.

Rp.: Sulgini 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 2 таблетки 6 раз в сутки

Сульфадимезин
Sulfadimezinum (Б), ФХ

2,0 (7,0). П. в. тр. Тб. 0,25 и
0,5. Пр.

Rp.: Sulfadimezini 0,5
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 2 таблетки 6 раз в сутки (на 1 прием 4 таблетки)

Rp.: Sulfadimezini
Sulfazini aa 0,5
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 6 раз в сутки (на 1 прием 2 порошка)

Сульфадиметоксин
Sulfadimethoxinum (Б)

1,0—2,0. П. в. тр. Тб. 0,5

[6-(пара-аминобензолсульфами-
до)-2,4-диметоксипиримидин]

Rp.: Sulfadimethoxini 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 4 таблетки в 1 день лечения в один прием, затем по
2 таблетки 1 раз в день

Сульфазин
Sulfazinum (Б)

1,0—2,0. П. в. тр. Пр. Тб. 0,5

Rp.: Sulfazini 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 2 таблетки через каждые 4 ч

Rp.: Sulfazini
Methylsulfazini aa 0,5
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку через каждые 4 ч

Сульфапиридазин Sulfapyridazinum (Б) [6-(пара-аминобензолсульфами- до)-3-метоксипиридазин]	0,5—1,0. П. в. тр. Пр. Тб. 0,5
---	--------------------------------

Rp.: Sulfapyridazini 0,5
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 2—4 таблетки в первый день лечения и по 1 таблетке
в день в последующие дни

Сульфацил Sulfacylum (Б)	0,5—1,0. П. в. тр. Пр. Тб. 0,5
---	--------------------------------

Rp.: Sulfacyli 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 2 таблетки 6 раз в сутки (на первый прием 4 таблетки)

Сульфацил-натрий (альбуцид- натрий) Sulfacylum-natrium (Б), ФХ	2,0 (7,0). П. в. р. Р-ры. Мз. 10—30%
---	---

Rp.: Sol. Sulfacyli-natrii 30% 10,0
D. S. Глазные капли

Rp.: Ung. Sulfacyli-natrii 20% 5,0
D. S. Глазная мазь

Сунорэф — мазь Unguentum Sunorephum	Наружно. Мз. (оф.) — состав: стрептоцид, сульфадимезин и норсульфазол — аа 0,75, эфед- рина гидрохлорид — 0,15, камфора — 0,45, масло эвкалип- товое — 1,5 кл., мазевая основа — до 15,0
--	--

Rp.: Ung. Sunorephi 15,0
D. S. Мазь в нос

Уросульфан Urosulfanum (Б), ФХ	2,0 (7,0). П. в. тр. Пр. Тб. 0,5
---	----------------------------------

Rp.: Urosulfani 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 2 таблетки 6 раз в сутки

Уросульфан-натрий Urosulfanum-natrium (Б)	0,5—3,0. П. в. р. Р-ры
--	------------------------

Rp.: Sol. Urosulfani-natrii 20% 20,0
Sterilisetur!
D. S. По 10 мл внутривенно (медленно) 1—2 раза в сутки

Фтазин 0,5—1,0. П. в. тр. Тб. 0,5
Phthazinum
[6-(пара-фталиламинобензосуль-
фамидо)-3-метоксипиридазина]

Rp.: Phthazini 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 2 таблетки 2 раза в день в первый день лечения,
затем по 1 таблетке 2 раза в день

Фталазол 2,0 (7,0). П. в. нр. Тб. 0,5. Пр.
Phthalazolum (Б), ФХ

Rp.: Phthalazoli 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 2 таблетки 6 раз в первые и вторые сутки, в даль-
нейшем — по схеме

Этазол 2,0 (7,0). П. в. нр. Тб. 0,5 и 0,25
Aethazolum (Б), ФХ

Rp.: Aethazoli 0,5
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 2 таблетки через каждые 4 ч

Этазол-натрий 2,0 (7,0). П. в. р. Амп. 10,0—10
Aethazolum-natrium (Б), ФХ и 20%

Rp.: Sol. Aethazoli-natrii 10% 10,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 5—10 мл внутривенно (медленно!)

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ¹

Бепаск (12,0—16,0 в сутки). П. в. нр.
Bepascum, ФХ Пр. Тб. 0,5
(кальциевая соль пара-бензои-
ламиносалициловой кислоты)

Rp.: Bepasci 3,0
D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 4—5 раз в сутки (размешать в 1/2 стакана
щелочной минеральной воды)

¹ См. также стрептомицин и его соли, рифадин.

Изониазид (тубазид)	0,6 (0,9). П. в. р. Пр. Тб. 0,1
Isoniazidum (Tubazidum)	и 0,2. Р-ры. Спп.
(Б), ФХ	

Rp.: Isoniazidi 0,15
 Sacchari 0,2
 M. f. pulv. D. t. d. N. 20
 S. По 1 порошку 3 раза в день, постепенно увеличивая дозу до 3 порошков на прием

Rp.: Sol. Isoniazidi 1% 100,0
 Sterilisetur!
 D. S. Для промывания полостей

Rp.: Isoniazidi 0,2
 Butyri Casao q. s.
 M. f. suppos. D. t. d. N. 10
 S. По 1 свече 3 раза в день в прямую кишку

Канамицина моносульфат	1,0 (4,0). П. в. р. Пр. во фл. 0,5
Kanamycini monosulfas (Б),	и 1,0 (в 1 мг содержится
ФХ	1000 ЕД)

Rp.: Kanamycini monosulfatis 0,5
 D. t. d. N. 10
 S. Содержимое 1 флакона развести в 3—4 мл 0,5% раствора новокаина; для внутримышечного введения 2 раза в день

Кризанол	2 мл. Вз. (оф.), состав: 5 и 10%
Chrysanolum	суспензия ауротиопропанол- сульфоната кальция и глюко- ната кальция в персиковом масле. Амп. 2,0

Rp.: Suspens. Chrysanoli 5% 2,0
 D. t. d. N. 10 in amp.
 S. По 2 мл внутримышечно 1 раз в день (курс — 10 инъекций с промежутками в 2—5 дней)

Ларусан	0,1—0,5. П. в. нр. Пр. Тб. 0,1,
Larusanum (Б)	0,3 и 0,5

Rp.: Larusani 0,3
 D. t. d. N. 20 in tab.
 S. По 1 таблетке 3 раза в день

Метазид	0,2—0,5. П. в. нр. Пр. Тб. 0,1,
Methazidum (Б)	0,3 и 0,5

Rp.: Methazidi 0,3
 D. t. d. N. 20 in tab.
 S. По 1 таблетке 2 раза в день (при хорошей переносимости — до 6—7 таблеток в день)

Натрия пара-аминосалицилат
(ПАСК-Na)
Natrii para-aminosalicylas, ФХ

6,0—16,0 в сутки. П. в. р.
Пр Тб. 0,5 и 1,0

Rp.: ПАСК-Na 4,0
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 3 раза в день (растворить в $\frac{1}{2}$ стакана
теплой воды)
Rp.: ПАСК-Na 0,5
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 6—8 таблеток 3 раза в день

Пасомидин
Pasomycinum (Б)
(дигидрострептомицинпаскат)

В/м 500 000—1 000 000 ЕД
П. в. р. Фл. 250, 500 тыс. и
1 млн. ЕД

Rp.: Pasomycini 500 000 ЕД
D. t. d. N. 6
S. По 500 000 ЕД внутримышечно 1 раз в день (содержи-
мое 1 флакона растворить в 3 мл 0,25% раствора ново-
каина)

Пиразинамид
Pyrazinamidum (Б)
(амид пиразинкарбоновой ки-
слоты)

0,5. Тб. 0,5

Rp.: Pyrazinamidi 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—5 раз в день после еды

Салюзид
Saluzidum (Б)

0,5. П. в. нр. Пр. Тб. 0,3 и 0,5

Rp.: Saluzidi 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день
Rp.: Saluzidi 0,5
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Салюзид растворимый
Saluzidum solubile (Б)

(2,0). П. в. р. Пр. Ампл. 10,0—
10% и 1,0 2,0 и 10,0 — 5%

Rp.: Sol. Saluzidi solubilis 5% 10,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S.: 1) по 2—10 мл подкожно или внутримышечно 1—2 раза
в день; 2) по 1,5—2,5 мл в спинномозговой канал;
3) по 2—3 мл интратрахеально

Солютизон
Soluthizonum (Б)

П. в. тр. Р-ры 1 и 2%

Rp.: Sol. Soluthizoni 1% 10,0

D. S. По 3—5 мл для ингаляции; по 3—5 мл интратрахеально и внутрибронхиально (при помощи горланого шприца)

Стрептосалюзид
Streptosalizidum (Б)

0,5. П. в. р. Пр. во фл. 0,5 и 1,0

Rp.: Streptosalizidi 0,5

D. t. d. N. 6

S. Содержимое 1 флакона растворить в 1 мл 2% раствора новокаина; на 1 внутримышечную инъекцию 1 раз в день (при хорошей переносимости суточную дозу можно увеличить до 2 г)

Сульфонин (сульфаметин)
Sulfoninum (Sulfamethinum) (Б)

П. в. тр. Пр. Мз. Вз.

Rp.: Sulfonini 0,5

Glycerini 10,0

M. Steriliseturi

D. S. По 1—2 мл в околоуставные очаги 1 раз в 7—10 дней; перед употреблением подогреть и тщательно взболтать

Rp.: Sulfonini 2,0

Vaselini ad 20,0

M. f. ung.

D. S. Для введения в свищи и для смазывания язв

Тиоацетазон (тибон)
Thioacetazonum (Tibonum) (Б)
(тиосемикарбазон пара-ацетаминобензальдегида)

0,1 (0,2). П. в. в. тр. Тб. 0,01,
0,025 и 0,05

Rp.: Thioacetazoni 0,01

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день, постепенно повышая дозу до 5 таблеток в день (в течение 3 недель)

Rp.: Thioacetazoni 0,025

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 2 таблетки 3 раза в день (на 4-й неделе лечения)

Флоримицина сульфат
Florimycini sulfas (Б)

1 000 000 ЕД (2 000 000 ЕД).
П. в. р. Пр. во фл. по 500 000
и 1 000 000 ЕД

Rp.: Florimycini sulfatis 500 000 ЕД

D. t. d. N. 10

S. Внутримышечно по 500 000 ЕД 2 раза в день; перед употреблением развести в 3—4 мл 0,5% раствора новокаина

Фтивазид
Phthivazidum (Б), ФХ

1,0 (2,0). П. в. нр. Тб. 0,1, 0,3
и 0,5

Rp.: Phthivazidi 0,5

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Циазид
Cyazidum (Б)
(гидразид циануксусной кислоты)

0,1. П. в. р. Тб. 0,05. Пр. в.
фл. 0,25 (для приготовления
растворов ex tempore!)

Rp.: Cyazidi 0,05

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 2 таблетки 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Cyazidi 5% 10,0

D. S. Глазные капли

Этионамид
Ethionamidum (Б)
(тиоамид- α -этилизоникотиновой кислоты)

0,25. Тб. 0.25. Спп.

Rp.: Ethionamidi 0,25

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день после еды

Rp.: Ethionamidi 0,5

Butyri Casao q. s.

M. f. suppos. D. t. d. N. 10

S. По 1 свече в задний проход 3 раза в день

Этоксид
Aethoxydum (Б), ФХ
(4,4'-диэтокситиокарбанилид)

1,5 (4,5). П. в. р. Тб. 0,25 и 0,1

Rp.: Aethoxydi 0,25

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке в день, постепенно увеличить дозу до 4 таблеток 2—3 раза в день

Зарубежные препараты

ИНХА-17 (Болгария)	0,3—0,45. Тб. 0,3
INHA-17 (Б) (пара-ацетаминобензальдегид- изоникотиноилгидразон)	

Рр.: INHA-17 0,3
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—1½ таблетки 3 раза в день

Миамбутол (Югославия)	0,1—0,4. Тб. 0,1 и 0,4
Myambutolum (Б)	

Рр.: Myambutoli 0,1
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день, постепенно увеличивая
дозу в зависимости от состояния

ПРОТИВОМАЛЯРИЙНЫЕ СРЕДСТВА

Акрихин	0,3 (0,6). П. в. р. Тб. 0,05
Acrichinum (Б), ФХ	и 0,1

Рр.: Acrichini 0,1
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Бигумаль	0,3 (0,6). П. в. тр. Тб. 0,05
Bigumalum (Б), ФХ	и 0,1

Рр.: Bigumali 0,1
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 3 таблетки 1 раз в день в течение 5 дней (затем про-
должают лечение хиноцидом)

Галохин (циклохин)	0,3. П. в. нр. Тб. 0,05 и 0,1
Halochinum (Cyclochinum) (Б)	

Рр.: Halochini 0,1
D. t. d. N. 3 in tab.
S. По 3 таблетки 1 раз в день в течение 3 дней

Плазмоцид
Plasmocidum (Б), ФХ

0,03 (0,06). Входит как составная часть в таблетки с акрихином и бигумалем. Отдельно не применяют!

Rp.: Acrichini 0,1
Plasmocidi 0,02
Methyleni coerulei 0,00025
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Acrichini 0,05
Plasmocidi 0,01
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Bigumali 0,05
Plasmocidi 0,01
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Acrichini 0,1
Plasmocidi 0,02
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Acrichini
Bigumali aa 0,1
Plasmocidi 0,02
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Bigumali 0,1
Plasmocidi 0,02
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Хингамин
Chingaminum (Б), ФХ
[дифосфат-7-хлор-4(4-диэтил-
аминометил-бутиламино)-хи-
нолина]

0,5 (1,5). П. в. р. Пр. Тб. 0,25
Амп. 5,0—5%

Rp.: Chingamini 0,25
D. t. d. N. 6 in tab.
S.: 1) по 1 таблетке 2 раза в первый день, затем по 2 таблетки 1 раз в день в течение двух дней (при малярии);
2) по 2 таблетки 1 раз в день в течение 10 дней за 2—3 ч до сна, а затем по 1 таблетке в день в течение 2—3 месяцев (при инфекционном неспецифическом полиартрите)

Хинина гидрохлорид Chinini hydrochloridum, ФХ	0,5. П. в. р. Тб. 0,25 и 0,5
Rp.: Chinini hydrochloridi 0,5 D. t. d. N. 20 in tab. S. По схеме: 1-й цикл — по 1 таблетке 2—3 раза в день в течение 4 дней	
Хинина дигидрохлорид Chinini dihydrochloridum, ФХ	0,05. П. в. р. Пр. Амр. 1,0—50%
Rp.: Sol. Chinini dihydrochloridi 50% 1,0 D. t. d. N. 10 in amp. S.: 1) по 1—2 мл подкожно в 10 мл изотонического раствора хлористого натрия; 2) по 1 мл внутривенно в 20 мл 40% раствора глюкозы	
Хинина сульфат Chinini sulfas, ФХ	0,5. П. в. нр. Тб. 0,25 и 0,5
Rp.: Chinini sulfatis 0,5 D. t. d. N. 20 in tab. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день (далее по схеме)	
Хиноцид Chinocidum (Б), ФХ	0,03 (0,03). П. в. р. Држ. 0,005 и 0,01. Пр.
Rp.: Dragée Chinocidi 0,01 D. t. d. N. 30 S. По 3 драже 1 раз в день после еды в течение 10 дней	
Хлоразин Chlorazinum (Б) (2,4-диамино-2-пара-хлорфенил-1,6-дигидро-6,6'-диметил-1,3,5-триазина гидрохлорид)	0,1—0,2. Пр. Тб. 0,1 и 0,15
Rp.: Chlorazini 0,15 D. t. d. N. 12 in tab. S. По 1 таблетке 2 раза в день в течение 5 дней (в первый день доза может быть удвоена)	
Хлоридин Chloridinum (Б) (2-4-диамино-5-пара-хлорфенил-6-этил-пиримидин)	0,025—0,05. П. в. нр. Пр. Тб. 0,01 и 0,025
Rp.: Chloridini 0,025 D. t. d. N. 10 in tab. S. По 1—2 таблетки 1—2 раза в день в течение 2—4 дней	

Зарубежные препараты

Делагил (Венгрия) Delagilum (Б)	0,25—0,5. Тб. 0,25. Амп. 5,0—5%
(соответствует отечественному препарату хингамину)	

Rp.: Delagili 0,25
D. t. d. N. 8 in tab.
S. По 2 таблетки 2 раза в день в первый день лечения, затем по 2 таблетки 1 раз в день в течение 2 последующих дней. Для профилактики малярии — 2 таблетки 1 раз в неделю

Rp.: Sol. Delagili 5% 5,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 10 мл внутримышечно 1 раз в день в течение 8 дней (после улучшения состояния больного можно перевести на прием препарата внутрь)

Плаквенил (**) Plaquenilum (Б)	0,2—0,4. Тб. 0,2
(4-[1-метил-4-(этил-2-октэтил)-аминобутиламино]-7-хлорхинолин)	

Rp.: Tab. Plaquenili 0,2
D. t. d. N. 20
S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день

ПРОТИВОСИФИЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Органические препараты мышьяка

Миарсенол Myarsenolum (A), ФХ	В/м высшая разовая доза — 0,6 один раз в 5—6 дней. П. в. р. Пр. в амп. 0,15, 0,3, 0,45 и 0,6
----------------------------------	--

Rp.: Myarsenoli 0,3
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Содержимое 1 ампулы растворить в 1,5—2 мл воды для инъекций или в 2 мл 1% раствора новокаина; для одной внутримышечной инъекции за 2—3 ч до еды

Новарсенол Novarsenolum (A), ФХ	В/в. Дозы, расфасовка и форма рецепта такие же, как и у миарсенола
------------------------------------	--

Препараты висмута

Бийохинол Biiochinolum (Б)	В/м 3 мл (1 раз в 3 дня) Вз. (оф.). Содержит 8% йодвис- мутата хинина в нейтральном растительном масле. Фл. 100,0
---	---

Rp.: Biiochinoli 100,0

D. S. По 3 мл внутримышечно каждый 4-й день (перед употреблением подогреть и тщательно взболтать)

Бисмоверол Bismoverolum (Б)	В/м — 1 мл (1 раз в два дня). Суспензия (оф.) — 1 мл со- держит 0,05 металлического висмута. Фл. 100,0
--	--

Rp.: Bismoveroli 100,0

D. S. По 1 мл внутримышечно 2 раза в неделю (перед употреблением подогреть и тщательно взболтать)

Пентабисмол Pentabismolum (Б)	1—2 мл. Ж. (оф.). Амп. 2 мл со- держит: металлического вис- мута 2,2 части, новокаина — 1 часть, воды — 6,8 части
--	---

Rp.: Pentabismoli 2 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. На первую инъекцию 1 мл внутримышечно, затем по 2 мл через день

Препараты ртути

Ртути дийодид Hydrargyri diiodidum (А)	0,02 (0,06). П. в. гр. Р-ры
---	------------------------------------

Rp.: Hydrargyri diiodidi 0,1

Kalii iodidi 10,0

Aq. destill. 200,0

M. D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день после еды, запивать молоком

Ртути салицилат Hydrargyri salicylas (А)	Высшая доза В/м 0,1—1 раз в 5 дней. П. в. нр. Вэ 10%
---	---

Rp.: Hydrargyri salicylatis 1,0

Olei persicorum ad 10,0

M. Sterilisetur!

D. S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в 5 дней

Ртутнй цианид
Hydrargyri cyanidum (A)

В/м 0,02 (0,02). В/в 0,01
(0,01). П. в. р. Р-ры.

- Rp.: Sol. Hydrargyri cyanidi 2% 5,0
Sterilisetur!
D. S. По 1 мл внутримышечно через день
- Rp.: Sol. Hydrargyri cyanidi 0,02% 50,0
D. S. Примочка для глаз
- Rp.: Sol. Hydrargyri cyanidi 1% 10,0
Sterilisetur!
D. S. По 0,5—1 мл внутривенно 1 раз в день

ПРОТИВОЛЕЙШМАНИОЗНЫЕ, ПРОТИВОАМЕБНЫЕ
И ПРОТИВОТРИХОМОНАДНЫЕ СРЕДСТВА

Акрихиновый пластырь
Emplastrum Acrichinum

Пластырь (оф.) — состав: акрихин, спирт 95°, вода и ланолин безводный — аа 10 частей, метилсалицилат — 15 частей, свинцовый пластырь — 45 частей

- Rp.: Empl. Acrichini 50,0
D. S. Наносить шпателем слой в 1—2 мм на пораженные участки кожи

Аллилглицер
Allilglycerum

ГЖ. (оф.) — состав: сгущенный экстракт из лука и глицерин — аа. Фл. 100,0

- Rp.: Allilglyceri 100,0
D. S. Для смачивания влагалищных тампонов

Аминарсон
Aminarsonum (A), ФХ

0,25 (1,0). П. в. р. Тб. 0,25. Пр.

- Rp.: Aminarsoni 0,25
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Аминоакрихин
Aminoacrichinum (Б)

0,1—0,4. П. в. р. Тб. 0,1 и 0,3.
Пр. III.

- Rp.: Aminoacrichini 0,1
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Aminoacrichini 0,05

Butyri Cacao q. s.

M. f. suppos. vaginalis

D. t. d. N. 6

S. По 1 шарiku через 2—3 дня на ночь во влагалище

Аминохинол
Aminochinolum (Б)

0,15 (0,3—0,45). П. в. р. Тб.
0,025, 0,05, 0,1 и 0,15

Rp.: Tab. Aminochinoli 0,15

D. t. d. N. 15

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Лютенурин
Lutenurinum (Б)

П. в. с. р. Эм. 0,5%. Ш. Тб.
вагинальные — 0,003 (алка-
лоид, выделенный из корне-
вищ кубышки желтой)

Rp.: Emuls. Lutenurini 0,5% 200,0

D. S. Для смачивания тампонов (во влагалище)

Rp.: Sol. Lutenurini 0,5% 40,0

Sol. Novocaini 0,5% ad 200,0

M. D. S. Для промывания уретры

Rp.: Tab. Lutenurini 0,003

D. t. d. N. 20

S. Противозачаточные таблетки (перед применением сма-
чивать водой)

Метронидазол (флагил)
Metronidazolum (Flagylum) (Б)
(1-β-оксиэтил-2-метил-5-нитрои-
мидазол)

0,25. Тб. 0,25. Вагинальные
тб. 0,5

Rp.: Metronidazoli 0,25

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке внутрь 3 раза в день в первые 3 дня,
затем по 1 таблетке 2 раза в день в течение 5 дней

Rp.: Metronidazoli 0,5

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 1 раз в день под своды влагалища (в те-
чение 10—20 дней)

Нитазол
Nitazolum (Б)
(2-ацетиламино-5-нитротиазол)

0,1. П. в. тр. Тб. 0,1. Ш. 0,12
Суспензия 2,5%

Rp.: Nitazoli 0,1

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Nitazoli 0,12
Butyri Cacao q. s.
M. f. suppos. vaginalis
D. t. d. N. 20
S. По 1 шарiku во влагалище на ночь

Октилин
Octilinum

Эм. — содержит 1% или 3% н-октилового спирта и соответственно эмульгатора — 0,05% или 0,15% и глицерина безводного — 98,95% или 96,85%. Фл. 100,0. Ш. (оф.), состав: н-октиловый спирт — 0,1 и глюкоза — 0,3

Rp.: Emuls. Octilini 3% 100,0
D. S. Для смачивания тампонов для введения во влагалище и для обработки наружных половых органов

Rp.: Suppos. vaginalis Octilini N. 20
D. S. По 1 шарiku во влагалище на ночь

Rp.: Emuls. Octilini 1% 100,0
D. S. Для обработки наружного отверстия уретры и начальной части канала

Осарбон
Osarbonum

Ш. (оф.) содержат: осарсол — 0,25, глюкоза и борная кислота — аа 0,3, жировая основа — 2,0

Rp.: Supp. vaginalis Osarboni N. 10
D. S. По 1 шарiku в день во влагалище в течение 10 дней

Осарцид
Osarcidum (A)

Спп. (оф.) — состав: осарсол, борная кислота, глюкоза и стрептоцид — аа 0,3, жировая основа — 2,9

Rp.: Suppos. vaginalis Osarcidi N. 10
D. S. По 1 пессарию во влагалище в течение 10 дней

Солюсурьмин
Solusurminum (B)

0,15—0,5. П. в. р. Р-ры

Rp.: Sol. Solusurmini 5% 3,0
Sterilisetur!
D. S. По 3 мл внутривенно (подкожно, внутримышечно) 1 раз в день, постепенно увеличивая дозу на 1,5 мл ежедневно (до 8—10 мл)

Трихомонацид
Trichomonacidum (Б), ФХ

0,1—0,15. П. в. р. Тб. 0,025,
0,05 и 0,1. Ш.

Rp.: Trichomonacidi 0,1
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды

Rp.: Trichomonacidi 0,05
Butyri Cacao q. s.
M. f. suppos. vaginalis. D. t. d. N. 6
S. По 1 шарiku на ночь во влагалище

Урсалл
Ursallum (Б)

Ж. (оф.) — эфирная настойка
черемши

Rp.: Ursalli 50,0
D. S. Для смачивания влагалищных тампонов

Хиниофон (ятрен)
Chiniofonum (Yatrenum),
(Б), ФХ

1,0 (3,0). П. в. р. Тб. 0,5. Пр.

Rp.: Chiniofoni 0,5
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Chiniofoni 5,0
Talc. ad 50,0
M. f. pulv.
D. S. Присыпка

Эметина гидрохлорид
Emetini hydrochloridum
(Б), ФХ

0,05 (0,1). П. в. р. Амп. 1,0 —
1%

Rp.: Sol. Emetini hydrochloridi 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 3 мл внутримышечно 2 раза в день

Зарубежные препараты

Трихопол (Польша)
Trichopolum (Б)
(соответствует отечественному
препарату метронидазолу)

0,25. Тб. 0,25

Rp.: Trichopoli 0,25
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

ПРОТИВОГЛИСТНЫЕ СРЕДСТВА

Средства, применяющиеся преимущественно
для лечения кишечных нематодозов¹

Генцианвиолет (метиловый фиолетовый)	0,08—0,1. П. в. р. Пл. Кпс. Р-ры
--------------------------------------	----------------------------------

Gentianvioletum medicinale

Rp.: Sol. Gentianvioleti medicinalis sterilisatae 0,5% 20,0
D. S. По 20 мл внутривенно 1 раз в день

Rp.: Gentianvioleti medicinalis 0,08
D. t. d. N. 15 in caps. gelat.
S. По 1 капсуле 3 раза в день до еды

Rp.: Gentianvioleti medicinalis 3,0
Pulv. et extr. rad. Taraxaci q. s.
M. f. pilulae N. 30
D. S. По 1 пилюле 3 раза в день до еды

Гептилрезорцин Heptylresorcinum (B)	1,5 (1,5). П. в. нр. Тб. 0,1
---	------------------------------

Rp.: Heptylresorcini 0,1
D. t. d. N. 15 in tab.
S. На 1 прием натошак (по 1 таблетке через каждые 5 мин, не разжевывая)

Дитиазанин Dithiazaninum (B) (3-этил-2-[5-(3''-этил-2''-бензотиазолинилиден)-1',3'-пентадиенил]-бензотиазолий-йодид)	0,1. П. в. тр. Пр.
---	--------------------

Rp.: Dithiazanini 0,1
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день после еды

Дихлорофен Dichlorophenum (B) (2,2'-диокси-5,5'-дихлордифенилметан)	2,0. П. в. тр. Пр. (применяют в комбинации с фенасалом)
--	---

Rp.: Dichloropheni
Phenasali aa 2,0
M. f. pulv.
D. S. На 1 прием на ночь через 3 ч после легкого ужина; запить $\frac{1}{2}$ стакана горячей воды с $\frac{1}{2}$ чайной ложки соды

¹ См. также акрихин, аминокрихин, дитразин.

Нафтамон
Naphthammonum (Б), ФХ
(β-оксинафтоат-2-феноксизтил-
диметил-бензиламмония)

5,0 (5,0). П. в. тр. Пр.

Рр.: Naphthammoni 5,0

D. S. Принять натошак за 1—2 ч до завтрака в 30—50 мл
сахарного сиропа

Пижма — цветки
Flores Tanacetii

Сб.

Рр.: Flor. Tanacetii 100,0

D. S. 1 столовую ложку сбора заварить в стакане кипятку;
выпить в 1 прием натошак

Пиперазина адипинат
Piperazini adipinas, ФХ
(диэтилендиамина адипинат)

1,0. П. в. р. Тб. 0,2 и 0,5. Пр.

Рр.: Piperazini adipinatis 0,5

D. t. d. N. 30 in tab.

S. По 2 таблетки 3—4 раза в день после еды

Пиперазина сульфат
Piperazini sulfas

1,0. П. в. р. Тб. 0,2 и 0,5. Пр.

Рр.: Piperazini sulfatis 0,5

D. t. d. N. 30 in tab.

S. По 2 таблетки 3—4 раза в день после еды

Тетрахлорэтилен
Tetrachloraethylenum (Б)

Высшая разовая и суточная до-
за — 3 мл. Ж. Кпс.

Рр.: Tetrachloraethyleni 1,0

D. t. d. N. 3 in caps. gelat.

S. На 1 прием в течение получаса после еды

Тимол
Thymolum (Б), ФХ

1,0 (4,0). П. в. тр. Кпс.

Рр.: Thymoli 0,5

D. t. d. N. 18 in caps. gelat.

S. По 6 капсул в день (по 1 капсуле каждые 15 мин) натошак

Фенасал
Phenasalum (Б)
[5-хлор-N-(2'-хлор-4'-нитрофе-
нил) салициламид]

2,0. П. в. тр. Пр.

Rp.: Phenasali 2,0

D. S. На 1 прием на ночь через 3 ч после легкого ужина;
запить водой с $\frac{1}{2}$ чайной ложки соды

Хлоксил
Chloxylium (Б)

0,05. П. в. нр. Пр.

Rp.: Chloxyli 0,05

Sacchari 0,25

M. f. pulv. D. t. d. N. 6

S. По 3 порошка с интервалами в 20 мин натошак в течение двух дней

Цитварное семя
Flores Cinae, ФХ

Сб.

Rp.: Flor. Cinae 50,0

D. S. По 1 чайной ложке 3 раза в день за 2 ч до еды (с вареньем)

Средства, применяющиеся преимущественно
для лечения кишечных цестодозов

Гвимрин
Guimrinum

8,0—10,0. Тб. 0,5. Получен из
мужского папоротника, очи-
щен от токсических примесей

Rp.: Guimrini 0,5

D. t. d. N. 20 in tab.

S. Принять натошак в течение часа, запивая 1% раствором соды

Гранатник — кора
Cortex Granati

Дек. 1 : 4. Жидкий экстракт 50,0

Rp.: Dec. cort. Granati 50,0—200,0

D. S. Принять натошак с кофе в течение часа

Rp.: Extr. Granati fluidi 50,0

D. S. Принять натошак с кофе в течение часа

Мужской папоротник — густой
экстракт
Extractum Filicis maris spissum
(Б), ФХ

Высшая разовая доза — 8,0
(однократно). ГЖ. Кпс.

Rp.: Extr. Filicis maris spissi 0,5
D. t. d. N. 12 in caps. gelat. elasticis
S. Принять в течение часа натошак, запивая 1% раствором соды

Тыква — порошок из семян
Pulvis seminis Cucurbitae

60,0—80,0. Per se

Rp.: Pulv. seminis Cucurbitae 80,0
D. S. На 1 прием в небольшом количестве воды

Тыква — семена
Semen Cucurbitae

150,0—200,0

Rp.: Seminis Cucurbitae decorticatae 200,0
D. S. На 1 прием (растереть с вареньем)

Филиксан
Filixanum

(10,0). П. в. нр. Тб. 0,5. Сухой
экстракт из корневища муж-
ского папоротника

Rp.: Filixani 0,5
D. t. d. N. 16 in tab.
S. Принять в течение часа

Средства, применяющиеся преимущественно
для лечения внекишечных гельминтозов

Антимонила-натрия тартрат
(винносурьянонатриевая соль)
Stibio-natrium tartras (Б)

0,05—0,12. П. в. р. Р-ры. Мкс.
Приготавливать ex tempore!

Rp.: Stibio-natrii tartratis 0,1
Glucosi 0,5
Sol. Natrii chloridi isotonicae 10,0
M. Sterilisetur!
D. t. d. N. 3
S. По 10 мл внутривенно 3 раза в день с трехчасовыми интервалами

Гексахлорэтан
Hexachloroethanum (Б)

6,0—8,0. П. в. нр. Пр.

Rp.: Hexachloroethani 1,0

D. t. d. N. 12 in caps. gelat.

S. По 2 капсулы каждые 15 мин натошак — 6 капсул в первый день лечения, остальные 6 капсул — во второй день

Дитразина цитрат
Ditrazini citras (Б), ФХ

0,25 (0,75). П. в. р. Пр. Тб. 0,2

Rp.: Ditrazini citratis 0,2

D. t. d. N. 10 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день в течение 3 дней

Rp.: Ditrazini citratis 0,15

Sacchari 0,2

M. f. pulv. D. t. d. N. 30

S. По 1 порошку 3 раза в день в течение трех недель

Неостибозан
Neostibosanum (Б)

0,2. П. в. р. Пр. в амп. 0,2

Rp.: Neostibosani 0,2

D. t. d. N. 12 in amp.

S. Содержимое 1 ампулы растворить в 10 мл воды для инъекций; для внутривенного введения (медленно!) один раз в день

ПРОИЗВОДНЫЕ НИТРОФУРАНА И ОКСИХИНОЛИНА

Афунгил
Afungilum
(5-7-дихлоро-8-гидроксихиналь-
дина)

Мз. и Пст. (оф.)

Rp.: Ung. Afungili 20,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Нитрофурилен
Nitrofurylenum (Б)
(5-нитро-2-фурил-нитроэтилен)

П. в. тр. Мз. 0,05 и 1%. Р-ры

Rp.: Ung. Nitrofuryleni 1% 10,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Rp.: Sol. Nitrofuryleni spirituosae 0,05% 20,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Фурагин 0,1—0,2. П. в. тр. Тб. 0,05. Р-ры
Furaginum (Б)
(1-[β-(5-нитрофурил-2)-акрилин-аминогидантоин])

Rp.: Furagini 0,05
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 2 таблетки 8 раза в день после еды
Rp.: Sol. Furagini 1:13000—10,0
D. S. Глазные капли

Фурадонин 0,3 (0,6). П. в. тр. Тб. 0,05 и 0,1.
Furadoninum (Б), ФХ Пр.
(1-(5-нитро-2-фурфуриден-аминогидантоина))

Rp.: Furadonini 0,1
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день после еды

Фуразолидон 0,2 (0,8). П. в. тр. Тб. 0,05 и 0,1. Пр.
Furazolidonum (Б), ФХ
[N-(5-нитро-2-фурфуриден)-3-амино-2-оксазолидон]

Rp.: Furazolidoni 0,1
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день после еды

Фуразолин 0,1. П. в. тр. Тб. 0,05
Furazolinum (Б)
[3-морфолинометил-3-(5-нитро-2-фурфуриден-амино)-2-оксазолидон]

Rp.: Furazolini 0,05
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день после еды

Фуразонал 0,1. П. в. тр. Тб. 0,1
Furazonalum (Б)
[1-(5-нитро-2-фурфуриден-амино)-1,3,4-триазол]

Rp.: Furazonali 0,1
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Фурацилин
Furacilinum (Б), ФХ

0,1 (0,5). П. в. тр. Р-ры. Мз.
Тб. 0,1 — для внутреннего
употребления и 0,02 — для
наружного

Rp.: Sol. Furacilini 0,02% 200,0
D. S. Для полосканий, промываний

Rp.: Furacilini 0,1
Lanolini
Vaselini aa 25,0
M. f. ung.
D. S. Для смазывания кожи

Rp.: Furacilini 0,1
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 4 раза в день

Rp.: Sol. Furacilini 1 : 5000 — 10,0
D. S. Капли в нос

Rp.: Sol. Furacilini 1 : 5000—10,0
D. S. Глазные капли

Rp.: Furacilini 0,02
D. t. d. N. 6 in tab.
S. 5 таблеток залить $\frac{1}{2}$ л воды, кипятить до полного растворения (для лучшей растворимости добавить щепотку поваренной соли); для полосканий, промываний

Хинозол
Chinosolum, ФХ

П. в. р. Р-ры. Мз. Ш.

Rp.: Sol. Chinosoli 0,1% 200,0
D. S. Для промывания ран

Rp.: Sol. Chinosoli 5% 100,0
D. S. По 2 столовые ложки на кружку воды (для спринцеваний)

Rp.: Chinosoli
Acidi borici aa 0,2
Butyri Cacao q. s.
M. f. suppos. vaginalis
D. t. d. N. 10
S. По 1 шарiku во влагалище на ночь

Rp.: Ung. Chinosoli 5% 10,0
D. S. Для смазывания слизистых

Зарубежные препараты

Дермозолон (Венгрия) Dermosololum	Наружно. Мз. (оф.) — состав: преднизолон — 0,025, 5-хлор- 7-йод-8-оксихинолин — 0,15, мазевая основа — 5,0. Тубы — 5,0
--	--

Rp.: Dermosoloni 5,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Нитрофурантоин (Венгрия) Nitrofurantoinum (Б) (соответствует отечественному препарату фурадонину)	1—2 тб. Тб. 0,1
--	-----------------

Rp.: Tab. Nitrofurantoini 0,1
D. t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Мексаформ (Югославия) Mexaformum (Б)	1 држ. Држ. (оф.) — состав: дийодхлоргидрооксихиноли- на — 0,2, фенантролинхино- на — 0,02, бромида оксифено- ния — 0,002
---	---

Rp.: Dragée Mexaformi N. 50
D. S. По 1 драже 2—3 раза в день

Энтеросептол (Венгрия) Enteroseptolum (Б) (5-хлор-7-йод-8-гидрооксихино- лин)	1—2 држ. Држ. (оф.) — содер- жит 0,22 препарата
--	--

Rp.: Dragée Enteroseptoli N. 40
D. S. По 1—2 драже 3 раза в день

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА И ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ¹

Амиказол Amicazolum (Б), ФХ [2-диметиламино-6-(β-диэтила- миноэтокси)-бензтиазола ди- гидрохлорид]	П. в. р. Мз. 5%. Пр. 2 и 5%
--	-----------------------------

Rp.: Ung. Amicazoli 5% 15,0
D. S. Втирать в пораженные участки кожи на ночь

¹ См. также нистатин, гризеофульвин.

Rp.: Pulv. Amycazoli 2% 15,0

D. S. Присыпать пораженные участки кожи утром

Антипсориадикум
Antipsoriaticum (A)

Мз. (оф.) — содержит 0,001—
0,0025% трихлорэтиламина

Rp.: Antipsoriatici 100,0

D. S. Втирать в пораженные участки кожи 1 раз в день
по направлению роста волос

Декамин
Decaminum, ФХ
[1, 10-декаметилден-бис-(4-амино-
хинальдиний-хлорид)]

П. в. тр. Мз. эмульсионная
(оф.) — 0,5и 1%. Драже, со-
держащее 0,15 и 0,25 мг пре-
парата

Rp.: Ung. Decamini 0,5% — 50,0

D. S. Втирать в пораженные участки кожи

Rp.: Dragée Decamini 0,00015 N. 50

D. S. По 1 драже под язык или за щеку до полного рассасывания каждые 3—5 часов

Дихаск
Dichasum,
(2-хлоранилид-5-хлорсалици-
ловой кислоты)

П. в. нр. Мз. 1 и 3%

Rp.: Ung. Dichasci 1% 50,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Дустундан
Dustundanium

Пр. (оф.), состав: ундециленовая
кислота — 5%, цинковая соль
ундециленовой кислоты и ани-
лид салициловой кислоты —
аа 10%, тальк — 75%

Rp.: Dustundani 100,0

D. S. Присыпать пораженные участки кожи 1—2 раза
в день после смазывания их мазью «Цинкундан»

Ликватол
Liquatolum (Б)

Наружно 15,0—20,0. Ж. (оф.),
состав: тринитротолуол — 1,5
части, ацетон — 25 частей,
глицерин — 2 части, спирт
этиловый — 75 частей. Фл.
50,0

Rp.: Liquatoli 50,0

D. S. Для орошения, аппликаций, примочек при грибко-
вых поражениях кожи; не более 1 столовой ложки
на одно применение

Мазь «СТ»
Unguentum «ST»

Мз. (оф.) — состав: эмульсион-
ный солидол — 75 частей, ва-
зелин — 20 частей, борная
кислота — 5 частей, ментол —
0,5 части

Rp.: Ung. «ST» 100,0

D. S. Втирать в очаги поражения 1—2 раза в день по на-
правлению роста волос

Онихолизин
Onycholysinum

П- (оф.) — состав: сернистый
барий — 15 частей, тальк — 85
частей

Rp.: Onycholysini 10,0

D. S. 1 чайную ложку порошка размешать в холодной
кипяченой воде до получения кашицеобразной массы;
смазывать очаги поражения (для удаления ногтевых
пластинок при грибковых заболеваниях)

Псориазин
Psoriasinum (A)

Мз. (оф.) содержит 0,02% ди-
хлордиэтилсульфида

Rp.: Ung. Psoriasini 100,0

D. S. Втирать в пораженные участки кожи 1 раз в день
по направлению роста волос

Салициланилид
Salicylanilidum

Мз. 2 и 5%. Р-р (оф.) водно-
боратный

Rp.: Ung. Salicylanilidi 2% 20,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи и сли-
зистых

Rp.: Sol. Salicylanilidi 50,0

D. S. Для орошения очагов поражения слизистой ротовой
полости

Софорин
Sophorinum

Ж. (оф.) — настойка из свежих
плодов софоры японской

Rp.: Sophorini 50,0

D. S. Для лечения инфицированных ран

Сульсен
Sulsenum

Пст. (оф.) и мыло (оф.) — содер-
жат 2,5% сульсена (твердый
сплав селена — 55% и серы —
45%)

Rp.: Pastae Sulseni 30,0

D. S. 1 чайную ложку пасты втирать в кожу волосистой
части головы; через 5—10 мин вымыть волосы теплой
водой и тщательно вытереть

Rp.: Saponis Sulseni 25,0

D. S. Намылить влажные волосы 2—3 г мыла и втирать в кожу волосистой части головы; через 5—10 мин вымыть голову теплой водой и тщательно вытереть

Таллиевый пластырь
Emplastrum Thalium (Б)

(Оф.) — содержит 3 или 5% таллия ацетата

Rp.: Emplastri Thalii 3% 30,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи 1 раз в 5—7 дней (перед употреблением слегка подогреть; не более 8—9 г на одно применение)

Ундецин
Undecinum

Мз. (оф.) — состав: ундециленовая кислота и медная соль ундециленовой кислоты — аа 8%, парахлорфениловый эфир глицерина — 4% и 80% мазевой основы —

Rp.: Undecini 20,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Цинкундан
Zincundatum

Мз. (оф.), состав: ундециленовая кислота, цинковая соль ундециленовой кислоты и анилид салициловой кислоты — аа 10%, нежировая мазевая основа — 70%

Rp.: Ung. Zincundani 100,0

D. S. Втирать в пораженные участки кожи 2 раза в день, после чего припудривать эти места порошком «Ду-стундан»

Зарубежные препараты

Микосептин (Чехословакия)
Mycoseptinum

Мз. (оф.) — состав: ундециленовая кислота — 5%, ундециленовокислый цинк — 20%, мазевая основа — 70%

Rp.: Mycoseptini 30,0

D. S. Втирать ежедневно утром и вечером в пораженные участки кожи; курс лечения — 4—6 недель

Нитрофунгин (Чехословакия)
Nitrofunginum

Ж. (оф.) — состав: 2-хлор-4-нитрофенол — 1,0, триэтиленгликоль — 10,0, спирт 50° — до 100,0. Фл. 25,0

Rp.: Nitrofungini 25,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДРУГИХ ГРУПП

Бензилбензоат
Benzylil benzoas
(бензиловый эфир бензойной кислоты)

Наружно. Суспензия 20% водномыльная во флаконах по 100,0

Rp.: Susp. Benzylil benzoatis 20% 100,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи (при всех формах чесотки)

Диафенилсульфон
Diaphenylsulfonium (Б)
(4,4'-диаминодифенилсульфон)

0,05—0,1. П. в. нр. Тб. 0,02 и 0,05

Rp.: Diaphenylsulfoni 0,05

D. t. d. N. 15 in tab.

S. По 1 таблетке 2 раза в день

Кутизон
Cutizonum (Б)

0,005. П. в. тр. Тб. 0,005

Rp.: Cutizoni 0,005

D. t. d. N. 10 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Оксолин — мазь
Unguentum Oxolinum

Наружно. Мз. 0,25 и 5% (содержит тетраокситетрагидронафталин-дегидрат)

Rp.: Ung. Oxolini 0,25% 10,0

D. S. Смазывать слизистую носа 2 раза в день в период эпидемии гриппа (на протяжении 25 дней) для профилактики гриппа или при контакте с гриппозным больным

Солюсульфон
Solusulfonium

0,5—1,0. П. в. р. Р-ры. Мз.

Rp.: Sol. Solusulfoni 50% 5,0

Sterilisetur!

D. S. По 2 мл внутримышечно 2 раза в неделю (затем по схеме)

Rp.: Ung. Solusulfoni 10% 10,0
D. S. Для лечения язв при лепре

Циминаль
Ciminalum (Б)
(п-нитро- α -хлоркоричный аль-
дегид)

Наружно. П. в. нр. Пр. Суспен-
зия 1 и 3%

Rp.: Susp. Ciminali 1% 50,0
D. S. Для смачивания повязок при лечении ран; смену
повязок производить через 3—5 дней

Rp.: Pulv. Ciminali 15,0
D. S. Для припудривания ран

Этоний
Aethonium (Б)
[этилен-1,2-бис (α -диметилкарб-
дезоксиметил)-аммония ди-
хлорид]

П. в. р. Мз. 0,5—2%. Р-ры
0,02—0,2%. Спп.

Rp.: Sol. Aethonii 0,5% 50,0
D. S. Для промывания лакун при хроническом тонзиллите

Rp.: Ung. Aethonii 1% 20,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Rp.: Aethonii 0,05
Butyri Cacao q. s.
M. f. suppos. D. t. d. N. 10
S. По 1 свече в задний проход 2 раза в день

Эхинор
Echinorum

10 кл. Ж. (оф.) — 1 и 2. Состав:
разведенные настойки расти-
тельного происхождения и
растворы неорганических ин-
гредиентов

Rp.: Echinori N. 1 et N. 2 á 25,0
D. S. По 10 капель, чередуя оба препарата через каждые
2 ч (при ангине). После нормализации t° , прием пре-
паратов сократить до 3—4 раз в день

Зарубежные препараты

Невиграмон (Венгрия)
Nevigramonum
(1-этил-7-метил-4-ОН-1-8-нафти-
ридин-3-карбоновая кислота)

2 кпс. Кпс. (оф.) — содержат 0,5
препарата.

Rp.: Nevigramoni in caps. á 0,5
D. t. d. N. 50
S. По 2 капсулы 3—4 раза в день

Флуценар (Польша)
Phlucenagum (Б)
(соответствует синалару)

Мз. (оф.). Тубы 15,0

Rp.: Ung. Phlucenari 15,0

D. S. Смазывать пораженные участки кожи 2—3 раза
в день и слегка втирать

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

ГРУППА ГАЛОИДОВ¹

Йодиол
Iodinolum (Б)

Ж. (оф.) — состав: йод — 0,1%,
йодид калия — 0,3%, поли-
виниловый спирт — 0,9%, во-
да дистиллированная до 100%

Rp.: Sol. Iodinoli 1% 100,0

D. S. Для промывания лакун миндалин, для промывания
и закапывания при гнойных отитах

Йодоформ
Iodoformium, ФХ

П. в. нр. Мз. Пр. Эм. Пст. (оф.) —
состав: йодоформ и окись цин-
ка — аа 40 частей, глицерин —
20 частей

Rp.: Pastae Iodoformii 50,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Rp.: Iodoformii 2,5
Vasellini ad 50,0
M. f. ung.

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Rp.: Iodoformii 10,0
D. S. Присыпка

Rp.: Iodoformii 10,0
Glycerini
Spiritus vini 95° аа 45,0
M. f. emulsum
D. S. Для смачивания тампонов

Мазь с йодидом калия
Unguentum Kalii iodati

Мз. (оф.)

Rp.: Ung. Kalii iodati 20,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

¹ См. также препараты, содержащие йод.

Пантоцид
Pantocidum, ФХ

Тб. (оф.) — 0,12. Состав: панто-
цид — 0,0082, натрия карбо-
нат — 0,0036, натрия хло-
рид — 0,1082

Rp.: Tab. Pantocidi N. 20

D. S. 6—8 таблеток на 1 л воды для обработки ран

Хлорамин В
Chloraminum В

П. в. с. р. Р-ры

Rp.: Sol. Chloramini В 2% 100,0

D. S. Для промывания ран

Rp.: Sol. Chloramini В 0,2% 50,0

D. S. Для промывания глаз

Rp.: Sol. Chloramini В spirituosae 5% 20,0

D. S. Для обработки кожи при поражении ипритом

КИСЛОРОДОДАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Гидроперит
Hydroperitum

Комплексное соединение пере-
киси водорода с мочевиной.
Тб. 1,5

Rp.: Tab. Hydroperiti 1,5

D. t. d. N. 5

S. Растворить 1 таблетку в стакане воды для полоскания
горла

Калия перманганат
Kalii permanganas, ФХ

П. в. р. Р-ры

Rp.: Sol. Kalii permanganatis. 0,1% 500,0

D. S. Для промывания ран

Rp.: Sol. Kalii permanganatis 1% 20,0

D. S.: 1) по 20—40 капель на стакан воды для полоскания;
2) для промывания желудка (из расчета 1 чайная
ложка на 2—3 л воды)

Rp.: Kalii permanganatis 5,0

D. S. По 1—2 кристаллика на стакан воды для полоскания

Перекись водорода — раствор
Solutio Hydrogenii peroxydati di-
luta, ФХ

Ж. (оф.). Содержит 3% перекиси
водорода

Rp.: Sol. Hydrogenii peroxydati dilutae 50,0

D. S. 1 столовую ложку на стакан воды для полоскания

Раствор перекиси водорода кон-
центрированный (перги-
дроль)

**Solutio Hydrogenii peroxydati
concentrata (Perhydrolum) (Б)**

Ж. (оф.). Содержит 27,5—31%
перекиси водорода

Rp.: Sol. Hydrogenii peroxydati concentratae 5,0

Aq. destill. ad 20,0

M. D. S. Для смазывания десен

Rp.: Sol. Hydrogenii peroxydati concentratae

Lanolini

Vasellini aa 5,0

M. f. ung.

D. S. Мазь от веснушек

Rp.: Sol. Hydrogenii peroxydati concentratae 10,0

Aq. destill. ad 50,0

M. D. S. По 1 чайной ложке на стакан воды для полосканий

ГРУППА ФОРМАЛЬДЕГИДА

Гексаметиленetetрамин (уротро-
пин)

**Hexamethylenetetraminum (Uro-
tropinum), ФХ**

В/в 2,0—4,0. Вн. 0,5—1,0. П. в.
р. Пр. Тб. 0,25 и 0,5. Ам. 5,0
и 10,0—40%

Rp.: Sol. Hexamethylenetetramini 40% 10,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 10 мл внутривенно 1 раз в день

Rp.: Hexamethylenetetramini 0,5

D. t. d. N. 10 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Кальцекс
Calceх

1 тб. Тб. (оф.), состав: комплекс-
ная соль уротропина и хло-
рида кальция

Rp.: Tab. Calceх N. 10

D. S. По 1 таблетке 3 раза в день

Лизоформ
Lysoformium

Ж. (оф.). Состав: формалин и ка-
лийное мыло — aa 40 частей,
спирт винный — 20 частей

Rp.: Lysoformii 10,0

Aq. destill. 1000,0

M. D. S. Для спринцеваний

Rp.: Lysoformii 25,0

D. S. По 1—2 чайные ложки на 1 л кипяченой воды для
спринцевания

Раствор формальдегида (формалин)
Solutio Formaldehydi (Formali-
num), ФХ

Ж. (оф.) — 40% раствор фор-
мальдегида

Rp.: Sol. Formaldehydi 50,0

D. S. По 1 чайной ложке на 2 стакана воды для обмывания ног

Rp.: Sol. Formaldehydi 10% 50,0

D. S. По 1 чайной ложке на 1 л воды для спринцевания

Уробесалол
Urobessalolum

1 тб. Тб. (оф.), состав: экстракт красавки — 0,015, фенолсалицилат и гексаметилентетрамин — аа 0,25

Rp.: Tab. Urobessaloli N. 12

D. S. По 1 таблетке 3 раза в день

Уросал
Urosalum

1 тб. Тб. (оф.), состав: фенолсалицилат и гексаметилентетрамин — аа 0,3

Rp.: Tab. Urosali N. 12

D. S. По 1 таблетке 3 раза в день

Формалиновая мазь
Unguentum Formalini

Мз. (оф.), состав: формалин — 15%, кислота салициловая — 2%, борная — 5%, глицерин — 14%, полиэтиленоксид — 62,5%, отдушка — 1,5%

Rp.: Ung. Formalini 50,0

D. S. Втирать в места с повышенным потоотделением

Формидрон
Formidronum

Наружно. Ж. (оф.) — состав: формалин — 10 частей, спирт этиловый 96°—40 частей, вода — 50 частей, одеколон — 0,5 части. Фл. 100,0

Rp.: Formidroni 100,0

D. S. Для обмывания кожи при повышенной потливости

ГРУППА ФЕНОЛА

Бензонафтол
Benzonaphtholum

0,3—0,5. П. в. нр. Пр. Тб. 0,5 и 0,25

Rp.: Benzonaphtholi 0,5

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Бесалол
Besalolum

1 тб. Тб. (оф.), состав: экстракт красавки — 0,01, фенолсалицилат — 0,3

Rp.: Tab. Besaloli N. 12
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Бетиол
Bethiolum

Сп. (оф.) — состав: экстракт красавки — 0,015, ихтиол — 0,2

Rp.: Suppos. Bethioli N. 10
D. S. По 1 свече в задний проход на ночь

Деготь березовый
Pix liquida Betulae

ГЖ. в. нр. Мз. Лнм.

Rp.: Picis liquidae Betulae
Sulfuris praecipitati aa 5,0
Vaselini ad 50,0
M. f. ung.
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Rp.: Picis liquidae Betulae 2,0
Ung. Paraffini ad 20,0
M. f. ung.
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Rp.: Picis liquidae Betulae
Saponis viridis
Spiritus vini aa 15,0
M. f. lin.
D. S. Для смачивания тампонов (мыльно-дегтярный спирт)

Карбол-глицерин
Carbol-glycerinum

Ж. (оф.) — 3 и 5% растворы фенола в глицерине

Rp.: Sol. Carbol-glycerini 5% 10,0
D. S. Ушные капли

Лизол медицинский
Lysolum medicinale

Ж. (оф.) — мыльно-крезоловый раствор

Rp.: Lysoli medicinalis 25,0
D. S. По 1—2 чайные ложки на 1 л кипяченой воды для спринцевания

Мазь бальзамическая по Вишнев-
скому
Unguentum Wischnevsky

(Оф.). Состав: деготь и ксеро-
форм — аа 3 части, масло
касторовое — 100 частей

Rp.: Ung. Wischnevsky 100,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Мазь Вилькинсона
Unguentum Wilkinsoni

(Оф.). Состав: деготь березовый
и сера очищенная — аа 15
частей, мел осажденный — 10
частей, мазь нафталиновая и
мыло зеленое — аа 30 частей,
вода — 4 части

Rp.: Ung. Wilkinsoni 50,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Резорцин
Resorcinum, ФХ

П. в. е. р. Р-ры. Мз. Пст.

Rp.: Resorcini 1,0
Vasellini ad 10,0
M. f. ung.
D. S. Мазь для смазывания пораженных участков кожи

Rp.: Sol. Resorcini 2% 100,0
D. S. Примочка

Rp.: Resorcini 0,1
Spiritus vini 95° 5,0
Aq. destill. ad 20,0
M. D. S. Ушные капли

Салафтол
Salaphtholum

Тб. (оф.). Состав: экстракт кра-
савки — 0,01, фенилсалицилат
и бензонафтол — аа 0,3

Rp.: Tab. Salaphtholi N. 10
D. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Фенилсалицилат (салол)
PhenylII salicylas (Salolum)

0,3—0,5. П. в. нр. с. р. Пр. (Тб.
в комбинации с другими пре-
паратами)

Rp.: PhenylII salicylatis 0,5
D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 3 раза в день

Фенол чистый
Phenolum purum (Б)

П. в. с. глц. р. Ушные капли

Rp.: Phenoli puri 0,5
Glycerini 10,0
M. D. S. Ушные капли

Фенол чистый жидкий
Phenolum purum liquefactum (Б)

Ж. (оф.). Состав: смесь 100 частей расплавленного фенола с 10 частями воды. Р-ры

Rp.: Phenoli puri liquefacti 1,0
Spiritus vini 10,0
M. D. S. Для смазывания кожи

ПРОИЗВОДНЫЕ ТИОФЕНА

Альбихтол
Albichtholum

ГЖ. в. нр. Мз. Спп. Ш. Эм. (оф.)

Rp.: Albichtholi 5,0
Vaselini 50,0
M. f. ung.
D. S. Для перевязок

Rp.: Emuls. Albichtholi 50,0
D. S. Для смачивания тампонов

Rp.: Albichtholi 0,15
Butyri Casao q. s.
M. f. suppos. D. t. d. N. 6
S. По 1 свече 1—2 раза в день в прямую кишку

Ихтиол
Ichthyolum

ГЖ. в. глц. р. Мз. Спп. Пст. (оф.).
Состав: ихтиол — 4 части,
окись цинка и крахмал — аа
10 частей, мазь нафталианная —
16 частей

Rp.: Ichthyoli 5,0
Lanolini
Vaselini аа 22,5
M. f. ung.
D. S. Мазь при экземе

Rp.: Ichthyoli 0,2
Butyri Casao q. s.
M. f. suppos. D. t. d. N. 10
S. По 1 свече 1—2 раза в день в прямую кишку

Rp.: Pastae Ichthyoli naphthalani 50,0

D. S. Для перевязок

Rp.: Ichthyoli 4,0

Glycerini ad 40,0

M. D. S. Для смачивания тампонов

ГРУППА КРАСИТЕЛЕЙ

Антисептическая жидкость Но-

викова

Solutio Novicovi

(Оф.). Состав: танин — 1 часть,
бриллиантовый зеленый и
спирт 96° — aa 0,2 части,
масло касторовое — 0,5 части,
коллодий — 20 частей

Rp.: Sol. Novicovi 20,0

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Бриллиантовый зеленый
Viride nitens, ФХ

П. в. с. р. Р-ры

Rp.: Viridis nitentis 0,5

Spiritus vini 70° 100,0

M. D. S. Для смазывания гнойничковых поражений кожи

Rp.: Viridis nitentis 0,3

Spiritus vini 70° 10,0

Aq. destill. ad 30,0

M. D. S. Для смазывания краев век

Метиленовый синий
Methylenum coeruleum, ФХ

П. в. с. р. Р-ры

Rp.: Sol. Methyleni coerulei spirituosae 1% 10,0

D. S. Для смазывания кожи

Флавакридина гидрохлорид (три-
пафлавин)

Flavacridini hydrochloridum (Три-
paflavinum) (Б), ФХ

0,2 (0,8). П. в. р. Тб. 0,003. Р-ры

Rp.: Flavacridini hydrochloridi 0,003

D. t. d. N. 6 in tab.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Flavacridini hydrochloridi 0,5% 10,0

Sterilisetur!

D. S. По 5—10 мл внутривенно 1 раз в день

Rp.: Sol. Flavacridini hydrochloridi 0,1% 250,0

D. S. Для полоскания

Этакридина лактат (риванол) Aethacridini lactas (Rivanolum) (Б), ФХ	0,05 (0,15). П. в. с. р. Р-ры. Мз. Пр. Пст. Тб. (оф.) — состав: риванол — 0,01, бор- ная кислота — 0,09
---	--

- Rp.: Sol. Aethacridini lactatis 0,1% 400,0
D. S. Для промывания ран
- Rp.: Sol. Aethacridini lactatis 1% 10,0
D. S. Для смазывания слизистой зева
- Rp.: Sol. Aethacridini lactatis spirituosae 0,1% 20,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи
- Rp.: Sol. Aethacridini lactatis 0,1% 5,0
D. S. Глазные капли
- Rp.: Tab. Aethacridini-lactatis N. 20
D. S. По 1—2 таблетки на стакан воды для полоскания

СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, АЛЮМИНИЯ И ВИСМУТА

Препараты меди

Меди сульфат Cupri sulfas (Б), ФХ	Как рвотное — 0,5 (0,5). П. в. р. Р-ры 0,25—1%
--------------------------------------	---

- Rp.: Sol. Cupri sulfatis 0,25% 5,0
D. S. Глазные капли
- Rp.: Sol. Cupri sulfatis 10% 20,0
D. S. На 2 л теплой воды для промывания желудка

Меди цитрат Cupri citras	П. в. нр. Гл. мз. 1—5%
-----------------------------	------------------------

- Rp.: Cupri citratis 0,5
Lanolini
Vasellini aa 5,0
M. f. ung.
D. S. Глазная мазь

Офтальмол — мазь Unguentum ophthalmolum	Мз. (оф.). Состав: меди цитрат — 5 частей, ланолин безводный — 6 частей, вазелин — 89 частей
--	--

- Rp.: Ung. ophthalmoli 5,0
D. S. Глазная мазь

П р е п а р а т ы ц и н к а

Паста борно-цинк-нафталановая
Pasta boro-zinc-naphthalanum

Пст. (оф.), состав: цинка окись — 25 частей, борная кислота — 5 частей, мазь нафталановая — 45 частей, крахмал — 25 частей

Rp.: Pastae boro-zinc-naphthalani 50,0
D. S. Для лечения инфицированных ран

Цинковая мазь
Unguentum Zinci, ФХ

Мз. (оф.). Состав: цинка окись — 1 часть, вазелин — 9 частей

Rp.: Ung. Zinci 10,0
D. S. Для смазывания ссадин

Цинка окись
Zinci oxydum, ФХ

П. в. нр. Пр. Мз. Пст. Широко используется для приготовления готовых лекарственных форм

Rp.: Zinci oxydi
Amyli aa 10,0
Talci ad 50,0
M. D. S. Присыпка

Rp.: Acidi salicylici 1,0
Zinci oxydi
Amyli aa 12,5
Vaselini ad 50,0
M. f. pasta
D. S. Для смазывания краев ран

Цинка сульфат
Zinci sulfas, ФХ

Как рвотное — 1,0 (однократно). П. в. р. Р-ры 0,1, 0,25 и 0,5%

Rp.: Sol. Zinci sulfatis 0,25% 5,0
D. S. Глазные капли

Rp.: Sol. Zinci sulfatis 0,25% 5,0
Ac. borici 0,2
M. D. S. Глазные капли

Rp.: Zinci sulfatis
Plumbi acetatis aa 0,3
Aq. destill. 200,0
M. D. S. Для спринцеваний

Препараты серебра

Колларгол Collargolum (Б)	В/в 0,25 (0,5). П. в. р. Р-ры. Мз. 0,2—15%
--	---

- Rp.: Sol. Collargoli 2% 5,0
D. in vitro nigro
S. Глазные капли
- Rp.: Sol. Collargoli 1% 200,0
D. S. Для спринцевания
- Rp.: Ung. Collargoli 5% 10,0
D. S. Мазь для носа

Протаргол Protargolum	П. в. р. Р-ры
--	----------------------

- Rp.: Sol. Protargoli 0,5% 200,0
D. S. Для промывания мочевого пузыря
- Rp.: Protargoli 0,2
Glycerini 5,0
Aq. destill. ad 20,0
M. D. S. Для орошения голосовых связок
- Rp.: Sol. Protargoli 1% 5,0
D. in vitro nigro
S. Глазные капли

Серебра нитрат Argenti nitras (А), ФХ	0,03 (0,1). П. в. р. Р-ры. Мз. 1—10%. Гл. кпл. 0,5—2%
--	--

- Rp.: Sol. Argenti nitratis 2% 5,0
D. in vitro nigro
S. По 1 капле в каждый глаз (в руки врача!) с последующим орошением физиологическим раствором
- Rp.: Sol. Argenti nitratis 10% 10,0
D. S. Для смазывания грануляций

Препараты ртути

Диоцид Diocidum (А)	П. в. р. Тб. (оф.) — состав: тб. 1 — цетилпиридиния бро- мид — 0,325 и тб. 2 — этанол- меркурихлорид — 0,35
--------------------------------------	--

- Rp.: Sol. Diocidi 0,02% 200,0
D. S. Для обработки рук хирурга
- Rp.: Tab. Diocidi-1 N. 2
Tab. Diocidi-2 N. 1
D. S. Растворить все таблетки в 5 л кипяченой воды; для дезинфекции рук хирурга

Ртутн .амидохлорид
Hydrargyri amidochloridum
(Б), ФХ

П. в. нр. Мз. Пст. Пр.

Rp.: Ung. Hydrargyri amidochloridi 10% 10,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Rp.: Hydrargyri amidochloridi 0,4
Talci 5,0
Vaselini ad 50,0
M. f. pasta
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Rp.: Ac. salicylici 1,0
Hydrargyri amidochloridi
Bismuthi subnitratis aa 3,0
Lanolini
Vaselini aa ad 30,0
M. f. ung.
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Ртутн дихлорид (сулема)
Hydrargyri dichloridum,
(А), ФХ

0,02 (0,02). П. в. р. Р-ры. Тб.
0,5 и 1,0 для наружного при-
менения

Rp.: Tab. Hydrargyri dichloridi 1,0
D. t. d. N. 6
S. Растворить 1 таблетку в 1 л кипяченой воды; для дезин-
фекции кожи

Rp.: Sol. Hydrargyri dichloridi 0,01% 20,0
D. S. Для дезинфекции слизистых

Ртутн окись желтая
Hydrargyri oxydum flavum
(Б), ФХ

П. в. нр. Мз. 1—5%. Гл. мз.
(оф.) — 2%

Rp.: Ung. Hydrargyri oxydi flavi 5,0
D. S. Глазная мазь (Ung. ophthalmicum)

Rp.: Hydrargyri oxydi flavi 0,1
Lanolini
Vaselini albi aa 5,0
M. f. ung.
D. S. Глазная мазь

Rp.: Hydrargyri oxydi flavi 1,5
Sulfuris praecipitati 3,0
Vaselini ad 30,0
M. f. ung.
D. S. Мазь на кожу

Ртутн оксиданид
Hydrargyri охусуанид (А), ФХ

Наружно. П. в. тр. Гл. клл.

Rp.: Sol. Hydrargyri охусуаниди 0,01% 100,0
D. S. Для глазных ванночек 2—3 раза в день

Ртутная мазь серая
Unguentum Hydrargyrum cinereum

(Оф.). Содержит 30% ртути

Rp.: Ung. Hydrargyri cinerei 3,0
D. t. d. N. 10 in charta cerata
S. По 1 пакету на втирание в день (при сифилисе)

Rp.: Ung. Hydrargyri cinerei 5,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Ртутно-висмутовая мазь
Unguentum Hydrargyri-bismuthum

(Оф.). Содержит ртуть амидохлорную и висмут азотнокислый основной — āā

Rp.: Ung. Hydrargyri-bismuthi 25,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Препараты висмута

Дерматол
Dermatolum, ФХ

П. в. нр. Мз. Пр. Спп.

Rp.: Dermatoli 10,0
Zinci oxydi 20,0
Talci ad 50,0
M. f. pulv.
D. S. Присыпка

Rp.: Ung. Dermatoli 10% 10,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Rp.: Dermatoli 0,2
Extr. Belladonnae 0,015
Butyri Cacao q. s.
M. f. suppos. D. t. d. N. 10
S. По 1 свече 1—2 раза в день в задний проход

Ксероформ
Xeroformium, ФХ

П. в. нр. Мз. (оф.) — 10%

Rp.: Xeroformii 10,0
D. S. Присыпка

Rp.: Ung. Xeroformii 5% 5,0

D. S. Глазная мазь

Rp.: Xeroformii 2,5

Zinci oxydi 5,0

Lanolini 20,0

Vaselini ad 50,0

M. f. ung.

D. S. Мазь на кожу

КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ

Кислоты

Бензойная кислота
Acidum benzoicum, ФХ

П. в. тр. Мз.

Rp.: Acidi benzoici 0,6

Acidi salicylici 0,3

Vaselini ad 10,0

M. f. ung.

D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Борная кислота
Acidum boricum, ФХ

П. в. с. р. Р-ры. Пр. Мз. (оф.) —
содержит 10% борной кислоты

Rp.: Acidi borici 20,0

D. S. По 1 чайной ложке на стакан воды для полосканий

Rp.: Acidi borici 10,0

Acidi salicylici 5,0

Zinci oxydi 25,0

Talci ad 100,0

M. f. pulv.

D. S. Присыпка

Rp.: Sol. Acidi borici 2% 100,0

D. S. Для промывания глаз

Rp.: Acidi borici 0,3

Spiritus vini 70° 10,0

M. D. S. Ушные капли

Rp.: Ung. Acidi borici 10,0

D. S. Мазь для носа

Бороглицерин
Boroglycerinum

Ж. (оф.) — 10% раствор борной
кислоты в глицерине

Rp.: Boroglycerini 25,0

D. S. Для смазывания слизистых

Бороментол
Boromentholum

Мз. (оф.), состав: борная кислота — 5%, ментол — 0,5%, вазелин — 94,5%

Rp.: Boromentholi 10,0
D. S. Мазь для носа

Молочная кислота
Acidum lacticum

Ж. в. р. Р-ры

Rp.: Acidi lactici 30,0
D. S. 1 чайную ложку на стакан воды для спринцевания
Rp.: Acidi salicylici
Acidi lactici aa 1,0
Collodii elastici ad 10,0
M. D. S. Мазь для удаления мозолей

Салициловая кислота
Acidum salicylicum, ФХ

П. в. р. Мз. Пст. Пр. Р-ры

Rp.: Acidi salicylici 1,0
Spiritus vini 70° 50,0
M. D. S. Для смазывания кожи (салициловый спирт)
Rp.: Acidi salicylici 1,0
Viridis nitentis 0,01
Spiritus vini 96° 1,0
Collodii elastici ad 10,0
M. D. S. Для смазывания мозолей (выпускается в готовом виде под названием «Мозольная жидкость»)
Rp.: Acidi salicylici
Resorcini aa 0,5
Spiritus vini 70° 50,0
M. D. S. Смазывать пораженные участки кожи
Rp.: Acidi salicylici 1,0
Zinci oxydi
Amyli tritici aa 12,5
Vasellini flavi ad 50,0
M. f. pasta
D. S. Для смазывания краев ран, пролежней (паста)

Щелочи

Антиформин
Antiforminum

Ж. (оф.) — состав: 20% раствор гипохлорита натрия и 15% раствор едкого натра — aa.
Р-ры 10, 25, 50%

Rp.: Sol. Antiformini 10% 30,0
D. S. Для смазывания десен; для протирания кожи при зуде

Бикарминт
Bicarmintum

Тб. (оф.) — состав: борат натрия
и натрия гидрокарбонат — \overline{aa}
0,4, натрия хлорид — 0,2, мен-
тол — 0,004

Rp.: Tab. Bicarminti N. 20

D. S. 1—2 таблетки растворить в $\frac{1}{2}$ стакана воды для поло-
саний, промываний, ингаляций

Мыло зеленое
Sapo viridis

ГЖ. per se и как adjuvans в ма-
зях

Rp.: Saponis viridis 50,0

D. S. Для мытья рук

Натрия тетраборат (бура)
Natrii tetraboras (Borax), ФХ

П. в. р. Р-ры

Rp.: Natrii tetraboratis 2,5

Glycerini 5,0

Spiritus vini ad 10,0

M. D. S. Для смазывания слизистых

Rp.: Natrii tetraboratis 1,0

D. t. d. N. 10 in tab.

S. Растворить 4—5 таблеток в 1 л кипяченой воды для сприн-
цевания

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ. МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. БАЛЬЗАМЫ

Автоловая мазь
Unguentum autolum

Мз. (оф.), состав: автол — 85 ча-
стей, цинка окись — 3 части,
стеарин — 12 частей

Rp.: Ung. Autoli 30,0

D. S. Для лечения ожогов, трофических язв

Бальзам Шостаковского (вини-
лин)
Balsamum Schostakowsky

Ж. (оф.) — поливиниловый эфир.
Р-ры в масле и per se

Rp.: Balsami Schostakowsky 150,0

D. S. По 1—2 чайные ложки 1 раз в день

Rp.: Balsami Schostakowsky 20,0

Ol. Helianthi ad 100,0

M. D. S. Для перевязок

Линимент нафталановой нефти 10% Linimentum Naphthalani 10%	Наружно. Лим. (оф.) — состав: нафталановая нефть — 10%, едкое кали — 0,18%, вода дистиллированная — до 100%
--	--

Rp.: Lin. Naphthalani 100,0
 D. S. Для втирания в область пораженных суставов и при миозитах

Мазь серно-нафталановая Unguentum naphthalani-sulfuratum	(Оф.). Состав: сера очищенная — 1 часть, нафталанная мазь — 2 части
---	---

Rp.: Ung. naphthalani-sulfurati 50,0
 D. S. Для смазывания кожи

Нафталан Naphthalanum	ГЖ. Мз. (оф.). Эм. (оф.)
--	--------------------------

Rp.: Ung. Naphthalani 100,0
 D. S. Для перевязок

Rp.: Emuls. Naphthalani 50,0
 D. S. Для смачивания тампонов

Нафталгин — линимент Linimentum Naphthalginum	Наружно. Лин. (оф.) — состав: анальгин, метилсалицилат и нефть нафталановая — аа 2,5, эмульгатор — 13,0, смесь жир- ных спиртов кашалотового жира — 3,0, вода дистиллиро- ванная — до 100,0. Фл. 100,0
--	--

Rp.: Lin. Naphthalgini 100,0
 D. S. Для втирания в область пораженных суставов

Полимерол Polymerolum	ГЖ. Полимеризованное автоло- вое масло. Per se.
--	--

Rp.: Polymeroli 50,0
 D. S. Для смачивания тампонов, повязок

Цигерол Cygerolum, (циклогексил-геранилуксусная кислота)	ГЖ.
---	-----

Rp.: Cygeroli 200,0
 D. S. Для лечения ран после предварительной обработки
 1 раз через 1—2 дня, при ожогах — через 4—5 дней
 (при раневых поверхностях более 20 см² цигерол раз-
 водят 1 : 5 в стерильном растительном масле)

СПИРТЫ

Спирт борный Spiritus boricum	(Оф.) — раствор борной кислоты в спирте 0,5, 1, 2, 3 и 5%. Фл. 10,0 и 20,0
--	--

Rp.: Spiritus borici 3% 20,0
 D. S. Ушные капли

Спирт горчичный Spiritus Sinapis	(Оф.) — 2% раствор эфирного горчичного масла в спирте
---	--

Rp.: Spiritus Sinapidis 100,0
 D. S. Для втирания в кожу

Спирт лавандовый Spiritus lavandula	(Оф.) — 1% раствор лавандового масла в спирте. Фл. 10,0
--	--

Rp.: Spiritus Lavandulae 10,0
 D. S. Для протирания кожи

Спирт мыльный Spiritus saponatus	(Оф.) — состав: масло подсолнеч- ное — 100 частей, спирт 90° — 300 частей, калий едкий плав- леный — 23 части, вода — 75 частей. Фл. 50,0 и 100,0
---	---

Rp.: Spiritus saponati 100,0
 D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Спирт мыльный сложный Spiritus saponatus compositus	(Оф.). Состав: мыло зеленое — 20 частей, вода — 2 части, спирт — 8 частей, спирт ла- вандовый — 3 части. Фл. 50,0 и 100,0
--	---

Rp.: Spiritus saponati compositi 100,0
 D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Спирт резорциновый Spiritus resorcinum	(Оф.) — 1 и 2% раствор резор- цина в спирте. Фл. 40,0 и 80,0
---	---

Rp.: Spiritus Resorcini 1% 40,0
 D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Спирт салициловый Spiritus salicylicum	(Оф.). — 1 и 2% раствор салици- ловой кислоты в спирте. Фл. 40,0
---	--

Rp.: Spiritus salicylici 1% 40,0
 D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Спирт этиловый
Spiritus vini, ФХ

Per se и как constituents (40, 70 и 90°) при прописывании жидких лекарственных форм. Выписывается на бланках с печатью учреждения

ПРЕПАРАТЫ СЕРЫ ¹

Мазь серная на эмульсионной основе
Unguentum sulfuratum (Оф.)

Rp.: Ung. sulfurati 50,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

Мазь серная простая
Unguentum sulfuratum simplex Мз. (оф.) — содержит 33% очищенной серы

Rp.: Ung. sulfurati simplicis 50,0
D. S. Для смазывания пораженных участков кожи

ФИТОНЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ²

Аллилсат
Allilsatum 10—20 кпл. Ж. (оф.) — спиртовая вытяжка из луковиц чеснока (40%)

Rp.: Allilsati 30,0
D. S. По 10—15 капель 2—3 раза в день в молоко

Аллилчеп
Allilcerum 20—30 кпл. Ж. (оф.). Спиртовая вытяжка из репчатого лука

Rp.: Allilcepi 50,0
D. S. По 20—30 капель 3 раза в день в молоко

Иманин
Imaninum Наружно. П. в. тр. Р-ры. Мз. Пр. (препарат из зверобоя)

Rp.: Imanini 1,0
Lanolini
Vaselini aa 10,0
M. f. ung.
D. S. Для лечения свежих и инфицированных ран

¹ См. также мазь Вилькинсона.

² См. также аллилглицер, урзалл.

Rp.: Sol. Imanini 1% 100,0
D. S. Для лечения ран, ожогов

Rp.: Ung. Imanini 1% 100,0
D. S. Намазывать на пораженные участки кожи

Новоиманин
Novoimaninum (Б)

Наружно. Смолистая масса в. нр.
с. р. Фл. 10,0 и 100,0 — 1%
спиртового раствора

Rp.: Sol. Novoimanini spirituosae 1% 10,0
D. S. Для промываний, смачивания повязок и тампонов
при лечении инфицированных ран; перед употребле-
нием развести в 100 мл стерильной дистиллированной
воды

Урзалин
Ursalinum

Наружно. ГЖ — эфирное масло
из медвежьего лука. Мз. (оф.) —
0,3%

Rp.: Ung. Ursalini 30,0
D. S. Для перевязок 1 раз в 2—3 дня

Хлорофиллипт
Chlorophylliptum

Амп. 2,0 — 0,25% фл.: 50,0 —
1% спиртового раствора;
20,0—2% масляного раствора
(препарат, содержащий смесь
хлорофиллов из листьев эвкалипта)

Rp.: Sol. Chlorophyllipti spirituosae 1% 50,0
D. S. Развести содержимое флакона в 250 мл 0,25% рас-
твора новокаина (для смачивания повязок при лече-
нии ожогов и трофических язв)

Rp.: Sol. Chlorophyllipti 0,25% 2,0
D. t. d. N. 16 in amp.
S. Содержимое 1 ампулы развести в 38 мл воды для инъек-
ций — на 1 внутримышечную инъекцию (вводить мед-
ленно!). В течение суток вводить такую дозу 3—4 раза;
курс лечения — 4—5 суток

Чеснок — настойка
Tinctura Allii sativi

10—20 кпл.

Rp.: T-rae Allii sativi 40,0
D. S. По 10—20 капель 2—3 раза в день

Глава XI

КОНТРАЦЕПТИВНЫЕ СРЕДСТВА ¹

Контрацептин «Т»
Contraceptinum «Т»

Спп. (оф.), состав: хинозол — 0,03, борная кислота — 0,3, танин — 0,06, жировая основа — 1,46

Rp.: Supp. vaginalis Contraceptini «Т» N. 10
D. S. По 1 шарiku во влагалище

Мегестранол
Megestranolum (Б)

1 тб. Тб. (оф.), состав: мегестрола ацетат — 0,005 и местранол — 0,0001

Rp.: Tab. Megestranoli N. 21
D. S. По 1 таблетке в день, начиная с 5-го дня после начала менструации, в течение 3 недель

Зарубежные препараты

Инфекундин (Венгрия)
Infecundinum

Тб. (оф.), состав: норэтинодрел — 0,0025, метоксиэтинилэстрадиол — 0,01

Rp.: Tab. Infecundini N. 25
D. S. По 1 таблетке в день, начиная с 5-го дня после менструации, в течение 3 недель

¹ См. также лютенурин, нистатина натриевая соль, лизоформ, грамицидиновая паста.

Глава XII
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВА

Бария сульфат для рентгеноско-
пии
Barii sulfas pro roentgeno, ФХ

П. в. ир. Пакеты по 100,0

Rp.: Barii sulfatis pro roentgeno 100,0

D. t. d. N. 6

S. Для рентгеноскопии желудка и кишечника

Билигност
Bilignostum, ФХ

4,0—8,0 (после предвари-
тельного определения чувстви-
тельности к йоду). П. в. р.
Амп. 2,0, 10,0 и 20,0—20%.
Для рентгенографии желчных
путей и желчного пузыря.
Амп. 20,0 и 1,0 — 50%

Rp.: Sol. Bilignosti 20% 20,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 30—40 мл внутривенно, вводить медленно, перед употреблением подогреть до температуры тела (после предварительного определения чувствительности к йоду)

Rp.: Sol. Bilignosti 20% 2,0

D. t. d. N. 3 in amp.

S. По 1—2 мл внутривенно для предварительного определе-
ния чувствительности к йоду

Билитраст
Bilitrastum, ФХ

3,0—3,5. П. в. нр. Пр. Для холе-
цистографии

Rp.: Bilitrasti 1,0
D. t. d. N. 3

S. Накануне исследования после ужина и очистительной
клизмы принять 3 порошка с 20-минутными интервалами,
запить 3 стаканами сладкого чая; через 3 ч принять
100 мл 40% глюкозы внутрь

Йодолипол
Iodolipolum, ФХ

Йодированное масло. Амп. 5,
10 и 20 мл

Rp.: Iodolipoli 10 ml
D. t. d. N. 6 in amp.

S. Для бронхографии, метрографии, сальпингографии

Иопаноевая кислота
Acidum iopanoicum
(α -(3-амино-2,4,6-трийод-
бензил)-масляная кислота)

3,0—6,0. П. в. нр. Тб. 0,5

Rp.: Acidi iopanoici 0,5
D. t. d. N. 12 in tab.

S. По 6—12 таблеток на одно исследование (при рентге-
нографии желчных путей и желчного пузыря)

Кардиотраст для инъекций
Cardiotrastum pro injectionibus,
ФХ

П. в. р. Амп. 2,0 и 20,0—35 и
50%.

Rp.: Sol. Cardiotrasti pro injectionibus 35% 2,0
D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 1—3 мл внутривенно для предварительного определе-
ния чувствительности к йоду.

Rp.: Sol. Cardiotrasti pro injectionibus 50% 20,0
D. t. d. N. 6 in amp.

S. Для внутривенного введения по 20 мл (для рентгеноло-
гического исследования кровеносных сосудов, сердца,
почечных лоханок, мочеточников, мочевого пузыря)

Нейротраст
Neurotrastum

1,5—5 мл. Ж. в. нр. Амп. 2 мл

Rp.: Neurotrasti 2 ml
D. t. d. N. 6 in amp.

S. Для миелографии по 1,5—6 мл

Пропилийодон Propyliodonum (н-пропиловый эфир 3,5-дийод- 4-пиридон- <i>N</i> -уксусной кислоты)	П. в. с. м. нр. Суспензия (оф). содержит 60% препарата. Фл. 50,0
--	--

Rp.: Suspens. Propyliodoni 50,0
D. S. Для бронхографии по 20—30 мл

Сергозин Sergosinum, ФХ	П. в. р. Р-ры В/в, приготовлен- ные <i>ex tempore!</i>
--	---

Rp.: Sergosini 20,0
Sol. Natrii chloridi isotonicae ad 50,0
M. Steriliseturi
D. S. При цистопиелографии для 1 внутривенного введения

Трийотраст Triiotrastum (натриевая соль 3-ацетиламино- 2,4,6-трийодбензойной кисло- ты)	П. в. р. Амп. 3,0—30 и 50%, 10,0—30%, 20,0—50 и 70%
---	--

Rp.: Sol. Triiotrasti 50% 20,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Для рентгенологического исследования почечных лоханок, мочеточников, мочевого пузыря, кровеносных сосудов и сердца

Триомбрин Triombrinum (натриевая соль 3,5-диацетила- мино-2,4,6-трийодбензойной кислоты)	Амп. 10,0—30%; 20,0—50% и 70%; 50,0—70% и тест-ампулы по 3,0 ¹
--	---

Rp.: Sol. Triombrini 50% 20,0
D. t. d. N. 2 in amp.
S. По 25—40 мл внутривенно: вводить медленно — в течение 1—3 мин (для внутривенной урографии)

Rp.: Sol. Triombrini 70% 50,0
D. t. d. N. 2 in amp.
S. Внутривенно из расчета 1 мл на 1 кг веса тела; вводить быстро — 20 мл в 2 с. (при ангиокардиографии)

ДРУГИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Индигокармин Indigocarminum	В/в 0,012—0,015. П. в. р. Амп. 5,0—0,4%
--	--

¹ Перед употреблением ампулы подогревать до t° тела.

Rp.: Sol. Indigocarmini 0,4% 5,0

D. t. d. N. 3 in amp.

S. По 4—5 мл внутривенно: перед введением слегка подогреть (для исследования выделительной функции почек); перед введением дают пациенту 2 стакана воды

Зарубежные препараты

Ацидотест (Венгрия)
Acidotestum

Выпускается в комплекте, содержащем 3 драже и 2 таблетки. Состав драже: 2-4-диамино-4'-этоксид-азобензола — 0,05. Состав таблетки: кофеинбензоат натрия — 0,2.

Применение: для определения кислотности желудочного сока больному после полного опорожнения мочевого пузыря дают 1—2 таблетки и через час проводят исследование мочи, затем дают 3 драже и через 1½ ч берут вторую пробу мочи. Обе пробы мочи разбавляют до объема 200 мл, подкисляют соляной кислотой и производят колориметрическое исследование при помощи цветной шкалы, приложенной к препарату. Первая проба мочи является контрольной и не окрашивается

Верографин (Чехословакия)
Verografinum
(соответствует отечественному препарату трибромину)

В/в 20—40 мл. Амп. 20,0—60 и 76%

Rp.: Sol. Verografini 60% 20,0

D. t. d. N. 2 in amp.

S. По 20—40 мл внутривенно (медленно — в течение 1—3 мин)

Вофавердин (ГДР)
Vofaverdinum
[натриевая соль 3,3,3',3'-тетраметил-1,1'-ди-(сульфобутил)-4,5,4',5'-добензониндотрикарбо-цианин-йодин]

0,0003 мг/кг. Амп. емкостью 5,0, содержащие 0,025 препарата с приложением растворителя в амп. по 5,0

Rp.: Vofaverdinum in amp. à 0,025

D. t. d. N. 3

S. Для одного внутривенного введения (быстрого); растворить содержимое 1 ампулы в 5 мл растворителя

Иопагност (Чехословакия)

3,0—6,0. Тб. 0,5

Iopagnostum

(соответствует отечественному
препарату иопаноевой кислоте)

Rp.: Iopagnosti 0,5

D. t. d. N. 12 in tab.

S. По 6—12 таблеток на одно исследование

Миодил (Югославия)

**3—6 мл. Ж. (оф.). Ампл. 3 мл —
содержат 30% органически
связанного йода**

Myodilum

Rp.: Myodili 3 ml

D. t. d. N. 2 in amp.

S. По 3—6 мл в субарахноидальное пространство

Уротраст (Югославия)

**20—40 мл. Ампл. 1 мл и 20 мл —
60%; 1 мл и 20 мл — 75%**

Urotrastum

(соответствует отечественному
препарату триобромину)

Rp.: Sol. Urotrasti 60% 20,0

D. t. d. N. 2 in amp.

S. Внутривенно 20—40 мл в течение 2—3 мин (перед употреблением подогреть ампулу до t° тела). Предварительно определить чувствительность больного к йоду — ввести внутривенно 1 мл 60% раствора

Холевид (Югославия)

3,0—6,0. Тб. 0,5

Cholevidum

(соответствует отечественному
препарату иопаноевой ки-
слоте)

Rp.: Tab. Cholevidi 0,5

D. t. d. N. 12

S. По 6—12 таблеток на одно исследование

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК ПРЕПАРАТОВ, СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА И ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ НОМЕНКЛАТУРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ¹

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Азоксодон | 34. Необензинол |
| 2. АКТГ-цинк-фосфат | 35. Омелен |
| 3. Альбомуцин | 36. Осарсол |
| 4. Аминофосфон | 37. Первитин |
| 5. Амфедол | 38. Плантаглюцид |
| 6. Антиверруцин | 39. Прегнин |
| 7. Антиастмокрин | 40. Препарат АСД (препарат Дорогова) |
| 8. Артемизол | 41. Пропамин |
| 9. Астматин | 42. Рутамин |
| 10. Ацетазин | 43. Рыбий жир витаминизированный |
| 11. Битиурол | 44. Сайодин |
| 12. Валериана — эфирная настойка | 45. Саназин |
| 13. Висмута нитрат основной | 46. Сантонин |
| 14. Гидрокортикоцин | 47. Спирт ментоловый |
| 15. Дельсеемина ацетат | 48. Спорынья — жидкий экстракт |
| 16. Диенэстрола ацетат | 49. Спорынья — густой экстракт |
| 17. Димерин | 50. Стимулин D |
| 18. Желтушник — жидкий экстракт | 51. Сульфацил натрия |
| 19. Железо-аскорбиновая кислота | 52. Сульфадимидин |
| 20. Жидкости Гордеева № 1 и № 2 | 53. Тиодипин |
| 21. Изопромедол | 54. Триаканина гидрохлорид |
| 22. Йодогност | 55. Углерод четыреххлористый |
| 23. Камфотал | 56. Уигветол |
| 24. Книдомон | 57. Урозин |
| 25. Кортикоцин | 58. Ферамид |
| 26. Кунжутное масло | 59. Ферробион |
| 27. Лиол | 60. Фруктозодифосфат натрия |
| 28. Малабен | 61. Хеноподиевое масло |
| 29. МАП | 62. Хризаробин |
| 30. Мизидол | 63. Чистец буквицветный — настойка |
| 31. Метилсульфазин | 64. Элатин |
| 32. Мономицин | 65. Эмбитол |
| 33. Нафарин | 66. Эрготин |

¹ Приказы Министерства здравоохранения СССР и решения Фармакологического комитета за период с 1967 по 5/IV 1972 г.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абицин 125
 Абомин 201
 Ависан 153
 Автоловая мазь 309
 Адалин 30
 Адебит 192
 Аденозинтрифосфат-натриевая соль 226
 Аденозинтрифосфорная кислота
 — динатриевая соль 226
 — — монокальциевая соль в глицерине 226
 Адипозин 184
 Адиурекрин 184
 Адонизид 127
 — в таблетках 127
 Адонис-бром 127
 Адофен 46
 Адреналина гидротартрат — раствор 0,18% 80
 — гидрохлорид 80
 Адренокортикотропный гормон 185
 Аевит 175
 Азафен 61
 Азиатские таблетки
 Аир болотный 91
 Акофин 46
 Акофит № 1, 2 и 3 86
 Акрихин 172
 — пластырь 277
 Аксерофтола ацетат 176
 Аллацил 157
 Аллилглицер 277
 Аллилсат 312
 Аллилчеп 312
 Аллохол 98
 Алмециллин 249
 Алооцимен 166
 Алоэ 92
 — густой экстракт 93
 — жидкий экстракт 233
 — — — для инъекций 234
 — настойка 93
 — сухой экстракт 93
 — эмульсия 234
 Алтейный корень 103
 Альбихтол 300
 Альбуцид-натрий 266
 Алюминия гидроокись 103
 Амазол 46
 Амидопирин 43
 Амизил 34
 Амиказол 288
 Амилнитрит 146
 Аминазин 32
 Аминарсон 277
 Аминоакрихин 277
 Аминокапроновая кислота 204
 Аминокровин 231
 Аминопептид 231
 Аминохинол 278
 Амтриптилин 62
 Аммифурин 243
 Аммония бромид 36
 — хлорид 157
 Ампициллин 262
 Аналептическая смесь 57
 Анальгезирующая эмульсия 110
 Анальгин 43
 Анальфен 46
 Анаприлин 83
 Анатруксоний 79
 Анбитал 37
 Ангиотрофин 140
 Английская соль 95
 Андипал 142

- Андростендиола дипропионат 198
 Анестезин 110
 Анестезол 110
 Анетин 147
 Анис обыкновенный — плод 114
 — масло 114
 Анкофен 46
 Антабус 248
 Антастман 152
 Антианемин 171
 Антимонила-натрия тартрат 284
 Антипирин 43
 Антипсориактикум 289
 Антисептическая жидкость Нови-
 кова 301
 Антисимпатин 83
 Антиструмин 228
 Антиформин 308
 Ализартрон 237
 — мазь 238
 Апикодин 46
 Апилак 234
 Апоморфина гидрохлорид 114
 Апрессин 137
 Апрофен 70
 Аралия маньчжурская 64
 Армин 68
 Арника горная 222
 Арпенал 70
 Арфонад 78
 Аскорбинат магния с глюкозой
 раствор для инъекций 174
 — натрия — раствор 5 и 10%
 для инъекций 174
 Асcorбиновая кислота 174
 — — с тиамин-бромидом 180
 — и никотиновая кислоты в таб-
 летках 180
 Аскорутин 180
 Аскофен 47
 Аспирин 44
 Астматол 150
 Астрагал 140
 Асфен 47
 Атофан 242
 Атропина сульфат 71
 Афунгил 285
 Ацеклидин 67
 Ацетилдигитоксин 132
 Ацетилсалициловая кислота 44
 Ацефен 56
 Ацидин-пепсин 201
 Ацидотест 318
 Аэрон 71
- Багульник 114
 Бальзам Санитас 87
 — Шостаковского 309
 Баметансульфат 137
 Баранца отвар 248
 Барбамил 29
 Барбара 98
 Барбарис амурский 163
 — обыкновенный 163
 Барбитал 29
 — натрий 29
 Барвинкана гидрохлорид 64 —
 Бария сульфат для рентгеноско-
 пии 315
 Батилол 217
 Бекарбон 71
 Белена 71
 Беллазон 53
 Беллалгин 153
 Белласпон 39
 Белластезин 37
 Беллатаминал 37
 Беллоид 39
 БемеGRID 58
 Бензамон 67
 Бензацин 72
 Бензилбензоат 292
 Бензилпенициллина калиевая
 соль 249
 — натриевая соль 250
 — новокаиновая соль 250
 Бензогексоний 75
 Бензойная кислота 307
 Бензонал 50
 Бензонафтол 297
 БензоТЭФ 209
 Бенкаин 111
 Бентонитовая глина — гнiальби 103
 — — тиха-аскане 103
 Бепасал 153
 Бепаск 267
 Берберина сульфат 98
 Береза лист 159
 — почки 159
 Бероксан 243
 Бесалол 298
 Бессмертник — сухой экстракт 98
 — цветки 98
 Бетазин 188
 Бета-ситостерин 218
 Бетацид 204
 Бетиол 298
 Бехтерева микстура 127
 — — в таблетках 127

Бигумаль 272
 Бийохинол 276
 Бикарминт 309
 Билигност 315
 Билитраст 316
 Биомидин 260
 Бисал 107
 Бисмоверол 276
 Бициллин 1, 2 и 5 250, 251
 Бло — таблетки 204
 — с мышьяком — таблетки 205
 Бом-бенге 87
 Борная кислота 307
 Бороглицерин 306
 Бороментол 308
 Боярышник 133
 Бреликолин 163
 Бриллиантовый зеленый 301
 Бромизовал 30
 Бромкамфора 36
 Бромурал 30
 Брунеомицин 214
 Брусника 159
 Бузина 104
 Букарбан 192
 Бупатол 139
 Бура 309
 Бутадион 44
 Бутамид 190
 Вазелиновое масло 96
 Вальерьяна густой экстракт 38
 — корневище и корень 38
 — настойка 38
 Валидол 147
 Валокардин 40
 Валокармид 38
 Василек 159
 Василистник вонючий 140
 Венапиолин 1 и 2 234
 Венское питье 94
 Верографин 318
 Веродон 47
 Веронал 29
 Верошпирон 158
 Ветразин 163
 Взвесь плаценты 234
 Виадрил Г 28
 Викалин 177
 Викасол 222
 Винбластин 215
 Винилин 309
 Винкаметрин 163
 Винкапан 139
 Винкаторн 133

Винкристин 215
 Виннокаменная кислота 239
 Винносурьямонатриевая соль 284
 Випералгин 238
 Випраксин 235
 Випратокс в ампулах 238
 — мазь 239
 Випросал 235
 Вирапин 239
 Витамин А — драже 175
 — — жидкий концентрат 176
 — В₂ 170
 — В₁₂ 171
 — В₁₅ 171
 — Д₂ 177
 — Е — драже 178
 — — масляный раствор 178
 — — спирто-сахарный раствор 178
 — Р 174
 Витаминный чай № 1 и № 2
 180 181
 Витахлорциклин 251
 Витациклин 251
 Витоксициклин 251
 Вицеин 231
 Водяной перец 164
 Вофавердин 318
 Галазолин 82
 Галантамина гидробромид 68
 Галаскорбин 104
 Галидор 139
 Галоперидол 33
 Галохин 272
 Гальманин 108
 Ганглерон 75
 Гастрин 201
 Гвимрин 283
 Гексаметилентетрамин 296
 Гексамидин 51
 Гексахлорэтан 285
 Гексенал 28
 Гексобарбитал 30
 Гелиомициновая мазь 251
 Гематоген детский в плитках 205
 — — с витамином С 205
 — жидкий 205
 — сухой 205
 Гемодез 245
 Гемостимулин 205
 Гемофирин 61
 Гемофобин 224
 Генцианвиолет 281
 Гендевит 181
 Геомицин 261

- Гепарин 220
 — мазь 221
 Гептилрезорцин 281
 Герамицин 262
 Гефеситин 226
 Гигроний 76
 Гидрокодона фосфат 115
 Гидрокортизон 193
 — ацетат 193
 — гемисукцинат 193
 — мазь 193
 Гидролизат казеина 232
 — ЦОЛИПК 232
 Гидролизин Л-103 232
 Гидроперит 295
 Гималина сульфат 72
 Гиосциамина сульфат 72
 Гипотиазид 158
 Гистамин 166
 — в возрастающих дозах СПОФА 166
 Гистидина гидрохлорид 232
 Гитален 123
 Гитоксин 123
 Гифотоцин 185
 Глауберова соль 95
 Гликоциклин 252
 Глина белая 103
 Глицерофосфат 226
 Глицерофосфен 226
 Глюкоза 231
 Глютаминовая кислота 51
 Глюконат кальция 51
 Гоматропина гидробромид 72
 Гомфотин 131
 Гонадотропин сывороточный 185
 — хориогонический 185
 Горец мясокрасный 104
 Горечавка 91
 Горицвет 127
 Горчичный спирт 87
 Грамицидин С 252
 — паста 252
 Гранатник 283
 Гризеофульвин 252
 Грыжник 159
 Гулявник струйчатый 96
 Гумизоль 234
 Дарминол 87
 Даукарин 148
 Девинкан 139
 Девясил 115
 Дегидрохолевая кислота 98
 Деготь березовый 298
 Дегранол 216
 Дезоксикортикостерона ацетат 192
 — триметилацетат 192
 Дезоксирибонуклеаза 201
 Дезопимон 55
 Декамевит 1 и 2 181
 Декамин 289
 Дексаметазон 194
 Делагил 275
 Деморфан 115
 Депрессин 142
 Дерматол 306
 Дермозолон 288
 Детская присыпка 108
 Дефероксамин 247
 Дехолин 99
 Диазолин 167
 Диакарб 155
 Диафеин 47
 Диафенилсульфон 292
 Диафиллин 152
 — венозум 152
 — глютеозум 152
 Дибазол 138
 Дибимиоциновая глазная мазь 252
 Дивенал 142
 Дигален-нео 126
 Дигидрострептомицина аскорби-
 нат 253
 — пантотенат 253
 — сульфат 253
 Дигидроэрготамин 84
 Дигидроэрготоксин 85
 — этансульфонат 83
 Дигипурен 123
 Дигитоксин 124
 Дигицин 126
 Дигицилен 126
 Дигоксин 133
 Дийодтирозин 188
 Дикаин 111
 Дикафен 47
 Диколин 76
 Дикумарин 220
 Диланизид 125
 Димедрол 167
 Димекарбин 138
 Димеколин 76
 Димэстрол 195
 Динезин 51
 Диоксоний 79
 Дионин 121
 Диоскорея кавказская 219
 Диоспонин 219

Диоксид 304
Дипасалин 142
Дипин 209
Диплацина дихлорид 79
Дипразин 167
Дипрофен 138
Дипрофиллин 136
Дисульфурмин 263
Дитетрациклиновая мазь 253
Дитиазанин 281
Дитилин 79, 80
Дитразина цитрат 285
Диуретин 136
Дифацил 74
Дифенин 52
Дихаск 289
Дихлорофен 281
Дихлотиазид 156
Диэтилстильбэстрол 195
— пропионат 196
Диэтифен 148
Доверов порошок 115
Допан 210
Допегит 140
Дрожжи очищенные пивные су-
хие 170
Дроперидол 33
Дуб — кора 104
Дуплекс 229
Дустундан 289
Душица 115
Екорoftалмол 176
Желатин медицинский 222
Желатиноль 223
Железо восстановленное 206
— закисного сульфат 205
— лектат 205
— углекислое закисное с саха-
ром 206
— яблочнокислое 206
Желудочный сок натуральный 201
Жель медицинская консервиро-
ванная 235
Женьшень 64
Жостер 93
Заманиха 65
Зверобой 105
Земляника 159
Змеевик 105
Золототысячник 91
Изадрин 81
Изафенин 96
Изобарин 85
Изоверин 164

Изоланид 133
Изониазид 268
Изоприн 77
Изоптин 148
Изохол 99
Иманин 312
Имизин 61
Имифос 210
Индерал 134
Индигокармин 317
Индопан 60
Индоцид 244
Инкрепан 202
Инсулин 190
Интенсаин 149
Интеркордин 149
Интермедин 186
Инфекундин 314
ИНХА-17 217
Иопаноевая кислота 316
Ипекакуана — корень 116
— настойка 116
— сироп 116
Ипразид 60
Ипрониазид 60
Истод 116
Ихтиол 300
Йод 228
Йодиол 294
Йодолипол 316
Йодоформ 294
Йопагност 318
Каланхоэ — мазь 234
— сок 234
Калимин 70
Калина 164
Калия ацетат 157
— бромид 36
— йодид 228
— оротат 236
— перманганат 295
— перхлорат 188
— хлорид 134, 245
Каломель 97
Кальцекс 296
Кальция глицерофосфат 227
— глюконат 225
— динариевая соль этиленди-
аминтетрауксусной кислоты
246
— карбонат осажденный 240
— кардиамид 60
— лактат 225
— пангамат 171

Кальция пантотенат 172
 — хлорид 225
 Камполон 171
 Камфоний 77
 Камфора растертая 58
 — мазь 87
 — раствор в масле для инъекций 58
 — — — — для наружного применения 87
 — спирт 88
 Камфодал 188
 Канамицина моносульфат 268
 Каолин 103
 Капли Зеленина 132
 Капсин 88
 Капситрин 88
 Карандаш кровоостанавливающий 108
 Карбахолин 68
 Карбол-глицерин 298
 Карболен 104
 Карбромал 30
 Кардиовален 132
 Кардиотраст 316
 Карловарская соль искусственная 95
 Карлсбадская соль 95
 Картолин 181
 Касторовое масло 96
 Каферид 206
 Квасцы 108
 — жженные 108
 Кватерон 77
 Кверцетин 175
 Келлатрин 142
 Келливерин 142
 Келлин 148
 Климактерин 198
 Коамид 172
 Кодеин 116
 — фосфат 116
 Кодтерпин 116
 Кокаина гидрохлорид 111
 Кокарбоксилаза 184
 — гидрохлорид 169
 Колларгол 304
 Колхамин 213
 Конваллятоксин 128
 Кондельфин 79
 Контрацептин «Т» 314
 Контрикал 204
 Коразол 58
 Корбелла 72
 Корвалол 38
 Коргликон 128
 Кордиазид 132
 Кордиамин 59
 Кордигит 124
 Корезид 128
 Корельборин 131
 Корконий 59
 Корнерин 130
 Коронтин 149
 Кортизона ацетат 194
 Кортин 193
 Корхорозид 131
 Котарнина хлорид 164
 Котермопс 117
 Кофадин 47
 Кофальгин 47
 Кофеин 55
 — бензоат натрия 56
 Кофекристин 48
 Кофетамин 48
 Коффен 48
 Крапива 164
 Красавка — густой экстракт 72
 — настойка 73
 — сухой экстракт 73
 Кризанол 268
 Кровохлебка 105
 Круцин 216
 Крушина имеретинская 93
 — ломкая 93
 Ксероформ 306
 Ксикаин 112
 Кукурузные рыльца 99
 Курантил 149
 Лагохилен 223
 Лагохилус опьяняющий 223
 Ландыш — настойка 129
 — сухой концентрат 129
 Лантозид 125
 Лапчатка 105
 Ларусан 268
 Левзея 65
 Левомепромазин 33
 Левомецетин 253
 — стеарат 254
 Леворин 254
 Лейкоген 207
 Лейкеран 212
 Лейцин 232
 Леморан 40
 Ленбирен 40
 Либриум 36
 Лидаза 202

- Лизол медицинский 298
 Лизоформ 296
 Ликватол 289
 Ликорина гидрохлорид 116
 Лимонная кислота 239
 Лимонник 65
 Линетол 219
 Линимент аммиачный 88
 — нафталяновой нефти 310
 Линкомицина гидрохлорид 254
 Липоевая кислота 219
 Липокаин 190
 Липоцеребрин 227
 Лобелина гидрохлорид 59
 Лопух 160
 Луронит 236
 Льняное семя 97
 Люминал 30
 Лютеурин 278
 Магния карбонат основной 240
 — окись 240
 — сульфат 95, 145
 — трисиликат 103
 Магнолия крупноцветная 141
 Мажептил 34
 Мазь бальзамическая по Вишневскому 299
 — Вилькинсона 299
 — серная на эмульсионной основе 312
 — — простая 312
 — — нафталяновая 310
 — с йодидом калия 294
 — «СТ» 290
 Маммофизин 186
 Маннитол 156
 Мараславин 90
 Марена красильная 241
 Масло дарминное 88
 — терпентинное очищенное 88
 Мать-и-мачеха 117
 Мебедрол 52
 Мегестранол 314
 Медиал 29
 Меди сульфат 302
 — цитрат 302
 Медротестрона пропионат 214
 Мезатон 81
 Мезокаин 113
 Мексаза 204
 Мексамин 217
 Мексаформ 288
 Мелипрамин 62
 Меллерил 62
 Мелликтин 80
 Меллсин 237
 Ментол 89
 Мепазин 32
 Мепанит 73
 Мепротан 35
 Меридил 57
 Мерказолил 189
 Меркамина аскорбинат 218
 — гидрохлорид 218
 Меркаптопурин 208
 Меркузал 155
 Местинон 70
 Месфенал 73
 Метазид 268
 Метамизил 35
 Метандростенолон 200
 Метацин 73
 Метиландростендиол 200
 Метилапогалантамина гидрохлорид 138
 Метил-Дофа 140
 Метиленовый синий 301
 Метилловый фиолетовый 281
 Метилсалицилат 89
 Метилтестостерон 198
 Метилтиоурацил 189
 Метилурацил 207
 Метилэргометрин 162
 Метилэстрадиол 196
 Метионин 232
 Метициллина натриевая соль 262
 Метотрексат 216
 Метронидазол 278
 Мефолин 35
 Миамбутол 272
 Миарсенол 275
 Мидокалм 40
 Миелобромол 216
 Миелосан 210
 Микосептин 291
 Микройод 189
 — с фенобарбиталом 189
 Микрофоллин 198
 Микроцид 254
 Миодил 318
 Мио-релаксин 80
 Мисклерон 220
 Можжевельник 160
 Молочная кислота 308
 Морская капуста 97
 Морской лук 130
 Морфина гидрохлорид 41
 Морфоциклин 254

- Мочевина 156
 — для инъекций 156
 Мужской папоротник 284
 Муравьиный спирт 89
 Мыло зеленое 309
 Мыльный корень 117
 Мышьяковистые таблетки 230
 — ангидрид 230
 Мята перечная 99
 Налорфина гидрохлорид 245
 Нанофин 77
 Наперстянка — лист 124
 — порошок из листьев 124
 — сухой концентрат 124
 Нарколан 28
 Настойка горькая 91
 Натрия арсенат 230
 — бензоат 117
 — бромид 36
 — гидрокарбонат 118, 241
 — йодид 229
 — какодилат 230
 — нитрит 146
 — нуклеинат 208
 — оксибутират 37
 — пара-аминосалицилат 269
 — салицилат 44
 — сульфат 95
 — тетраборат 309
 — тиосульфат 245
 — усинат 255
 — фосфат 241
 — хлорид 223
 Нафазолин 82
 Нафалан 310
 Нафталгин 310
 Нафтамон 282
 Нафтизин 81
 Нашатырно-анисовые капли 118
 Нашатырный спирт 90
 Невиграмон 293
 Нейротраст 316
 Неоанузол 109
 Неодикумарин 220
 Неомицина сульфат 255
 Неостибозан 285
 Неоцид 217
 Нериолин 130
 Неробол 200
 Нероболит 200
 Ниаламид 62
 Нибуфин 68
 Нигексин 143
 Никоверин 143
 Никодин 99
 Никотинамид 172
 Никотиновая кислота 172
 — — с календулой — таблетки
 КН 173
 Нистатин 255
 — натриевая соль 255
 Нитазол 278
 Нитранол 146
 Нитроглицерин 146
 Нитросорбид 146
 Нитрофунгин 292
 Нитрофурантоин 288
 Нитрофурилен 285
 Новарсенол 275
 Новобиоцина натриевая соль 256
 Новодрин для ингаляций 82
 Новоиманин 313
 Новокаин 112
 — масляный раствор 113
 Новокаиनाмид 134
 Новомигрофен 118
 Новоцефальгин 118
 Новоциллин 256
 Новурит 158
 Новэмбитол 210
 Новэмбихин 211
 Ноксирон 31
 Норадреналина гидротартрат 81
 Норсульфазол 264
 — натрий 264
 — серебряная соль 264
 Но-шпа 149
 Нуредол 62
 Обвойник 129
 Обзидан 134
 Облепиховое масло 178
 Одуванчик 99
 Оксазил 68
 Оксафенамид 100
 Оксациллина натриевая соль 256
 Оксикорт 262
 — аэрозоль 262
 Оксидин 35
 Оксипрогестерона капронат 196
 Оksитетрациклина гидрохлорид 256
 — дигидрат 257
 Окситоцин синтетический 162
 Оксолин 292
 Октадин 83
 Октилин 279
 Октэстрол 196
 Олеандомицина фосфат 257

Олететрин 257
Оливомидин 214
Олиметин 242
Олиторизид 131
Ольха 105
Омаин 213
Омефин 220
Омнопон 41
Онихолизин 290
Опий — порошок 41
— бензойная настойка 118
— простая настойка 41
— сухой экстракт 41
Орабет 192
Орнид 84
Ортосифон 160
Осарбон 279
Осарцид 279
Оссокальциноль 225
Оставник 91
Офтальмол 302
Павестезин 153
Палюфин 143
Панангин 150
Панкреатин 202
Пантокрин 65
Пантомицин 257
Пантоцид 295
Папаверина гидрохлорид 135
Папазол 143
Паратиреоидин 189
Парацетамол 44
Паркан 54
Паркопан 54
Пасомицин 269
Пассифлора инкарнатная 38
Паста боро-цинк-нафталановая 303
— «ГС» 109
Пастинацин 148
Пастушья сумка 165
Пафиллин 143
Пахикарпина гидройодид 78
Певироз 182
Пектол 118
Пектуссин 118
Пелентан 221
Пелентанетты 221
Пелоидин 236
Пелоидодистиллят 236
Пенициллиновая мазь 257
Пентабисмол 276
Пентальгин 48
Пентамин 78

Пентацин 246
Пентоксил 208
Пентрексил 262
Пепсин 202
Пептон 244
Пергидроль 296
Перекись водорода 295
Перец стручковый — плод 89
— — пластырь 90
Периплоин 130
Пертуссин 119
Петрушка 160
Пеуцеданин 217
Пижма 282
Пилокарпина гидрохлорид 68
Пинабин 242
Пиперазина адипинат 282
— сульфат 282
Пипольфен 168
Пирабутол 50
Пиразинамид 269
Пирамеин 48
Пираминал 49
Пиранал 49
Пирафен 49
Пиридоксина гидрохлорид 171
Пиридрол 57
Пирилен 78
Пиркофен 49
Пирогенал 236
Пирофос 69
Питуитрин 186
— М 185
Плазмол 244
Плазмоцид 273
Плаквенил 275
Платидин 143
Платифиллина гидротартрат 74
Подорожник — лист 119
— сок 91
Поливитамины 182
Полимерол 310
Полимиксина М сульфат 257
Полынь 92
Полькортолон 194
Прегнантол 165
Преднизолон 194
— мазь 194
Преднизон 193
Пресоцил 194
Префизон 187
Прогестерон 196
Прозерин 69
Пролактин 186

- Промедол 42
 Промеран 155
 Пропазин 32
 Пропер-мил 263
 Пропилйодон 317
 Протамина сульфат 224
 Протамин-цинк-инсулин 190
 Протаргол 304
 Противорвотная смесь 39
 Противоядие при отравлении тя-
 желыми металлами 246
 Псорален 244
 Псориазин 290
 Пурген 96
 Пустырник 39
 Пчелиный яд КФ 1 и КФ 2 234
 Радедорм 31
 Радикулин 186
 Радиоактивный йод 209
 — фосфор 209
 Рамнил 94
 Раствор аммиака 90
 — Бурова 109
 — глюкозы 25% и метиленового
 синего 1% 246
 — йода спиртовой 229
 — калия арсенита 230
 — Люголя 229
 — с глицерином 229
 — перекиси водорода концентри-
 рованный 296
 — формальдегида 297
 Раувазан 137
 Раунатин 136
 Рауседил 137
 Ревень 94
 Регенератор 233
 Редергам 85
 Редька посевная 100
 Резерпин 137
 Резорцин 299
 Реопирин 50
 Ретаболил 200
 Ретинола ацетат 176
 — пальмитат 176
 Рибофлавин 170
 — мононуклеотид 170
 Риванол 302
 Ридинол 52
 Ристомидина сульфат 258
 Рифадин 263
 Ромашка 106
 Ромпаркин 54
 Рондомицин 263
 Ронидаза 202
 Ртути амидохлорид 305
 — диодид 276
 — дихлорид 305
 — моноклорид 97
 — окись желтая 305
 — оксицианид 306
 — салицилат 276
 — цианид 276
 Ртутная мазь серая 306
 — висмутовая мазь 306
 Рубомицина гидрохлорид 215
 Рутин 175
 Рыбий жир 176
 Салафтол 299
 Салинимент 90
 Салициламид 44
 Салициланилид 290
 Салициловая кислота 308
 — спирт 308
 Салол 299
 Сальсолидина гидрохлорид 135
 Сальсолина гидрохлорид 135
 Салюзид 269
 — растворимый 269
 Санорин 82
 Сарколизин 211
 Саррацина гидротартрат 154
 Сатитурани 126
 Сбор противоастматический 150
 Свинца ацетат 109
 Свинцовая вода 109
 — пластырь простой 109
 Седадьгин 50
 Седуксен 35
 Секуринина нитрат 63
 Сенегал 119
 Сенна 94
 — сложный настой 94
 Сен-сен 119
 Сера очищенная 97
 Сергозин 317
 Серебра нитрат 304
 Сигетин 196
 Синалар 195
 — Н 195
 Синкумар 222
 Синтомицин 258
 Синэстрол 197
 Синюха голубая 154
 Сироп алоэ с железом 237
 Скипидар очищенный 88
 Скополамина гидробромид 74
 Совкаин 113

- Солодковый корень — сироп 119
 — — сложный порошок 94
 — капли от кашля 120
 Солутан 153
 Соль Исти-Су 95
 Солюсульфон 292
 Солюсурьмин 279
 Солютизон 270
 Соляная кислота разведенная 239
 Сомбревин 29
 Сосновые почки 120
 Софорин 290
 Спазмолитин 74
 Спиразидин 211
 Спирт борный 311
 — горчичный 311
 — лавандовый 311
 — мыльный 311
 — — сложный 311
 — резорциновый 311
 — салициловый 311
 — этиловый 312
 Спленин 199
 Спорынья 161
 — порошок 161
 Стальник пашенный 97
 Стекловидное тело 237
 Стеркулия платанолистная 65
 Стиптицин 164
 Стрептодимицин 258
 Стрептомициллин 258
 Стрептомицина сульфат 258
 — хлоркальциевый комплекс 259
 Стрептосалюзид 270
 Стрептоцид 264
 — растворимый 264
 Стрихнина нитрат 63
 Строфантин К 128
 Строфант — настойка 128
 Субехолин 59
 Суккудифер 126
 Сукрадбел 74
 Суксилеп 54
 Сулема 305
 Сульгин 265
 Сульсен 290
 Сульфадимезин 265
 Сульфадиметоксин 265
 Сульфазин 265
 Сульфаметин 270
 Сульфапиридазин 266
 Сульфацил 266
 — натрий 266
 Сульфонин 270
 Сунорэф 266
 Супрастин 168
 Суспензия инсулин-протамина 190
 — протамин-цинк-инсулина 190
 — цинк-инсулина 191
 — — — аморфного 191
 — — — кристаллического 191
 Сустак 147
 Сустанон-250 199
 Сушеница топяная — порошок из
 травы 154
 — — трава 154
 Стерофизина бензоат 78
 Табекс 66
 Таблетки желудочные с опиумом 154
 — — — экстрактом красавки 155
 — из плодов рябины черноплод-
 ной 175
 — Кармановой № 1 и № 2 52
 — мятные 155
 Таллиевый пластырь 291
 Танальбин 106
 Танин 106
 Тансал 110
 Тауремизин 59
 Теальбин 106
 Тегретол 54
 Тезан—эмульсия 218
 Текодин 42
 Теимнал 144
 Темисал 136
 Теобромин 136
 Теоверин 144
 Теодибаверин 144
 Теодинал 144
 Теофедрин 150
 Теофиллин 151
 Тепалюсал 144
 Тепафиллин 144
 Термопий 120
 Термопсис — сухой экстракт 120
 — трава 120
 Терпингидрат 120
 Тесальбен 110
 Тесаминал 145
 Тестобромлецит 198
 Тестостерона пропионат 199
 — фенилпропионат 199
 Тестэнат 199
 Тетацин-кальций 247
 Тетраолеан 263
 Тетрахлорэтилен 282
 Тетрациклин 259
 — — — основание с нистатином 259

Тетридин 30
 Тетурам 248
 Тиамина бромид 169
 — хлорид 170
 Тибон 270
 Тизерцин 33
 Тимол 282
 Тиоацетазон 270
 Тиобутал 28
 Тиопентал—натрий 28
 ТиоТЭФ 211
 Тиофасфамид 211
 Тиреоидин 187
 Тирозина сульфит 233
 Тиротропин 177
 Тифен 75
 Токсапин 237
 Толокнянка 160
 Торулин 170
 Торфот 237
 Трансамин 61
 Трасилол 204
 Третамин 212
 Трийодтиронины гидрохлорид 188
 Трийотраст 317
 Трилистник водяной 92
 Тримекаин 113
 Триметин 52
 Триоксазин 36
 Триомбрин 317
 Трипафлавин 301
 Трипсин кристаллический 203
 Триптитол 63
 Триседил 34
 Трифтазин 32
 Трихомонацид 280
 Трихопол 280
 Тромбин сухой 223
 Тропафен 84
 Тропацин 53
 Тубазид 268
 Тхмелины 107
 Тыква — порошок из семян 284
 — семена 284
 Тысячелистник 224
 Уголь активированный 104
 Укропная вода 121
 Ундевит 182
 Ундецин 291
 Унитиол 247
 Урзалл 280
 Урзалин 313
 Уретан 212
 Уробесалол 297
 Уродан 242
 Уросал 297
 Уросульфат 266
 — натрий 266
 Уротраст 319
 Уротропин 296
 Урутин 172
 Фали-кор 150
 Фенадон 42
 Фенакон 53
 Фенальгин 49
 Фенамин 56
 Фенасал 283
 Фенатин 56
 Фенацетин 45
 Фенилин 221
 Фенилсалицилат 299
 Фенобарбитал 30
 Феноксиметилпенициллин 259
 Фенолфталеин 96
 Фенол чистый 300
 — — жидкий 300
 Фентанил 43
 Фентоламина гидрохлорид 84
 Фепранон 55
 Фепромарон 221
 Ферковен 206
 Феррогематоген 206
 Феррокаль 207
 Ферроцерон 207
 Феррум лек 207
 Фетанол 81
 Фехолин 183
 Фиалка душистая 121
 Фибриноген 224
 Фибринолизин 213
 ФиБС 237
 Физостигмина салицилат 69
 Филиксан 284
 Фитин 227
 Фитоферролактол 227
 Флавакридина гидрохлорид 301
 Флагил 278
 Фламин 190
 Флоримицина сульфат 271
 Флуценар 294
 Фолиевая кислота 173
 Фолликулин 197
 Фонуриг 158
 Формалин 297
 — мазь 297
 Формидрон 297
 Фосфакол 69
 Фосфобнон 228

Фосфрен 227
 Фосфэстрол 214
 Франгин 95
 Френолон 34
 Фтазин 267
 Фталазол 267
 Фтивазид 271
 Фторафур 208
 Фторацизин 61
 Фторбензотетф 212
 Фторокорт 195
 Фторотан 27
 Фторурацил 209
 Фубромеган 75
 Фурагин 286
 Фурадонин 286
 Фуразолидон 286
 Фуразолин 286
 Фуразонал 286
 Фурацилин 287
 Фуросемид 158
 Хвощ полевой 160
 Химопсин 203
 α-Химотрипсин кристалличес-
 кий 203
 Хингамин 273
 Хинидина сульфат 134
 Хинина гидрохлорид 274
 — дигидрохлорид 274
 — сульфат 274
 Хиниофон 280
 Хинозол 287
 Хиноцид 274
 Хлоксил 283
 Хлоразин 274
 Хлоракон 53
 Хлоралгидрат 31
 Хлорамин Б 295
 Хлорацизин 148
 Хлорбутанола гидрат 31
 Хлорбутин 212
 Хлоридин 274
 Хлорофиллипт 313
 Хлороформ для наркоза 27
 Хлорофтальм 69
 Хлорпропамид 191
 Хлорпротиксен 63
 Хлортетрациклина гидрохлорид
 260
 Хлортрианизен 215
 Хлорэтил 27
 Хлорэтон 31
 Хмель обыкновенный 39
 Холагол 102
 Холевид 319
 Холелитин №№ 1, 2 и 3 100
 Холензим 101
 Холецин 101
 Холин-хлорид 173
 Хологон 98
 Холосас 101
 Хонсурид 203
 Хориогонин 187
 Хризомаллин 213
 Целанид 125
 Центедрин 37
 Церебро-лецитин 227
 Церебролизин 233
 Цетамифен 219
 Циазид 271
 Циамид 248
 Цианокобаламин 171
 Цигерол 310
 Циквалон 101
 Цикламид 191
 Циклодол 53
 Циклометиазид 156
 Циклосерин 263
 Циклофосфан 213
 Циклохин 272
 Цикорий 92
 Цимарин 130
 Циминаль 293
 Цимицифуга 141
 Цинка мазь 303
 — окись 303
 — сульфат 303
 Цинкундан 291
 Цинхофен 242
 Цистамина дигидрохлорид 218
 Цистеин 232
 Цистенал 243
 Цитварное семя 283
 Цититон 59
 Цитраль 177
 Цитрамон 49
 Цихоль 177
 Чабрец 120
 Чай аппетитный 92
 — желчегонный 101
 — мочегонный № 1 и 2 160
 — успокоительный 39
 Черемуха 107
 Черника 107
 Чеснок 313
 Чилибуха — настойка 64
 — сухой экстракт 64
 Чистец буквицветный 165

- Чистотел 101
 Шалфей 107
 Шиповник — жидкий концен-
 — трат 183
 — плод 183
 — сироп из плодов с витаминами
 С 183
 — — — — — и ягодным экс-
 — трактом 183
 Шлемник байкальский 141
 Эвкалипт 121
 Экмолин 260
 Экмоновоциллин 1 и 2 260
 Элениум 36
 Элеутерококк 66
 Эликсир грудной 121
 Эметина гидрохлорид 280
 Эндоксикрин 55
 Энтеросептол 288
 Эргокальциферол 177
 Эргометрина малеат 162
 Эрготал 161
 Эрготамин 162
 — тартрат 161
 Эргогтоксин 85
 Эревит 184
 Эризимин 129
 Эризимозид 129
 Эринит 147
 Эрипоэтин 208
 Эритромицин 261
 Эрпозид 140
 Эскодол 42
 Эскузан 66
 Эсрариола монобензоат 197
 — дипропионат 197
 Эстрон 197
 Этазол 267
 — натрий 267
 Этакридина лактат 302
 Этамид 243
 Этаминал-натрий 30
 Этаперазин 33
 Этизин 167
 Этилморфина гидрохлорид 121
 Этимидин 213
 Этимизол 60
 Этинилэстрадиол 197
 Этионамид 271
 Этоксид 271
 Этоний 293
 Эукомия 141
 Эулевомицетин 254
 Эуноктин 31
 Эусинтомицин 261
 Эуспиран 82
 Эуфиллин 151
 Эфедрина гидрохлорид 151
 Эфедрол 168
 Эфир для наркоза 27
 Эфициллин 261
 Эхинопсина нитрат 64
 Эхинор 293
 Ятрен 280

ЛАТИНСКИЙ ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Abicinum 125
 Abominum 201
 Aceclidinum 67
 Acepheum 56
 Acetyldigitoxinum 132
 Acidin-pepsinum 201
 Acidotestum 317
 Acidum acetylsalicylicum 44
 — aminocaproicum 204
 — arsenicosum anhydricum 230
 — ascorbinicum 174
 — benzoicum 307
 — boricum 307
 — citricum 239
 — dehydrocholicum 98
 — folicum 173
 — glutamimicum 51
 — hydrochloricum dilutum 239
 Acidum iopancicum 316
 — lacticum 308
 — lipoicum 219
 — nicotinicum 172
 — salicylicum 308
 — tartaricum 239
 Acofinum 46
 Acophytum NN 1, 2 et 3 86
 Acrichinum 172
 Adalinum 30
 Adebitum 192
 Adiposinum 184
 Adiurecrinum 184
 Adonisidum 127
 Adophenum 46
 Adrenalini hydrochloridum 80
 — hydrotartras 80
 Aephycillinum 261

Aethacridini lactas 302
 Aethamidum 242
 Aethaminalum-natrium 30
 Aethaperazinum 33
 Aethazolum 267
 — natrium 267
 Aether pro narcosi 27
 Aethimidinum 213
 Aethimizolum 60
 Aethinyloestradiolum 197
 Aethonium 293
 Aethoxydum 271
 Aethylii choridum 27
 Aethylmorphini hydrochloridum 121
 Aethyzinum 167
 Aevitum 175
 Aëronum 71
 Afungilum 285
 Albichtholum 300
 Allacilum 157
 Allilglycerum 277
 Allilsatum 312
 Allilsepum 312
 Allocholum 98
 Almecillinum 249
 Aloë 92
 Aloocimenum 166
 Alumen
 — ustum 108
 Aluminii hydroxydum 103
 Amazolum 46
 Amidopyrinum 43
 Aminorsonum 277
 Aminazinum 32
 Aminoacrichinum 277
 Aminochinolum 278
 Aminocrovinum 231
 Aminopeptidum 231
 Amitriptylinum 61
 Amizylum 34
 Ammifurinum 243
 Ammonii bromidum 36
 — chloridum 157
 Amycazolum 288
 Amylii nitris 146
 Anaesthesinum 110
 Anaesthesolum 110
 Analginum 43
 Analphenum 46
 Anaprilinum 83
 Anatruxonium 79
 Anbitalum 37
 Ancophenum 46
 Andipalum 142
 Androstendioli dipropionas 198
 Anethinum 147
 Anisum vulgaris 114
 Angiotrophinum 140
 Antabus 248
 Antasthmanum 152
 Antianaeminum 171
 Antidotum metallorum 246
 Antiforminum 308
 Antipsoriaticum 289
 Antipyrinum 43
 Antistruminum 228
 Antisympathinum 83
 Apicodinum 46
 Apilacum 234
 Apisarthronum 237
 Apomorphini hydrochloridum 114
 Apressinum 137
 Apropheum 70
 Aqua Foeniculi 121
 Arfonadum 78
 Argenti nitras 304
 Arminum 68
 Arpenalum 70
 Ascophenum 46
 Ascorutinum 180
 Asphenum 46
 Aspirinum 44
 Asthmatolum 150
 Atophanum 242
 Atropini sulfas 71
 Avisanum 153
 Axerophtholi acetas 176
 Azaphenum 61
 Bacca Pruni racemosae 107
 Balsamum Sanitas
 — Schostakowky 309
 Bamethansulfatum 137
 Barbamylum 29
 Barbara 98
 Barbitalum 29
 — natrium 29
 Barii sulfas pro roentgeno 315
 Barvincani hydrochloridum 64
 Batilolum 217
 Becarbonum 71
 Bellalginum 153
 Bellasponum 39
 Bellasthesinum 37
 Bellataminalum 37
 Bellazonum 53
 Belloidum 39
 Bemegridum 58

Bencainum 111
 Benzacinum 72
 Benzamonum 67
 Benzohexonium 75
 Benzonalum 50
 Benzonaphtholum 297
 Benzotephum 209
 Benzilii benzoas 292
 Benzylpenicillinum-kalium 249
 — natrium 250
 — novocainum 250
 Bepasalum 153
 Bepascum 267
 Berberini sulfas 98
 Beroxanum 243
 Besalolum 298
 Betacidum 224
 Betasinum 188
 Beta-sitosterinum 218
 Bethiolum 298
 Bicarmintum 309
 Bicillinum 1, 3 et 5 250
 Bigumalum 272
 Biliochinolum 102, 276
 Bilignostum 315
 Bilitrastum 316
 Biomycinum 260
 Bisalum 107
 Bismoverolum 276
 Bolus alba 103
 Boum-benge 87
 Borax 309
 Boroglycerinum 307
 Boromentholum 308
 Brevicollinum 163
 Bromcamphora 36
 Bromisovalum 30
 Bromuralum 30
 Bruneomycinum 214
 Bucarbanum 192
 Bupatolum 139
 Butadionum 44
 Butamidum 190
 Caferridum 206
 Calcex 296
 Calcii carbonas praecipitatus 239
 — cardiamidum 60
 — chloridum 225
 — dinatrium EDTA
 — gluconas 51, 225
 — glycerophosphas 227
 — lactas 225
 — pangamas 171
 — pantothenas 172
 Calomelas 97
 Camphodalum 188
 Camphonium 77
 Camphora trita 58
 Campololum 171
 Capsinum 88
 Capsitrinum 88
 Carbacholinum 68
 Carbo activatus 104
 Carbolenum 104
 Carbol-glycerinum 298
 Carbromalum 30
 Cardiotrastum pro injectionibus 316
 Cardiovalenum 132
 Carotolum 181
 Celanidum 125
 Centedrinum 57
 Cerebro-lecithinum 227
 Cerebrolysinum 233
 Cetamiphenum 219
 Chingaminum 273
 Chinidini sulfas 134
 Chinini hydrochloridum 274
 — dihydrochloridum 274
 — sulfas 274
 Chiniofonum 280
 Chinocidum 274
 Chinosolum 287
 Chloraconum 53
 Chloracyzinum 148
 Chlorali hydras 31
 Chloraminum B 295
 Chlorazinum 274
 Chlorbutinum 212
 Chloretonum 31
 Chloridinum 274
 Chlorobutanoli hydras 31
 Chloroformium pro narcosi 27
 Chlorophthalmum 69
 Chlorophylliptum 313
 Chlorpropamidum 191
 Chlorprothixenum 62
 Chlortetracyclini hydrochloridum 260
 Chlortrianisenum 214
 Chloxylyum 283
 Cholagolum 102
 Cholecinum 101
 Chole conservata medicata 235
 Cholelytinum NN 1, 2 et 3 100
 Cholenzymum 101
 Cholevidum 319
 Cholini chloridum 173

Chologonum 98
 Cholosasum 101
 Chonsuridum 203
 Choriogoninum 187
 Chrysanolum 268
 Chrysomallinum 215
 Chymopsinum 203
 Chymotrypsinum crystallisatum 203
 Cicholum 177
 Ciminalum 292
 Cinchophenum 242
 Citralum 177
 Citramonum 49
 Climacterinum 198
 Coamidum 172
 Cocaini hydrochloridum 111
 Cocarboxylasum 184
 — hydrochloridum 169
 Codeinum 116
 — phosphas 116
 Codterpinum 116
 Cofalginum 47
 Coffecristinum 48
 Coffeinum 55
 — natrii bensoas 56
 Coffenum 55
 Coffetaminum 48
 Colchaminum 213
 Collargolum 304
 Condelphinum 29
 Contraceptinum «T» 314
 Contricalum 204
 Convallatoxinum 128
 Cophadinum 47
 Corazolum 58
 Corbella 92
 Corchorosidum 131
 Cordiaminum 59
 Cordiasidum 132
 Corelborinum 181
 Coresidum 129
 Corglyconum 129
 Cornerinum 130
 Corontinum 149
 Corpus vitreum 236
 Cortex Alni 105
 — Eucommiae 141
 — Frangulae 92
 — Granati 283
 — Quercus 104
 Cortinum 193
 Cortisoni acetatas 194
 Corvalolum 38
 Cotarnini chloridum 164

Cothormopsium 117
 Crucinum 216
 Cupri citras 302
 — sulfas 302
 Curantilum 149
 Cutizonum 292
 Cyamidum 248
 Cyanocobalaminum 171
 Cyazidum 271
 Cyclamidum 191
 Cyclodolum 53
 Cyclochinum 272
 Cyclomethiazidum 156
 Cyclophosphanum 213
 Cycloserinum 263
 Cycvalonium 101
 Cygerolum 310
 Cymarinum 130
 Cystamini dihydrochloridum 218
 Cysteinum 233
 Cystenalum 242
 Cytitonum 59
 Darminolum 87
 Daucarinum 148
 Decamevitum 1 et 2 181
 Decaminum 289
 Decholinum 99
 Decoctum Lycopodii Selaginosi 248
 Deferoxaminum 247
 Degranolum 216
 Delagilum 275
 Demorphanum 115
 Depressinum 142
 Dermatolum 306
 Dermosolonum 288
 Desopimonum 55
 Desoxycorticosteroni acetatas 192
 — trimethylacetatas 192
 Desoxyribonucleasa 201
 Dexamethazonum 194
 Diacarbium 155
 Diaethiphenum 148
 Diaethylstilboestrolum 195
 — propionas 196
 Diapheinum 47
 Diaphenylsulfonium 292
 Diaphyllinum 152
 — gluteosum 152
 — venosum 152
 Diazolinum 167
 Dibazolum 138
 Dicainum 111
 Dicaphenum 47
 Dichascum 289

- Dichlorophenum 281
 Dichlothiazidum 156
 Dicolinum 76
 Dicumarinum 220
 Digalen-neo 126
 Digicilenum 126
 Digicilum 126
 Digipurenum 123
 Digitoxinum 124
 Digoxinum 133
 Dihydroergotaminum 84
 Dihydroergotoxinum 84
 — ethansulfonas 83
 Dihydrostreptomycini ascorbas 253
 — pantothenas 253
 — sulfas 263
 Diiodthyrosinum 188
 Dilanisidum 125
 Dimecarbinum 138
 Dimecolinum 76
 Dimedrolum 167
 Dimoestrolum 195
 Dinezinum 51
 Diocidum 304
 Dioninum 121
 Dioscorea caucasica 219
 Diosponinum 219
 Dioxonium 79
 Dipasalinum 142
 Diphacilum 74
 Dipheninum 52
 Dipinum 209
 Diplacini dichloridum 79
 Diprazinum 167
 Diprophenum 138
 Diprophyllinum 136
 Disulforminum 263
 Dithiazaninum 281
 Dithylinum 79
 Ditrazini citras 285
 Diuretinum 136
 Divenalum 142
 Dopanum 210
 Dopegitum 140
 Dragée Camphodolum 188
 — Tetracyclini cum nistatino 259
 — vitamini E 178
 Droperidolum 33
 Duplex 229
 Dustundanum 289
 Echinopsini nitras 63
 Echinorum 293
 Ecmolinum 260
 Ecmovocillinum 1 et 2 260
 Elenium 36
 Elixir pectorale 121
 Emetini hydrochloridum 280
 Emplastrum Acrichinum 277
 — Capsisum 90
 — Plumbum simplex 109
 — Thallium 291
 Emulsum Aloë 234
 — analgesias 110
 — Thesani 218
 Endoxycrinum 55
 Enteroseptolum 288
 Ephedrini hydrochloridum 151
 Ephedrolum 168
 Erevitum 184
 Ergocalciferolum 177
 Ergometrini maleas 162
 Ergotalum 161
 Ergotaminum 162
 — tartras 161
 Ergotoxinum 85
 Erpozidum 140
 Erynitum 147
 Erypoethinum 208
 Erysiminum 129
 Erysimosidum 129
 Erythromycinum 261
 Escodolum 42
 Escuzanum 65
 Ethlonamidum 271
 Eulaevomycetinum 254
 Eunocinum 31
 Euphyllinum 151
 Euspyranum 82
 Eusynthomycinum 261
 Extractum Aloës fluidum 233
 — — — pro injectionibus 234
 — — siccum 93
 — — spissum 93
 — Belladonnae siccum 73
 — — spissum 72
 — Bursae pastoris fluidum 164
 — Convallariae siccum 129
 — Descurinae Sophiae fluidum 96
 — Elleutherococcus fluidum 65
 — Filicis maris spissum 284
 — folii Digitalis siccum 124
 — Helichrysi arenarii siccum 98
 — Hyoscyami siccum 71
 — Leonticis siccum 91
 — Magnoliae grandiflorae fluidum 141
 — Opii siccum 41
 — Polygoni carnei fluidum 104

- Extractum Aloës hydropiperis**
 fluidum 163
 — Rhamni imeritinae fluidum 93
 — Rosae fluidum 183
 — Rubiae tinctori siccum 241
 — Stachys betonicaeflorae fluidum 165
 — Strychni siccum 63
 — Thermopsisidis siccum 120
 — Urticae fluidum 164
 — Valerianae spissum 38
 — Viburni fluidum 164
Faex medicinale 170
Fali-corum 150
Fecholinum 183
Fercovenum 206
Ferrocalum 207
Ferroceronum 207
Ferrohaematogenum 206
Ferri carbonas saccharatum 206
 — lactas 205
 — Lec 207
 — reductum 206
 — sulfas oxydulatum 205
Fibrinogenum 224
Fibrinolysinum 203
FIBS 237
Filixanum 284
Flagylum 278
Flaminum 100
Flavacridini hydrochloridum 301
Flores Arnicae montanae 222
 — Centaureae 159
 — Chamomillae 106
 — Cinae 283
 — Helichrysi arenarii 98
 — et folium Lagochilus inebrians 223
 — Sambuci 104
 — Tanaceti 282
Florimycini sulfas 271
Folium Betulae 159
 — Digitalis 124
 — Eucalypti 121
 — Farfarae 117
 — Menthae piperitae 99
 — Menyathidis 92
 — Orthosiphoni 160
 — Plantaginis 119
 — Salviae 107
 — Sennae 94
 — Urticae 164
 — Uvae ursi 160
 — Vitis idaeae 159
Folliculinum 197
Fonuritum 158
Formalinum 297
Formidronum 297
Franginum 95
Frenolonum 34
Fructus Capsici 89
 — Grataegi 133
 — et semen Schizandrae chinensis 65
 — Fragariae 159
 — Juniperi 160
 — Myrtilli 107
 — Petroselini 160
 — Rhamni catharticae 92
 — Rosae 183
Fubromeganum 75
Furacilinum 287
Furadoninum 289
Furaginum 186
Furazolidonum 286
Furazolinum 286
Furazonalum 286
Furosemidum 158
Galanthamini hydrobromidum 68
Galascorbinum 104
Galazolinum 82
Galmaninum 108
Gangleronum 75
Gastrinum 201
Gelatina medicinale 222
Gelatinolum 223
Gemmae Betulae 159
 — Pini 120
Gentianvioletum medicinale 281
Geomycinum 261
Geramycinum 262
Gialbi 103
Gitalenum 123
Gitoxinum 123
Glucosum 231
Glycerophosphatum 226
Glycerophosphenum 226
Glycocyclinum 252
Gomphotinum 131
Gonadotropinum chorionicum 185
 — sericum 185
Gramicidinum S 252
Granulae Sen-sen 119
Griseofulvinum 252
Guimrinum 283
Gumisolum 234
Guttae Zelenini 132
Haematogenum 205

- Haematogenum cum acido ascor-**
 binico 205
 — fluidum 205
 — siccum 205
Haemodesum 245
Haemophobinum 224
Haemophyrium 61
Haemostimulinum 205
Halidorum 139
Halochinum 272
Haloperidolum 33
Hefaeophytinum 226
Hende vitum 181
Heparinum 220
Heptylresorcinum 281
Herba Adonidis vernalis 127
 — *Astragali pubiflorae* 140
 — *Centaurii* 91
 — et radix *Chelidonii* 101
 — *Equiseti arvensis* 160
 — *Gnaphalii uliginosi* 154
 — *Herniariae* 159
 — *Hyperici perforati* 105
 — *Ledi palustris* 114
 — *Leonuri* 39
 — *Millefolii* 224
 — *Origani* 115
 — et radix *Polemonii coerulei*
 154
 — *Serpylli* 120
 — *Thermopsidis* 120
Hexachloroethanum 285
Hexamethylentetraminum 296
Hexamidinum 51
Hexenalum 28
Hexobarbitalum 30
Histaminum 166
 — ascendens 166
Histidini hydrochloridum 232
Homatropini hydrochloridum 72
Hormonum adrenocorticotropinum
 185
Humulus Lupulus glandularum 39
Hydrargyri amidochloridum 305
 — cyanidum 277
 — dichloridum 305
 — diiodidum 276
 — monochloridum 97
 — oxycianydum 306
 — oxydum flavum 305
 — salicylas 276
Hydrocodoni phosphas 115
Hydrocortisonum 193
 — acetas 193
Hydrocortisonum hemisuccinas
 193
Hydrolysatum caseini 232
 — ЦОЛИПК 232
Hydrolysinum L—103 232
Hydroperitum 295
Hygronium 76
Hyoscyamini sulfas 72
Hypothiazidum 158
Hyphotocinum 185
Ichthyolum 300
Imanium 312
Imiphosum 210
Imizinium 61
Increpanum 202
Inderalum 134
Indigocarminum 317
Indocidum 244
Indopanum 60
Infecundinum 314
Infusum Sennae compositum 94
INHA-17 272
Insulinum 190
Intensainum 149
Intercordinum 149
Intermedinum 186
Iodinolum 294
Iodoformium 294
Iodolipolum 316
Iodum 228
Iopagnostum 318
Iprazidum 60
Iproniazidum 60
Isadrinum 81
Isapheninum 96
Isobaritium 84
Isocholum 99
Isolanidum 133
Isoniazidum 268
Isoprinum 77
Isoptinum 148
Isoverinum 164
Jécorophthalmolum 176
Kalii bromidum 36
 — chloridum 134, 245
 — iodidum 228
 — orotas 235
 — perchloras 188
 — permanganas 295
Kalyminum 70
Kanamycini monosulfas 268
Khellatrinum 142
Khellinum 148
Khelliverinum 142

- Laemoranium 40
 Laevomepromazinum 33
 Laevomyccinum 253
 — stearas 254
 Lagochilenum 223
 Lantosidum 125
 Larusanum 268
 Lenbirenium 40
 Leuceranium 212
 Leucinum 232
 Leucogenum 204
 Levorinum 254
 Librium 36
 Linaetholum 219
 Lincomycini hydrochloridum 254
 Linimentum ammoniatum 88
 — Naphthalanum 310
 — Naphthalginum 310
 Lipocainum 190
 Lipocerebrinum 227
 Liquatolum 289
 Lobelini hydrochloridum 59
 Luminalum 30
 Luronitum 235
 Lutenurinum 278
 Lycorini hydrochloridum 117
 Lydasum 202
 Lysoformium 296
 Lysolum medicinale 298
 Mageptilum 34
 Magnesii ascorbas cum glucoso 174
 — oxydum 240
 — subcarbonas 240
 — sulfas 95, 141
 — trisilicas 103
 Mammophysinum 186
 Mannitolum 157
 Maraslavinum 90
 Mebedrolum 52
 Medinalum 29
 Medrotestroni propionas 214
 Megestranolum 314
 Melipraminum 62
 Mellerilum 62
 Mellictinum 80
 Mellisinum 237
 Mentholum 89
 Mepanitum 73
 Mepazinum 32
 Mepholinum 55
 Meprothanum 35
 Mercamini ascorbas 218
 — hydrochloridum 218
 Mercaptopurinum 208
 Mercazolilum 189
 Mercusalum 155
 Meridilum 57
 Mesatonum 81
 Mesocainum 113
 Mesphenalum 73
 Mestinonum 70
 Metamyzilum 35
 Methacinum 73
 Methandrostenolonum 200
 Methazidum 268
 Methicillinum-natrium 262
 Methioninum 232
 Methotrexatum 216
 Methylandrostendiolum 200
 Methylapogalantamini hydrochloridum 138
 α -Methyl-Dopa 140
 Methylenum coeruleum 301
 Methylergometrinum 162
 Methylsalicylas 89
 Methylloestradiolum 196
 Methyltestosteronum 198
 Methylthiouracilum 189
 Methyluracilum 207
 Metronidazolum 278
 Mexaformum 288
 Mexaminum 217
 Mexasum 204
 Microcidum 254
 Microiodum 189
 — cum phenobarbitalo 189
 Microfollinum 198
 Mixtura analeptica 57
 — Bechterevi 127
 Miscleronum 220
 Morphini hydrochloridum 41
 Morphocyclinum 254
 Myambutolum 272
 Myarsenolum 275
 Mycoseptinum 291
 Mydocalmum 40
 Myelobromolum 216
 Myelosanum 210
 Myodilum 318
 Myo-Relaxinum 80
 Nalorphini hydrochloridum 245
 Nanophynum 77
 Naphazolinum 82
 Naphthalanum 310
 Naphthammonum 282
 Naphthyzinum 81
 Narcolanum 28

Natrii adenosintriphosphas 226

- arsenas 230
- benzoas 117
- bromidum 36
- chloridum 223
- hydrocarbonas 118, 240
- iodidum 229
- kakodylas 230
- nitris 146
- nucleinas 208
- oxybutyras 37
- para-aminosalicylas 269
- phosphas 241
- salicylas 241
- sulfas 95
- tetraboras 309
- thiosulfas 245
- usninas 255
- Neoanusolum 109
- Neocidum 217
- Neodicumarinum 220
- Neomycini sulfas 255
- Neostibosanum 285
- Neriolinum 130
- Nerobolum 200
- Nerobolilum 200
- Neurotrastum 316
- Nevigramonum 293
- Nialamidum 62
- Nibuphinum 68
- Nicodinum 99
- Nicotinamidum 172
- Nicoverinum 143
- Nihexynum 143
- Nitazolum 278
- Nitranolum 146
- Nitrofunginum 292
- Nitrofurantoinum 288
- Nitrofurylenum 285
- Nitroglycerinum 146
- Nitrosorbidum 147
- Noradrenalini hydrotartaras 81
- Norsulfazolum 264
- argentum colloidal 264
- natrium 264
- Nospanum 149
- Novarsenolum 275
- Novembichinum 211
- Novembitolum 210
- Novobiocinum-natrium 256
- Novocainamidum 134
- Novocainum 112
- Novocephalinum 48
- Novocillinum 256

Novodrinum 82

- Novoimaninum 313
- Novomigrophenum 48
- Novuritum 158
- Noxyronum 31
- Nuredalum 62
- Nystatinum 255
- natrium 255
- Obsidanum 134
- Octadinum 83
- Octilinum 279
- Octoestrolum 196
- Oestradioli benzoas 197
- dipropionas 197
- Oestronum 197
- Oleandomycini phosphas 257
- Oletetrinum 257
- Oleum Anisi 114
- Camphoratum pro usu externo 87
- Cinae 87
- Hyppophaeae 178
- jecoris Aselli 176
- Ricini 96
- Terebinthinae rectificatum 88
- Vaselinei 96
- Olimetinum 241
- Olitorisidum 131
- Olivomycinum 214
- Omainum 213
- Omephinum 220
- Omnoponium 41
- Onycholysinum 290
- Opium pulveratum 41
- Orabetum 192
- Ornidum 83
- Osarbonum 278
- Osarcidum 279
- Ossocalcinolum 225
- Oxacillinum-natrium 256
- Oxaphenamidum 100
- Oxazylum 68
- Oxycortum 262
- aaeozolum 262
- Oxylidinum 35
- Oxyprogesteroni capronas 196
- Oxytetracyclini dihydras 256
- hydrochloridum 256
- Oxytocinum 162
- Pachycarpini hydrochloridum 78
- Palufinum 143
- Pananginum 150
- Pancreatinum 202
- Pantocidum 295

Pantocrinum 65
 Pantomycinum 257
 Papaverini hydrochloridum 135
 Papazolium 143
 Paphyllinum 143
 Paracetamolium 44
 Paraffinum liquidum 96
 Parathyreoidinum 189
 Parkanum 54
 Parkopanum 54
 Pasomycinum 269
 Passiflora incarnata 38
 Pasta boro-zinc-naphthalani 303
 — Gramicidini 252
 — «GS» 109
 Pastinacinum 148
 Pavesthesinum 153
 Pectolum 118
 Pectussinum 118
 Pelentanum 221
 Peloidinum 236
 Peloidodestillatum 237
 Pentabismolum 276
 Pentacinum 246
 Pentalginum 48
 Pentaminum 78
 Pentoxylum 208
 Pentrexylum 262
 Pepsinum 202
 Peptonum 243
 Perhydrolum 296
 Periplocinum 130
 Pertussinum 119
 Peucedaninum 217
 Pevirosium 182
 Phenacetinum 45
 Phenaconum 53
 Phenadonum 42
 Phenalginum 49
 Phenaminum 56
 Phenasalum 283
 Phenatinum 56
 Phenobarbitalum 30
 Phenolum purum 300
 — — liquefactum 301
 Phenoxymethylpenicillinum 259
 Phentanylum 43
 Phentolamini hydrochloridum 84
 Phenylinum 221
 Phenylis salicylas 299
 Phepranonum 55
 Phepromaronum 221
 Phethanolum 81
 Phlucenarum 294
 Phosphacolum 69
 Phosphobionum 228
 Phosphoestrolum 214
 Phosphrenum 227
 Phthalazolum 267
 Phthazinum 267
 Phthivazidum 271
 Phthracizinum 61
 Phthorafurum 208
 Phthorbenzotephum 212
 Phthorocortum 195
 Phthorothanum 27
 Phthoruracilum 209
 Physostigmini salicylas 69
 Phytinum 227
 Phytoferrolactolum 227
 Pilocarpinihydrochloridum 68
 Pinabinum 241
 Piperazini adipinas 281
 — sulfas 282
 Pipolphenum 168
 Piridrolum 57
 Pirilenum 78
 Pituitrinum 186
 — M 185
 — siccum 184
 Pix liquida Betulae 298
 Plaquenilum 275
 Plasmocidum 273
 Plasmolum 244
 Platyphyllini hydrotartras 74
 Platydinum 143
 Plumbi acetas 109
 Polcortelonum 194
 Polymerolum 310
 Polymyxini M sulfas 257
 Praegnantolum 164
 Prednisolonum 194
 Prednisonum 193
 Prephysonum 187
 Presocylum 194
 Progesteronum 186
 Prolactinum 186
 Promedolum 42
 Promeranium 155
 Propazinum 32
 Proper-mylum 263
 Propyliodonum 316
 Proserinum 69
 Protamini sulfas 224
 Protamin-zinc-insulinum 190
 Protargolum 304
 Psoralenum 243
 Psoriasinum 290

Pulvis Bulbi Scillae 130
 — folii Digitalis 124
 — Doveri 115
 — Glycyrrhise compositus 94
 — Laminariae saccharinae 97
 — Secalis cornuti 161
 — seminis Cucurbitae 284
 Purgenum 96
 Pyrabutolum 50
 Pyrameinum 48
 Pyraminalum 49
 Pyranalum 49
 Pyraphenum 49
 Pyrazinamidum 269
 Pycophenum 49
 Pyridoxini hydrochloridum 171
 Pyrogenalum 236
 Pyrophosum 69
 Quateronum 77
 Quercetinum 175
 Radedormum 31
 Radix Althaeae 103
 — Bardanae 160
 — Cichorii 92
 — Gentianae 91
 — Ginsengi 64
 — Ipecacuanhae 116
 — Ononidis arvensis 97
 — Polygalae 116
 — Saponariae 117
 — Senegae 119
 — Taraxaci 99
 — Violae odoratae 121
 Raphanus sativus 100
 Raunatinum 136
 Rausedylum 137
 Rauvasanum 137
 Redergamum 85
 Regeneratorum 233
 Reserpinum 137
 Resorcinum 299
 Retabolilum 200
 Rhamnilum 94
 Rheopyrinum 50
 Rhizoma Acorus Calamus 91
 — Bistortae 105
 — et radix Inulae helenii 115
 — — — Rhei palmati 94
 — — — Sanguisorbae 105
 — Tormentillae 105
 — et radix Valerianae 38
 Riboflavinum 170
 — mononucleotidum 170
 Ridinolum 52

Pifadinum 263
 Ristomycini sulfas 258
 Rivanolum 302
 Romparkinum 54
 Rondomycinum 263
 Ronidasum 202
 Rubomycini hydrochloridum 215
 Rutinum 175
 Salaphtholum 299
 Sal carolinum factitium 95
 — Isthii-su 95
 Salicylamidum 44
 Salicylanilidum 290
 Salinimentum 90
 Salolum 299
 Salsolidini hydrochloridum 135
 Salsolini hydrochloridum 135
 Saluzidum 269
 — solubile 269
 Sanorinum 82
 Sapo viridis 309
 Sarcolysinum 211
 Sarracini hydrotartras 154
 Satituranum 126
 Scopolamini hydrobromidum 71
 Secale cornutum 161
 Securinini nitras 63
 Sedalginum 50
 Seduxenum 35
 Semen Cucurbitae 284
 — Lini 97
 Sergosinum 317
 Sirupus Aloës cum ferro 236
 — Glycyrrhizae 119
 — Ipecacuanhae 116
 Solusulfonum 292
 Solusurminum 279
 Solutanum 153
 Soluthisonum 270
 Solutio acidi ascorbinici 10% cum
 Thiamino bromido 5% 180
 — Ammonii caustici 90
 — — anisatus 118
 — Burovi 109
 — Camphorae oleosae 58
 — Formaldehydi 297
 — Glucosi 25% et Methyleni coe-
 rulei 1% pro injectionibus
 246
 — Hydrogenii peroxydati concent-
 rata 296
 — — — diluta 295
 — Iodi spirituosae 229
 — Kalii acetatis 157

- Solutio acidi ascorbinici arseni-
 cosi 230
 — Lugoli 229
 — — cum glycerino 229
 — Natrii ascorbati 174
 — — o-iodhipuratis Iodo-131
 notati pro injectionibus 209
 — — phosphatis Phosphoro-32
 pro injectionibus 209
 — Novicovi 301
 — Novocaini oleosa 113
 — Plumbi 109
 — Retinoli acetatis oleosa 176
 — — palmitatis oleosae 176
 — vitamini A oleosa 176
 — — E oleosa 178
 — — E spirituosa-saccharum 178
 Sombrevinum 29
 Sophorinum 290
 Sovcainum 113
 Spasmolytinum 74
 Species antiasthmatica 150
 — diuretica 160
 Spherophysini bensoas 78
 Spirazidinum 211
 Spiritus boricum 311
 — camphoratus 88
 — formicicus artificialis 89
 — Lavandulae 311
 — resorcinum 311
 — salicylicum 311
 — saponatus 311
 — — compositus 311
 — Sinapis 87, 311
 — vini 312
 Spleninum 199
 Stibio-natrium tartras 284
 Stigmata Maydis 99
 Stilus aluminis 108
 Streptocidum 264
 — solubile 264
 Streptodimycinum 258
 Streptomycillinum 258
 Streptomycini et calcii chloridum
 259
 — sulfas 258
 Streptosulazidum 270
 Strophanthinum K 128
 Strychnini nitras 63
 Strypticinum 164
 Subecholinum 59
 Succudiferum 126
 Succus gastricus naturalis 201
 — Kalanchoës
 Succus Plantaginis 91
 Sucradbellum 94
 Sulfacylum 266
 — natrium 266
 Sulfadimethoxinum 265
 Sulfadimezinum 265
 Sulfamethinum 270
 Sulfapyridazinum 266
 Sulfazium 265
 Sulfoninum 270
 Sulfur depuratum 97
 Sulginum 265
 Sulsenum 290
 Suprastinum 168
 Suspensio placentae 234
 — zinc-insulini 190, 191
 — — — amorphi
 — — — crystallisati
 Sustacum 147
 Sustanonum-250 199
 Suxilepum 54
 Sygetinum 196
 Synalarum 195
 — N 195
 Syncumarum 222
 Synoestrolum 197
 Synthomycinum 258
 Tabex 66
 Tabulettae acidi arsenicosi obducta
 230
 — Adonis-brom 127
 — Adonisi 127
 — Antivomica 89
 — Bechterevi 127
 — Blaudi 204
 — — cum acido arsenicoso 205
 — Cordigitum 124
 — Cornerinum 130
 — ex fructibus Aroniae 175
 — Karmanovae 1 et 2 52
 — KN 173
 — olei Menthae 155
 — Pelentanettae
 — Phenolphthaleini 96
 — stomachicae cum extracto
 Belladonnae 155
 — — — opio 154
 — vitamini C, PP, 180
 — — C, PP, B 182
 Tannalbinum 106
 Tanninum 106
 Tansalum 110
 Tauremisinum 59
 Tchemelinum 107

- Tegretolum 54
 Terpinum hydratum 120
 Testobromlecithum 198
 Testoenatum 199
 Testosteroni phenylpropionas 199
 — propionas 199
 Tetacinum-calcium 246
 Tetrachloroethylenum 282
 Tetracyclinum 259
 — hydrochloridum 259
 Tetraoleanum 263
 Tetridinum 30
 Teturamum 248
 Thealbinum 106
 Thecodinum 42
 Theminalum 144
 Themisalum 136
 Theobrominum 136
 Theodibaverinum 144
 Theodinalum 144
 Theophedrinum 150
 Theophyllinum 151
 Theoverinum 144
 Thepalusalum 144
 Thepaphyllinum 144
 Thermopium 120
 Thesalbenum 110
 Thesaminalum 145
 Thiamini bromidum 169
 — chloridum 170
 Thioacetazonum 270
 Thiobutalum 28
 Thiopentalum-natrium 28
 Thiophosphamidum 211
 Thiotepum 211
 Thymolum 282
 Thyreoidinum 187
 Thyrosini sulfuris 233
 Thyrotropinum 187
 Tibonum 270
 Ticha-askane 103
 Tinctura Absinthii 92
 — Allii sativi 313
 — Aloës 93
 — amara 91
 — Aralii manshurici 64
 — Belladonnae 73
 — Berberis amurensis 163
 — — vulgaris 163
 — Cimicifugae dahuricae 141
 — Convallariae 119
 — Echinopanacis 64
 — et extractum fluidum Leuzeae
 carthamoidis 64
 Tinctura Ferri pomati 206
 — Ipecacuanhae 116
 — Opii benzoica 118
 — — simplex 41
 — Periplocae 129
 — Scutellariae 141
 — Sterculiae platanfolii 65
 — Strophanthi 128
 — Strychni 63
 — Thalictri foetidi 140
 — Valerianae 38
 Tiphenum 75
 Tisercinum 33
 Torfotum 237
 Torulinum 170
 Toxapinum 237
 Transaminum 61
 Trasylolum 204
 Tretaminum 212
 Trichomonacidum 280
 Trichopolium 280
 Triiodothyronii hydrochloridum 188
 Triiotrastum 317
 Trimecainum 113
 Trimethinum 52
 Triombrinum 317
 Trioxazinum 36
 Triphthazinum 32
 Trisedylum 34
 Trombinum siccum 223
 Tropacinum 53
 Tropaphenum 83
 Trypaflavinum 301
 Trypsinum crystallisatum 203
 Tryptizolum 62
 Tubazidum 268
 Undecinum 291
 Undevitum 182
 Unguentum Apisartronum
 — autolum 309
 — Camphoratum 87
 — Dibiomycinum ophthalmicum
 252
 — Ditetracyclinum 253
 — Formalinum 297
 — Heliomycinum 251
 — heparini 221
 — Hydrargyri-bismuthum 306
 — — cinereum 306
 — Hydrocortisonum 193
 — Kalanchoës 235
 — Kalium iodatum 294
 — naphthalani-sulfuratum 310
 — ophthalmolum 302

— Unguentum oxolinum 292
— Penicillinum 257
— Prednisolonum 194
— «ST» 29
— sulfuratum 312
— — simplex 312
— sunorephum 266
— Vipratoxum 238
— Viprosalum 235
— Wilkinsoni 299
— Wischnewsky 299
— Zincum 303
Unithiolum 247
Urea pro injectionibus 156
— pura 156
Urethanum 212
Urobesalolum 297
Urodanum 242
Urosalum 297
Urosulfanum 266
— natrium 266
Urotrastum 318
Urotropinum 296
Ursalinum 313
Ursallum 280
Urutinum 182
Validolum 147
Valocordinum 40
Valocormidum 38
Venapiolinum 1 et 2 234
Verodonum 47
Verografinum 318
Veronalum 29

Verospironum 158
Vetrazinum 163
Viadrilum 28
Vicalinum 107
Viceinum 231
Videinum 177
Vikasolum 222
Vinblastinum 215
Vincapanum 139
Vincatonum 139
Vincristinum 215
Viperalginum 238
Vipratoxum in ampullis 238
Vipraxinum 235
Virapinum 238
Viride nitens 301
Vitachlorcyclinum 251
Vitacyclinum 251
Vitaminum A 175
— B₂ 171
— B₁₂ 171
— B₁₅ 171
— D₂ 177
— E 178
— P 174
Vitoxycyclinum 251
Vofaverdinum 318
Xeroformium 306
Xycainum 112
Yatrenum 280
Zinci oxydum 303
— sulfas 303
Zincundanum 291

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к третьему изданию	3
Предисловие к первому изданию	4
Как пользоваться справочником	5
Сокращения, встречающиеся в тексте	7
Правила выписывания рецептов на лекарства для амбулаторных больных	9
Высшие разовые и суточные дозы ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств для детей	12
Глава I. Средства, действующие преимущественно на центральную нервную систему	27
Наркотические средства	27
Снотворные средства	29
Нейролептики (большие транквилизаторы)	32
Транквилизаторы (малые транквилизаторы, атарактики)	34
Седативные средства	36
Анальгезирующие средства группы опия и их синтетические заменители	40
Анальгезирующие и жаропонижающие средства — производные пиразолонa, салициловой кислоты и анилина	43
Противосудорожные средства	50
Анорексигенные средства (угнетающие аппетит)	55
Психостимуляторы	55
Аналептики	57
Антидепрессанты	60
Общетонизирующие средства	63
Средства для отвыкания от курения	66
Глава II. Средства, действующие преимущественно в области окончаний эфферентных нервов	67
Средства, действующие в области холинорецепторов	67
Пилокарпин и его заменители (М-холиномиметики) (67).	
Антихолинэстеразные средства (68). Холинолитические	

средства, действующие преимущественно в области периферических холинорецепторов (М-холинолитики) (70). Ганглиолитики (75). Миорелаксанты (79).	
Средства, действующие в области адренорецепторов	80
Адреналин и адреномиметические средства (80). Симпатолитические и адренолитические средства (83).	

Глава III. Средства, действующие преимущественно в области окончаний чувствительных нервов

Средства, раздражающие чувствительные нервные окончания	86
Средства, раздражающие кожу и слизистые оболочки (86). Горечи (91). Слабительные средства (92). Желчегонные средства (98).	
Средства, защищающие чувствительные нервные окончания	103
Обволакивающие и адсорбирующие средства (103). Вяжущие средства (104).	
Местноанестезирующие средства	110

Глава IV. Рвотные, отхаркивающие и противокашлевые средства

114

Глава V. Средства, действующие преимущественно на исполнительные органы

123

Сердечные средства	123
Сердечные гликозиды (123). Антиаритмические средства (133).	
Спазмолитические средства	135
Гипотензивные средства (135). Гипотензивные средства других групп (137). Средства, расширяющие преимущественно коронарные сосуды (146). Средства, расслабляющие преимущественно мускулатуру бронхов (бронхолитики) (150). Средства, расслабляющие преимущественно мускулатуру органов брюшной полости (153).	
Мочегонные средства	155
Маточные средства	161

Глава VI. Гистамин и противогистаминные препараты

166

Глава VII. Средства, влияющие преимущественно на процессы тканевого обмена

169

Витаминовые препараты	169
Витамин В ₁ (169). Витамин В ₂ (170). Витамин В ₆ (171). Витамин В ₁₂ (171). Витамин В ₁₅ (171). Кальция пантотенат (172). Витамин РР (172). Фолиевая кислота (173). Холинхлорид (173). Витамин С (174). Витамин Р (174). Витамин А (175). Витамин D ₂ (177). Витамин Е (178). Комбинированные препараты витаминов, имеющиеся в аптеках в готовом виде (179).	
Гормональные препараты	184

Препараты гипофиза (184). Препараты, стимулирующие и тормозящие функцию щитовидной железы (187). Препараты паразитовидных желез (189). Препараты поджелудочной железы и синтетические противодиабетические средства (190). Препараты коры надпочечников (192). Препараты женских половых гормонов и их синтетические заменители (195). Препараты мужских половых гормонов и их синтетические заменители (198). Препараты селезенки (199). Анаболические стероиды (200).	
Ферментные препараты	201
Препараты с антиферментной активностью	204
Средства, влияющие на кроветворение	204
Средства для лечения анемий (препараты, содержащие железо) (204). Средства, стимулирующие лейкопоэз (207).	
Средства для лечения злокачественных новообразований (антибластомные средства)	208
Антиметаболиты (208). Антимитотические средства (209). Неспецифические средства, применяющиеся у больных со злокачественными новообразованиями (216).	
Средства для профилактики и лечения синдрома лучевой болезни	217
Гипохолестеринемические средства	218
Средства, влияющие на свертывание крови	220
Антикоагулянты (220). Гемостатические средства (222).	
Соли кальция	225
Препараты, содержащие фосфор	226
Препараты, содержащие йод	228
Неорганические препараты мышьяка	229
Глюкоза	231
Аминокислоты и гидролизаты белков	231
Биогенные стимуляторы	233
Кислоты и щелочи	239
Средства, способствующие выделению солей из организма	241
Фотосенсибилизирующие средства	243
Десенсибилизирующие средства	244
Глава VIII. Противоядия	245
Глава IX. Средства для лечения алкоголизма	248
Глава X. Противомикробные и противопаразитарные средства	249
Химиотерапевтические средства	249
Антибиотики (249). Сульфаниламидные препараты (263). Противотуберкулезные препараты (267). Противомаларийные средства (272). Противосифилитические средства (275). Противолейшманиозные, противоамебные и противотрихомонадные средства (277). Противоглистные средства (281). Производные нитрофурана и оксихинолина (285).	
Средства для лечения псориаза и грибковых заболеваний	

кожи (288). Химиотерапевтические средства других групп (292).

Антисептические и дезинфицирующие средства 294

Группа галоидов (294). Кислородотдающие средства (295).
Группа формальдегида (296). Группа фенола (297). Про-
изводные тиафена (300). Группа красителей (301). Соли
тяжелых металлов, алюминия и висмута (302). Кислоты
и щелочи (307). Продукты переработки нефти. Минераль-
ные масла. Бальзамы (309). Спирты (311). Препараты серы
(312). Фитонцидные препараты (312).

Глава XI. Контрацептивные средства 314

Глава XII. Диагностические средства 315

*Приложение. Список препаратов, снятых с производства и исклю-
ченных из номенклатуры лекарственных средств 320*

Предметный указатель 321

Латинский предметный указатель 334

Татьяна Николаевна ТОМИЛИНА

**РЕЦЕПТУРНЫЙ
СПРАВОЧНИК ДЛЯ ВРАЧЕЙ**

**Издание третье,
исправленное и дополненное**

*Редактор Ю. Г. Бобков
Оформление художника И. М. Сенского
Художественный редактор А. И. Приймак
Технический редактор Н. Г. Оношко
Корректор Р. И. Гольдина*

Сдано в набор 12/1 1973 г. Подписано к печати 19/II 1974 г. Формат издания $84 \times 108^{1/32}$. Печ. л. 11,0. Бум. л. 5,5. Уч.-изд. л. 15,65. Условн. печ. л. 18,48. ЛС-09. Тираж 400 000 экз. М-33143. Заказ № 561. Цена 1 р. 02 к. Бумага типографская № 3.

Ленинград. „Медицина“. Ленинградское отделение. 192104, Ленинград, ул. Некрасова, 10.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 „Печатный Двор“ имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Гатчинская ул., 26.

Отпечатано с матриц в ордена Трудового Красного Знамени тип. им. Володарского Лениздата. 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Т.И.ТОЛСТАЯ РАБОТАЕТ НА СТРОГОМ ТАЙНЕ